





33981/A

JODOCI LOMMII

Medici olim celeberrimi

OBSERVATIONUM

MEDICINALIUM

LIBRI TRES

QUIBUS OMNIUM MORBORUM

*Signa, & quæ de his haberi possunt
Præfagia, accuratissimè pertractantur.*

OPUSCULUM AUREUM,

Editio Quarta.



AMSTÆLÆDAMI,

Apud JANSONIO-WAESBERGIOS.

M. D. CC. XXXVIII.





AMPLISSIMO ORDINI
SENATORIO REIPUBL.

BRUXELLANÆ.

JODOCUS LOMMIUS.

S. D.



UM omnes artium Professo-
res liberalium has ipsas pro
virili quisque sua parte dili-
genter versare, & in usus ac-
commodare hominum, tum præci-
puè Medici debent. Hi enim saluta-
rem illam ac propè divinam agitant
artem, præsidem sanitatis humanæ,
sine qua nihil in vita suave, ne magnis
quidem esse Regibus potest. Id ego
institutum, Viri Ornatissimi, & spe-
ctavi semper maximè, & fui naviter
seculus, tum curationibus ægrorum
meorum, tum in publicum evulgatis
scriptis, hinc adeò futurum arbitra-
tus, ut ipsos etiam posteros, non tan-
tum superstites meo mihi beneficio

EPISTOLA AD

demerear. Ergò modò (quoniam sanitatis tuendæ præcepta abundè aliàs tractavi) ægrotantibus consulere hoc opere proposui, eam amplexus Medicinæ partem, quæ notas morborum omnium, itemque prædictiones, atque censuras, quæ de his haberi possint, continet. Videtur profectò ea meditatio potissimùm, cùm ad ægri salutem, rectamque curationem, tum ad Medici fidem atque dignitatem spectare. Primùm enim, quia novisse morbum proximus est ad sanitatem gradus; nemo sanè hanc aut præaugire, aut reddere affectis rectè potest, qui non animadvertere genus ægritudinis quod sit, non ejus eventum omnem prænuntiare, certis indiciis norit. Contrà, verò prudenter curationem instituet, & admirabilis apud omnes homines gloriam consequetur, sed & ægri utetur in omnibus obsequio, quisquis signorum instructus adjutusque cognitione, primò morbum noscere, atque ægris, si videtur ex-

po-

SENAT. BRUX.

ponere, dein ejus prædicere durationem, omnemque eventum potest: sic, ut si convalescere posse homo videtur, reddita curationibus sanitate, laus Medico comparetur: sin minus, præfagio vitetur calumnia. Sed est ea magni operis res, & ab uno, puto, Hippocrate ex professo litteris agitata. Itaque fit, ut, quemadmodum libenter ea negligimus omnes præcepta, quæ sedulitatem exigunt, sic huic Medicinæ parti, quam proponimus, minimum propè laboris à nostris hominibus detur. Nam multis satius est compendia quædam medendi quærere, & his cumulare opes, atque miserrorum cædes miscere, quàm longè sudoribus, indefessaque mentis intentione morbos studere cognoscere, atque æstimare, ac tum primùm his ipsis incolumi conscientia auxiliari. Fit adeò ex ignoratione rerum harum, ut temerè illi vel in rebus deploratis salutem promittant, vel in securis omnia metu terroreque compleant. Memini

EPISTOLA AD

ego complures me videre haud infirmæ notæ Medicos , qui per acutam febrem , etsi multa essent virium infirmarum , atque exitii signa verisimilia , magnificis tamen salutis promissis , (quoniam id fortè temporis urina utcumque maturuerat) miseròs consolarentur. Verùm post ut morbi exitus ægro calamitosus , ita ignominiosus Medico erat. Plures his sunt , qui cùm febricitantem vident sub gravissima accessione desipere , & loqui aliena , simulque brachia & pedes nudare , ac variè spargere , tum è cubili magno impetu , magnisque vocibus exilire , verberare proximos quosque , neque necessarios , neque familiares agnoscere , caloribus extorri , acutissimis doloribus affici , ac siti propè enecari ; hæc , inquam , cùm vident , concoctâ quantumvis naturæ viribus eâ unde morbus est materiâ , exterrentur , & more pavidarum muliercularum ad extremum rem rediisse omnem , pronunciant. Verùm facess-

sen-

S E N A T. B R U X.

sentibus per judicationem (*κρίσιν* Græ-
 cè dicunt) turbis his illicò resolvi
 morbus incipit, ac vani metus levare,
 magno falsi præfagii contemptu. At-
 qui hinc sciri potest, nullum operæ
 pretium in curationibus morborum
 fieri à Medico posse, sine hac tam ne-
 cessaria tamque plausibili prædicendi
 arte. Eam nos, Viri amplissimi, tribus
 Libris, qua potuimus brevitate, com-
 prehendimus, ut communem rem æ-
 grotantium, ac præcipuè Civium ve-
 strorum, hac in parte, juvaremus. In
 quo negotio quanta usi simus dili-
 gentia, atque industria, aliorum esto
 judicium. Nos certè, quod licuit, præ-
 stitimus. Nec diffitemur clarorum
 scriptorum Ingeniis, maximè verò an-
 tiquissimi Hippocratis multum nos
 adjutos esse. Quæ res adeò vitio verti
 non potest, ut etiam dignitatem, fi-
 demque nostris monumentis plenio-
 rem sit allatura. Sed quoniam morem
 apud scriptores sæculorum omnium
 obtinuisse video, ut magnorum viro-
 rum

EPISTOLA AD

rum patrociniū scriptis adsciscant
suis, eum ego ipsum quoque secutu-
rus morem, haud aliunde rectius o-
pem mihi hanc præstari posse judica-
vi, quàm ab amplissimo spectatissimo-
que confessu atque Ordine vestro, sic
sanè ut quorum commodis hic meus
serviet liber, eorum is fultus autori-
tate atque favore, in lucem, & in
manus hominum exeat. Quos enim
ego potius exoptem mihi nunc, qui-
bus hoc opus nuncupem, dari? Vestri
nominis dignitas atque splendor Ci-
vitatís, sed & privata alioqui, quæ mi-
hi cum multis vestri Ordinis Viris Do-
ctissimis intercedit amicitia, fecêre,
ut ingens mihi incesserit cupiditas, i-
mò animus exarserit, lucubrationes
has sub Vestri Nominis auspiciis evul-
gandi, sempiternæque (uti spes est)
posterorum consecrandi memoriæ.
Quamquam veniam mihi cupiam à
vobis dari, si fortè nimium confiden-
ter, ne dicam licenter, tenuia hæc,
ac parum speciosa attulisse videbor.

Quis

SENAT. BRUX.

Quis enim nescit non nisi maxima consecrari tantæ Reip. oportere, quantâ nihil est illustrius atque splendidius.

Dico hoc, Patres conscripti, summo jure, meritoque Civitatis Vestræ, cujus ornamenta nunquam æstimare animo pro dignitate, si velim, possim, nedum oratione consequi. Attamen cum undique hic quadam occasione ingens sese ingerat laudis materia, non potui temperare egomet mihi, quin pleraque sequerer scribendo tantæ Reip. decora. Et quidem laudes mitam, quæ ab antiquitate civitatis, à robore, à legibus, atque institutis duci maximè possint. Id enim non hujus esse loci, sed ad aliarum artium attinere possessores existimavi. At quod nostri magis instituti est, id sequar, commoditatem & salubritatem loci hujus, ipsamque amoenitatis decorisque plenam faciem scripto celebraturus. Toto Oriente atque Meridie montibus, non nimium altis, civitas insidet, sensimque in Occasum sese,

EPISTOLA AD

se, & in Septentrionem, donec tota fiat humilis, explicat, amœnissimum contemplantibus aspectum præbens. Nam altioribus locis sunt, quæ undequaque videre est, molimina ædificiorum atque templorum. Stat præcipiti colle magnifica D. Gudulæ ædes, duabus in fronte superba turribus.

Paulò altius, ad Meridiem, Regis eminet palatium: quod ipsum omni dehinc parte turritis Principum ædificiis longè latèque ad ipsam usque civitatem humilem cingitur: ubi huc oculis ventum est, ante omnia sese spectantibus offert publica civium domus. Ea modis omnibus ita absoluta est, ut nullam tota provincia habeat secundam. Quid! quod limpidissimis numerosissimisque fontibus non solum foris antè poneque circumdatur, sed interius etiam aliis inferius positis, aliis juxta Procerum coenaculum ad triginta quasi pedum altitudinem evectis, adornatur. Jam autem mediis domus tectis turris exurgit prodigio-
sæ

SENAT. BRUX.

ſæ excelsitatis, ſaxis ad ipſum uſque pyramidatum faſtigium artiſicioſè laboratis junctiſque firmata. Huic faſtigio æneus inſiſtit Michael, Urbis Patronus, quem nemo ſine ſtupore (tantæ molis cùm ſit) vento verti inconcuſſum aſpicit. Opus apprimè arduum, & ingeniis hominum noſtrorum propè ſuperius. Porro hinc circumcirca conſpicari eſt ingentia Divorum templa operoſis eminentia turribus. Mediæ inter hæc cernuntur confertiſſimæ Civium domus, ſplendoris operiſque plenæ. Poſt has qua parte Occaſus atque Septentrio eſt, in prata lætiſſima oculis aduſque mœnia decurritur, ea ubique objecta rerum facie, qua nihil cerni jucundius atque venuſtius poteſt. Liceret modò interiora Urbis propius intueri, atque ex his ducere laudes, niſi ea infiniti operis res eſſet. At invitatur, imò cogitur ſcribentem me, quod (miſſis cæteris) maximè memorabile reticere nullo modo poſſum: cunctam propè Civita-

ta-

EPISTOLA AD

tatem saluberrimis fontibus irrigari, perenni scaturigine manantibus, non modò his qui in publico numerosi sunt, verum etiam privatis, qui infiniti. Jam verò ut intra moenia splendoris omnia esse plena demonstravimus, ita extra quoque nihil est, quod in summa voluptate non afficiat spectantem. Hic in omnem penè regionem montes non nimium alti, neque ullis molesti crepidinibus excurrunt, frumentorum omnis generis feracissimi, lætissimarum vallium interstitio latè diffusi. In his vallibus armentorum greges, & piscibus referta stagna, ut contemplantibus faciem voluptatis plenam, ita summos oppidanis usus præbent. Quid verò sylvam commemorem, quæ modò à Civitate miliaria ad Meridiem vastissima densissimaque occurrit. Summa hîc civibus lignandi facultas, summa venandi Principibus aulæ datur. At contraria parte, quæ extra muros ad Septentrionem est, quanta amœnitas præ-

SENAT. BRUX.

pratorum, passo æquore ad ipsius
usque Vilvordiæ portas, sese expli-
cantium! Medius in his humili alveo
Zinna labitur fluvius, & juxta hunc
novarum visuntur fossionum molimi-
na, firmo utrinque septa aggere. Pul-
cherrimum mehercle spectaculum,
virentissimam planitiem duplicibus a-
quarum ductibus intersectam ador-
natamque videri. Hæc ista civitatis
vestræ ornamenta non sine causa jam
inde ex tam longo ævo primùm im-
pulere Brabantiaë Duces, atque hinc
Imperatores, potentissimos Orbis Mo-
narchas, ut hunc sibi locum, totius
Belgii nostri amœnissimum, atque
commodissimum, commorandi cau-
sâ, delegerint: simulque suum hîc
quoque esse Cancellarium, supremum
Brabantiaë Magistratum juris dicen-
di causâ voluerint, ut quæ modis o-
mnibus est florentissima, hoc quoque
nomine florentior Civitas esset. At
una res vobis, Patres Conscripti, ad
cunctam felicitatem visa est defuisse.
Nam

EPISTOLA AD

Nam cùm Antverpiæ, nominatissimè Europæ Emporii, frequentatio penitus sit necessaria, constat tamen hanc nequaquam facilem esse posse. Scilicet vestri fluminis nimium anfractuosi, ac magis locorum spatiis hâc illâ se intorquentis causâ factum est, ut non nisi plusculis diebus, molestissimoque itinere ultrò citroque liceat navigare. Itaque cum cæteris partibus floreatis omnibus, hac sola laboratum à vobis fuit. Ergò ingens opus, & apud omnem posteritatem memorabile aggressi, iter vobis ad ipsum Schaldim, altissimis latissimisque fossionibus, incredibili sumptu, atque solertia, quinque grandium miliarium longitudine patefecistis: quodque negare natura loci videbatur, vixque absolvi magnorum Regum thesauris posse, id vos industriâ vestrâ, vestrisque opibus prudenter incepistis, constanter promovistis, foelicissimè jam totum propè confectum dedistis. Sentiant profectò virtutum æmuli vestrorum,

SENAT. BRUX.


rum, sentiunt, inquam, & oculis jam nunc cernunt rectis consiliis institutas has fossiones esse. Reputate, quæso, nunc, Patres Conscripti, apud animos vestros crescentem ex hac re opulentiam, celebritatemque Civitatis hujus vestræ, quam brevi videmus mercibus frequentari ab omni Oceani nostri littore advectis posse. Quantæ verò voluptati omnibus fuerit navibus has aquas onerariis & ratibus perpetuò sollicitari, & intra & extrà mœnia cernere. Ergo vestri facti hujus sempiterna in animis civium fuerit collaudatio, dulcisque memoria, florebuntque eminentissima hæc vestri nominis insignia, quæ adeò non potuerunt ulla vetustate obliterari, ut spatio majus indies incrementum apud posteritatem sint consecutura. Sed modum finemque facio, Viri Amplissimi, vestræ Civitatis atque virtutis commemorandis ornamentis, quæ sic jam laudibus florent suis, ut nostra prædicatione parum videantur acceptu-

EPISTOLA AD SEN. BRUX.

ptura splendoris, disertioribus hominibus, à quibus plenè celebrentur, digna. Quapropter vestræ etiam fuerit humanitatis condonare, si parum pro tanti Ordinis dignitate præstitisse videbor. Æquitas animorum vestrorum valebit, nostramque boni consulet tenuitatem, magna animi erga vos fretam promptitudine. Quod si factum, uti confido, à vobis erit, majorem nobis alacritatem, studiumque scribendi majus injicietis. Nam ut modò notas atque præfagia proponimus morborum, ita forte & causas horum, & curationes olim dabimus. Valete.

Bruxellis, 26. Maii.

V. CL.



JODOCI LOMMII


Medici Clarissimi

MEDICINALIUM

OBSERVATIONUM

LIBER I.

QUO MORBI, QUIBUS TOTA
OCCUPANTUR CORPORA, ANIMAD-
VERTUNTUR.



Observationes scripturus medici-
nales in noscendis æstimandis-
que morbis necessarias, rectè
ab iis incipere viciis posse vi-
deor, quæ totis corporibus inhærescunt.
Ex horum ordine viciorum frequentissi-
mum, & generi hominum inimicissi-
mum, febris est; adeò, ut quorundam
literis proditum sit nunquam quemquam,
nisi violenta morte raptum, sine eo mor-
bo vitam amisisse. Ergo à prima origi-
ne rem aggrediar, primumque id genus
febris ponam: quæ, quia uno die fini-
tur, Græcis *ἐφ' ἡμέραν*, nobis diaria ap-
pellata est. Ea autem his sese notis pro-
fert.

A

Mi-

*Febris
diaria.*

Mitis toto in corpore calor est, qualis in iratis hominibus percipi, aut vino fartis solet. Pulsus arteriarum (quod profectò huic febrì proprium est) protinus à magnitudine incipit, idemque ut modicè celer ac frequens, ita æqualis & mollis, & justì ordinis pro modo naturæ est. Nihil etiam aut certè parum urina demutatur. Ipsum verò morbum non cibi antecedit fastidium, non spontanea corporis lassitudo, sed neque gravior somnus multave oscitatio, neque horror: verùm repente totus semel is accedit, nulloque graviore incommodo, ubi jam esse cœpit, molestus est; dolorem intelligo capitis atque ventriculi, itemque nauseam, æstum, corporis inquietudinem, & hujusmodi. Solvitur malum interdum latenter sine sensu manifestæ inanitionis, sæpius per copiosos tum halitus, tum madores, aut certè per sudores ut suaves, sic minimè multos. Scire etiam licet diariam febrem semper ferè à causis moveri evidentibus, vigilia, sollicitudine, mœrore, ira, æstu solis, lassitudine, temulentia, inedia, & similibus, eandemque unico finiri die consueße, quem diem si transit, tertiumque superat, jam tum diariam esse definire,

nere, in putridamque, quæ mox proponetur, abire. Sub eo casu si vehementer corpus siccum est, timeri etiam hæctica febris potest. Diariam omnem curasse quàm novisse facilius est. Itaque ferè sequitur, ut hæc ipsa prius nocere possit, quàm sciri. Eadem biliosum hominem negociis deditum, & promptius, & majore periculo afficit.

Ad hunc quoque locum pertinere ea febris videtur, quæ diariæ servans naturam propter sanguinis non putrefacti fervorem; multum ardoris, ruborisque corpori exhibet. Græcorum nonnulli *σύνεχον* dixerunt, nos continentem non putridam. Hæc quidem eandem quas *Febris continens, non putrida.* putrida notas, at paulo evidentiores exhibet. Quanquam hic etiam caput vel dolet, vel grave est, corpusque omne, ac præcipuè facies vehementer rubet, caletque. Adhæc altior occupat somnus, multum arteriæ in temporibus moventur, ipsa spiratio molesta est, pulsusque magnus, & plenus, & frequens, & velox, totum denique corpus segnescit, & quadam veluti lassitudine occupatur.

Venio nunc ad eas febres quæ succorum implicitæ sunt putredini, ex quibus *Continens putrida.*

primum ea proponetur , cui causam putrefactus sanguis dedit. Græcis ea perinde atque superior σύννοχος , nobis autem continens putrida appellata est. Signis quidem hæc febris , quibus ea quam proximè dixi, iisdem, sed manifestioribus sese profert. Verùm acrior subest calor putredinis comes , guttur , & quæ juxtà sunt loca exturgescunt æstuantque, unde præpedita ægro oratio est : adhæc oculi calentibus implentur lachrymis, venterque nonnullis intumescit, & percussus, ut tympanum, sonat. Ipse pulsus, magnus, vehemens, celer, & frequens, ut in priore Synocho est, at hic etiam est inæqualis, in priore non est. Urina crassâ mejitur, rubra, turbida, sedimento carens. Non rarò etiam exanthemata per corporis summa efflorescunt, ut aliàs alia, sic frequentissimè vel livida, vel nigra. Id malum ferè post quartum diem esse desinit, & si quidem continenter increscit, periculum afferre vitæ potest, utique si jam aspera lingua, nigraque est, si refugiunt oculi lucem, si urina ut nigrum vinum obscura est. In quo hæc non sunt, ipsaque febris magis magisque decrescens mitescit, is potius esse in tuto videtur. Quum autem

mor-

morbus æquali semper impetu fertur ; securior quidem is erit , eo qui increfcit , gravior autem eo qui declinat. Quæ obfervatio in continente etiam febre non putrida habenda eft. Scire autem licet utramque Synochum , non nifi temperatæ naturæ hominibus , & fanguine non malo plenis , fimulque carnofis accidere confueviffe. Facilis quoque à continente non putrida in putridam , & ab hac rurfus in continuam tertianam tranfitio eft.

Sequitur id genus putridæ febris, quæ *Febris* Græcis *συνεχής* , nobis continua dicitur. *continua.* Synocho putridæ accessionum continuatione affinis, ea tamen re diffimilis , quòd hæc ab alterutra bile aut pituita profecta eft , quodque pro horum natura atque motu humorum circuitus habet , quibus etfi non omnino ceffat , remittit tamen , & quietiora tempora afflictiis præftat. Synochus verò ex fanguine oritur putrefacto , nec ullam remiffionem ad morbi ufque judicationem præbet. Porro continuam febrem neque horror aliquis , neque rigor , neque frigus antecedit , fed tota ea repente calore hominem adori-
tur , quamquam non rarò rigorem aut horrorem corruptus humor circa præ-

cordia consistens, tantisper movet, donec totus quoque à febre incensus fit. Semper autem calor acris atque asper est, idque magis incremente accessione atque consistente. Ipsa respiratio itemque pulsus inæqualis est. In eo enim velox contractio, distentio tardior est. Idem pulsus, modò celer, modò tardus est: itemque modò validus, modò languidus: ut primùm incipit accessio, velox is atque parvus: in vigore supra velocitatem etiam, egregiè magnus est. Urina initio crassa, rubra, ac turbida est, ac neque nubem, neque suspensum quid neque sedimentum habet. Eadem interdum tenuis quoque, sed rubra & minimè perspicua est, Quicquid denique aliqua parte corporis vacuatur, sive sudor id fuerit, sive alvi proluvies, vel urina, ferè gravi odore molestum est. Continua, tum quotidiana, tum quartana ferè incerta, atque ordinis expers esse solet, sic ut alio die bis, terve effervescat, alio id non nisi semel, aut certè prorsus non incidat. Continua quartana rarissima est, hac minus rara quotidiana Tertiana quæ nobis ardens febris, Græcè *Febris ardens*. *καύσος* dicitur, omnium est frequentissima. Ea his signis noscitur. Summo incendio

cendio corpus extorretur, idque intus magis quàm foris. Accedit pertinax vigilia, & profundior interdum somnus. Lingua arida, & crassa, & aspera, subnigraque & amara est. Spiritus difficillimè trahitur, incipit affici morfu stomachus, cibique cupiditas perit, vehemens tum sitis, tum æstus præcordiorum est. Alvus aliis soluta, aliis compressa est. Ipse æger penitus inquietus morbum male sustinet, frequentique subinde delirio perturbatur. Hoc febris genus, quoniam summè vehemens est, brevè finitur. Itaque si protinus ab initio signa exhibet bona, plerisque omnibus quarto die solvitur, nullis post septimum manet. Tum verò aut vomitio fit, aut alvus profluit, sudorve ex omni corpore, aut sanguis è naribus fertur. Senibus hic ipse morbus, ut infrequens, sic apprimè perniciosus est. Tutius & sæpius juvenes sic laborant. Febris ardens non rarò in pulmonis vertitur inflammationem, idque ubi fit, in propinquo exitium.

Tum in hoc morbo, tum in aliis conti-
nuis febribus grave esse periculum signi-
ficatur, ubi aurigo ante septimum diem
oritur, aut ubi quis ante materiæ con-
coctionem inhorrescit, magisque si vis

*Pericu-
li signa
in con-
tinuis
febri-
bus.*

corporis admodum infirma est, ubi post rigorem æger non recalescit, ubi continua vigilia, vel sopor, vel delirium est, ubi vox intercipitur, aut aures obsurdescunt, aut collum vehementer dolet, præcipue in his quibus proclivis insania est, ubi æger quid accepturus manibus tremat, ubi vehemens sitis, simulque ingens corporis squalor est, aut ubi lingua nigricante, totoque ore præsicco, nulla hominem sitis urget, simul os præter consuetudinem malè olet, ubi singultus incidit, præcipuè post citam alvum, aut post sanguinem sine modo effusum, ubi puero venter nihil reddit, nullusque accedit somnus, sed & colorem is ipse sæpe mutat, continenterque plorat. Si quidem huic proxima distentio nervorum est. Ubi cum acuto capitis dolore præcordia revelluntur, neque tum sanguis è naribus fertur, aut ubi hunc casum biliosa alvus, aut tormina, itemque coxarum, vel genuum dolor, neque comitantur, neque tollunt. Scilicet sub utraque re promptissimum delirium est, ubi viscera gravis dolor fatigat, simulque nervorum oritur distentio. Ubi simul præcordia dolent, simul somnus profundus tenet, aut ubi ventriculo gra-

vis ardor, aut morsus molestus utique est, si tum quoque alvus biliosa est. Ubi dejectio penitus retinetur continuo dolore caput exercente. Ubi urina aquæ speciem repræsentat, quo ferè tempore delirium comitatur. Hæc urina exitium etiam, si diu talis fertur, portendit.

Idem periculum est, ubi urina rubra, crassa, confusaque, & mali odoris est, eademque parvo temporum intervallo sæpe pauca & cum difficultate mejitur, aut ubi sine ratione matura est, aut præter voluntatem elabitur. Ubi vim febris ægrotus homo non sentit, mentis errore præpeditus. Ubi primâ febris accessione protinus uber sudor erupit, aut viciari mens cœpit, parsve aliqua corporis resolvi. Ubi denique accessio tertio quoque die vehementissimè invalescit. Proxi- *Exitii nota.*
mum nunc est ea signa ponere, quæ in acuta febre certam denunciant perniciem, quam scire licet in propinquo esse, si sub magno morbo ultima corporis infirmitas est, magisque si tum quoque vel delirium, vel rigor incidit, si is qui mentis usu caret taciturnus est, utique si voce alioquin privatus non est. Si infirmis viribus labra, vel supercilia, vel oculi vel nares pervertuntur, si æger tum quo-

que neque videt, neque audit, aut si voce amissa, conniventibus oculis jacet, neque eo tempore è naribus profluit sanguis, neque vomitus incidit, unde id mali tollatur. Quod incommodum eo quoque fuerit gravius, quo simul spiritus difficilius trahitur. Æquè horrendum est, si oculi illachrymant, aut vehementer subsederunt, aut foras prominent, si caligant, si incerti huc illuc vertuntur, contrave immobiles obstupescunt, aut denique distorquentur, si alba eorum grandescunt, nigra minuuntur, aut si ubi hæc sub superna conduntur palpebra, illa rubescunt, atque in iis pallidæ venæ, nigræve cernuntur, aut si quid modo telæ araneorum concretum, totis oculis innascitur, vel innata pituita, novissimisque angulis inhærescit, si per somnum palpebræ penitus non coëunt, eædemque vehementer pallent, nisi id tamen fusa alvus fecit, si oculorum denique alter minor altero est. Ad hæc si in aurem acutissimi doloris tormentum incidit, maximèque in juvene, quem sanè is casus ferè intra diem septimum occidit. Verum senior aliquis, quia non æque graviter aut dolet, aut febricitat, magis in tuto esse creditur.

Si

Si caussa febris dentes strident, itemque lividi, nigri, aut vehementer aridi sunt, simulque lingua per morbi principium sicca, deinde aspera. post etiam nigra, crassaque est. Si æger ore hians jacet, & assiduè dormit, aut si is subito strangulari videtur, ac neque potum devorare, neque salivam suam potest, nullo tamen substante in faucibus tubere. Si collum difficillimè vertitur, aut idem sic distorquetur, ut molesta inde sit deglutitio. Si frigidus efflatur spiritus, si pulsus obscurus, densus, & intercisis est. Si sitis antè vehemens, nunc penitus aboletur, febre tamen æquè gravi, ipsaque lingua æquè sicca atque nigra. Si vomitus cruentus incidit, aut varius multorumque, qui boni non sunt, colorum, & foetens. Si digiti floccos in veste legunt, vel fimbrias diducunt, vel aliquid in adjuncto pariete carpunt: si horum unguis extremaque livent, vel nigrescunt, quanquam nigra ea fieri haud juxtà periculosum sit, utique si validæ vires morbum non difficillimè ferunt, aliaque salutis sequuntur signa verisimilia. Nempe tum quidem bona valetudo reddit, sed nigrae partes corruptæ decidunt. Perniciosum insuper est, ventrem in tumorem

morem attolli, magisque ubi datum medicamen purgans fuit: aut hunc ipsum flatibus distentum, hos emittere non posse. Ad hæc per initia febris bilem atram suprà infrave prodire. Alvum liquidam simulque nigram, vel pallidam, vel pinguem, vel mali odoris esse. Hanc ipsam cum subita palpitatione cordis, atque singultu esse compressam. Urinam intercipi cœpisse, aut nigram meji, & crassam, & fœtentem, aut urinam quæ ante fuit bona, repente notas exhibere non bonas. aut per omne morbi tempus nihil ab urina diffidere hominum sanorum. Tum etiam ipsum mictione reddi sanguinem, aut vesicam dolere duramque esse. Æquè mortiferum est, per initia morbi extrema refrixisse, maximèque hæc ipsa non recalescere potuisse, aut extremis frigescentibus interna caloribus extorri, atque sitim multam facere. Ad hæc subitò sine causa manifesta febrilem ardorem conquievisse. Ortos sub infirmis viribus esse sudores, simulque animam defecisse. Ipsum etiam ægrum supinum cubare, genuaque contrahere, & deorsum subinde ad pedes devolvi. Brachia item & crura nudare, dispergereque, quæ calida tamen non sunt. Adhæc qui
in-

inferiora loca corporis tenebat dolor, repente eum ad viscera translatum defuisse. Ulcus quod antè, & in ipsa natum febre est, siccum ac lividum esse. Pustulas item toto corpore erumpere, modò tamen abscessus aliquis purulentus non exoriatur. Quin orto etiam juxta aurem abscessui nullam accedere maturitatem potuisse, neque è naribus cruorem fundi, neque urinam crassam, multamque ferri. Præterea frigidum sudorem moveri, ipsumve ægrum quarto die, itemque septimo multum affligi, neque ullam undecimo experiri judicationem, aut diebus hunc judicialibus inalgescere, non subsequenter sudationibus. Rigorem etiam incidere, sæpeque redire, neque ex eo tamen morbum levare. Porro ad extrema ventum est, si tempora collabuntur causâ febris, naresque acutæ fiunt, & oculi concavi, & frigida lingua, & aures, & imis partibus leniter versæ, si cutis etiam circum frontem dura & intenta est, ipseque homo cadaveri similis perpallidâ aut nigrâ planèque corruptâ propter morbum facie est.

*Proxi-
mæ
mortis
indicia.*

Ex continuarum febrium ordine ea quoque esse censetur, quæ, quoniam omnium mitissima est, Lenta appellatur:

*Febris
lenta.*

ea

ea scilicet quæ latentem putredinem humoris visceribus impacti, aut ipsorum etiam viscerum sequitur corruptelam. Vix ægrotare homo videtur, nullumque quod grave sit incommodum pati, corpustamen sumpto alimento non proficit, sed paulatim consumitur, atque liquefcit: Ipsumque sic imbecillum fit, ut ægrè loco moveatur. Pullus est frequens, celer, & inæqualis, non tamen magnus. Urina interdum putredinis notas habet. Hic morbus ferè malum habitum corporis comitatur, & fœdos virginum colores, estque maximè diuturnus, sæpe quadragesimum longè excedens diem. Sed est quoque multò periculosior, cùm non humoris obstruentis vitium, sed ipsius etiam visceris sequitur corruptionem, jecinoris scilicet, vel pulmonis vel cerebri, vel lienis, & interdum renis partiumque longius sitarum. Tum suprà ea omnia quæ modò proposui, hæc quoque contingunt. Multo longoque tempore morbus gignitur, paulatimque crefcit, alios ferè secutus morbos; curatione, maximeque vacuantibus remediis non lenitur, sed interdum etiam exasperatur. Facilè syncopen accersit, corpusque sensim, & nonnunquam sine sensu mali hujus

jus debilitat, & marcore consumit. Hoc ipsum profectò genus febris est, quod in iis animadvertitur, quos tabes malè habet.

Sequar nunc eas febres, quæ quæta aliqua tempora intermissioneſque ægrotis præſtant. Harum alia tertiana, alia *Tertiana in-* quartana, alia quotidiana eſt. *termit-* *tens.* Tertiana his ſignis ſeſe prodiſt. Protinus ab initio, perque omnem febris decurſum cum ipſa acceſſione rigor tertio quoque die invadit pungens & corpus quaſi vulnerans, tametſi ſola interdum ſit refrigeratio, ubi levior ſcilicet morbus eſt. Sub rigoris finem bilioſus ſequitur vomitus, vel certè ſoluta alvus. Tum calor toto corpore accendi incipit, æger præ vehementi æſtu corpus nudat, varieque deſicit. Idem difficulter ſpirat, & capite dolet, nec rarò etiam delirat. Pulſus, ut primùm incipit acceſſio, contractus parvuſque eſt: mox vehemens & validus, & celer, nequaquam tamen inæqualis, niſi id fortè parum ſit. Urina ſubtenuis, flava, aut flammea eſt, malique odoris. Acceſſio copioſis ortis ſudoribus finitur, ſeptem ferè horis abſoluta. Sed diſcrimina quædam ponere operæ precium eſt, quibus diſcrimini-

bus

bus diffidere hæc febris à cæteris intermittentibus solet. Ergo, ubi ardens febris orta est, aut continuarum demum aliqua, sentit utique injecta corpori manus, magis magisque calorem increlescere: at in tertiana non sentit, hic enim æqualis calor subest, qui interdum quoque sub ipsa mitescit manu. Quin etiam tertiana intermittens singulis accessionibus primò rigorem, dein sudorem exhibet, continua verò utroque hoc (nisi cum judicatione solvitur) caret. Adhæc in tertiana intermittente rigor, & vehemens esse incipit, & citò cessat, primis accessionibus maximus, sequentibus autem magis ac magis mitescens, contrarium autem quartanæ accidere mox ostendetur. Circuitus etiam accessionum maximè ad constituendum febris genus valet. Pergam itaque, ut cœpi, de tertiana dicere, quæ tuta esse solet, & spaciè minimè longi. Ubi ea exquisita est, diebus quatuordecim absolvitur. Essè autem exquisita solet, in juvene, cujus natura calida & sicca est, quique media fortè æstate sub fervido cœlo vigiliis, vel laboribus, vel curis, aliisque ærumnis exercitus multum fuit. Ubi hæc desunt, ibi notha confit tertiana, quæ longior est,

est, neque æquè vehementes habet ardores, neque sudores æquè copiosos, ut exquisita, fundit. In notha etiam nullus est anticipantium, aut cunctantium accessionum certus ordo, rigor item minus quidem vehemens, at diuturnior est, non æquabiliter totum occupans corpus: quælibet accessio multò longiùs horis quatuordecim tenet. Ipse morbus, nunquam septimo circuitu, rarò quarto-decimo, sæpe longiore spacio solvitur.

*Tertia:
na no-
tha in-
termittens.*

Quartana autem febris sic observatur: Primis accessionibus, horror quarto quoque die incidit, qualis nasci magno ex frigore solet. Hic horror interposito tempore tantisper in dies crescit, donec in vehementem rigorem abeat, sub quo corpus intremittit atque concutitur, dentes strident, ipsaque ossa quasi tundi, atque obteri profundo pondere videntur. Decedente rigore ferè vomitus sequitur, moxque calor exoritur, frigoris quodam sensu circa intima ossa mistus: pulsus invadente accessione languidus, rarus & tardus est, postea validus fit; magnus, frequens, celer, magisque, quàm aliis in febribus, inæqualis. Urina etsi non rarò in hoc morbo incerta, fallaxque est, primis tamen diebus tenuis, alba,

Quartana.

aquosa, posterioribus varia mejitur. Calor, sitis, capitis dolor, vigilia, minus quidem quàm in tertiana sollicitant, magis autem quàm in quotidiana. Productior etiam hic quàm in utraque alia accessio est, eademque copiosis sudoribus finitur, quare exacta etiam succedit febris intermissio. Quartanæ longissimum quidem malum, at satis tutum est. Interdum à magnis morbis corpus, tum tutatur, tum liberat. Qui enim sic laborant hi neque maniâ, aut melancholia, neque lepra, neque ortâ, propter repletionem, distentione nervorum tentantur. Quinetiam eadem hæc si antè fuere vicia, accessû finiri quartanæ consuêrunt. Quibusdam etiam placuisse video neminem à quartana extinguî, nisi ægri aut curantis culpâ, posse. Scire tamen licet non quiescere solere tunc morbum, nisi vicio aliquo visceribus illato. Rarò etiam idem sine lienis obstructione, vel dolore, vel duritie visus est. Quare tuta quoque imprimis ea quartana est, quæ integro liene hominem tenet. Eadem intra annum (nisi si error aliquis incidit) absolvitur. Sæpius post mensem sextum, & interdum post tertium conquiescit. Sæpissimè autem sic fieri observatum

tum est, ut quæ Autumno, totaque hyeme rectè curata quartana remediis fuit, ea proximo vere solvatur. Idem morbus, si vel cum tumido liene est, vel nimium inveterascit, hydropi corpus exponit; ferèque æger his casibus oppressus perit. Quartana maximè autumno grassatur, magisque si lien tumet, continuæ, vel incertæ febres fuerunt, non ex toto solutæ, magisque si corpus frigidum, & siccum, & glabrum, si ætas declinans, ipseque homo crassæ materiæ alimentis usus, mœrore ac sollicitudinibus confectus est.

Quæ æstate oritur quartana, brevior est. Longior Autumnalis, præcipuè si in proximo hyems est. Sæpe cruditas ex quartana quotidianam fecit, magno exitii metu. Quorundam etiam observatione compertum est, discussum à longa quartana morbum comitalem fuisse. Quartana etiam, postquam ex hac aliquis convaluit, facilè revertitur, utique si quo die febris esse solebat, frigus, vel calor, vel cruditas, vel lassitudo inciderint.

Quotidianæ quoque febris proponenda *Quotidiana.*
observatio. Tenue frigus extremis in partibus oritur, cujus sensus (ut in cæ-
B 2 teris

teris quoque fit intermittentibus) primum ferè à summis digitis manuum ac pedum, itemque à naso incipit. Vomitus si quis incidit, pituitosus est. Inde calor paulatim lentèque nascitur, crescitque, hebes, humidus, fumosus, vapore mistus, idemque vigente jam accessione aliquantulum fit mordax, atque acer, semper autem inæqualiter is ipse percipitur: frigoris interdum permistum sensum exhibens. Accedit dormiendi penè inexpugnabilis necessitas, nihilque primis diebus fititur, nihil sudatur, nihil penè de febricatione intermittitur. Incipiente accessione quibusdam vel anima deficit, vel (quod gravius est) syncope incumbit, itemque pulsus inordinatus est, & magis quàm in aliis febribus inæqualis, itemque tardus, parvus, ac debilis. Is ipse vix magni fieri, in crescente accessione potest, quanquam tandem creber esse incipit, sed minus quàm sub aliis febribus, æquè tamen atque in quartana velox. Ventriculus assidue dolet, alvus liquida, cruda, pituitosaque est. Urina initio vel alba tenuis, vel crassa ac turbulenta: post rubra, crassa, turbidaque est, totum corpus hebescit, atque grave redditur: ipsa

accessio magna ex parte horis octodecim, pauculo sudore finitur: totus morbus quatuor & sexaginta diebus. Hoc genus febris rarissimè incidit, rectiusque fortè est, cum quotidie aliquis febre conflictatur, duplicem hanc tertianam, non quotidianam esse putare. Magis autem quotidiana pituitosis insidiatur hominibus, quieti, cruditati, ac somno deditis: utique si senex quis, vel puer, vel fœmina est: si tempus hybernum cœlumque nubilum est: si sæpè è capite pituita in ventriculum destillat: si denique cùm primùm febris hominem adoritur, tumida præcordia vel inflata intentata sunt: si principium accessionis in vesperam incidit: si antè, & in ipsa febre, facies sublivida, ac subtumida est, stomachus diu imbecillus, cibi fastidium, & frequens ructus fuit. Omnis autem quotidiana ægerrimè remediis cedit, tædii, ac periculorum plena.

Tutior est ea quæ incipiente accessione, pituitæ vomitum ultro ciet, & declinante plurimum sudorum fundit, & posthæc ex toto intermittit.

His ita animadversis, implicationes *Fe-* quoque febrium inter se mutuas observa- *brium.* re non inutile est. Scire itaque licet, *implica-* *tiones.*

rarissimam duplicem quotidianam esse; tertianam autem duplicem frequentem, cui principium ferè simplex præbet. Una etiam conquiescere manente altera solet: accessiones quotidie, sed non iisdem horis fiunt, quæque paribus diebus incidunt, inter sese sunt similes, & his dissimiles quæ imparibus. Æquè frequens duplex, atque etiam triplex quartana est, utraque è simplici nascitur, accessionesque rarò pares habet.

*Semi-
tertia-
na.*

Magna quoque dignum observatione id genus compositæ febris est, quam nos Semitertianam, Græci *ἡμιτερταδον* appellant. Ea incipiens horrorem movet, & sudorem declinans, neque posthæc tamen integra esse à febre corpora finit. Quoniam verò ex tertiana confit intermittente & quotidiana continua, uno die asperior horrorem, sæpèque aliquid etiam rigoris exhibet, itemque bilis vomitum quendam vel dejectionem: adhæc magnum ardorem, madidique vaporis halitum: altero autem die frigus potius quàm horror incidit, ac neque sitis, neque ardor multum infestant. Pulsus contractior est, totaque mitior febris. Quin etiam altero die duarum exhibetur febrium species, altero unius duntaxat.

Ra-

Rara profectó febris semitertiana est, ac grave periculum, ubi occupat, minatur. Est autem ea exquisita, ubi paribus ferè portionibus & intermittentis tertianæ, & quotidianæ continuæ subsunt materiæ. Ubi autem non sunt, ibi pura esse semitertiana non potest, tumque facilius remediis curari posse malum volunt.

Sed cùm observationes proposuerim *Com-*
singulis generibus febrium proprias: nunc *munis*
eas quæ omnibus, aut certè quàm pluri- *in fe-*
mis communes sunt, sequar. Fuerint *bribus*
autem hæc quidem istiusmodi, ut vel *ani-*
metu terreant, vel spe miseros consolentur. *mad.*
Ergo febrem satius est distentioni *versio-*
supervenire nervorum, quàm distentionem feбри. Corpus quoque pro febris vel spacio, vel acumine parum emacruisse, aut rursus præter rationem, præterque modum extenuatum esse, malum est. Illud enim indicium morbi longioris, hoc imbecillitatis est. Si sub acuta febre caput repente ac vehementer dolet, ipsaque tamquam revulsa præcordia sunt; insanix ostendunt metum, nisi si sanguis è naribus fertur. Per eandem febrem aures obsurduisse, pestiferum atque furiosum est, nisi id quoque cita alvus,

vel certè cruor è naribus fusus solvit. Frigidifudores in acuta febre, mortis nunci: in mitiori, longæ invaletudinis sunt. Magnam quoque febrem inesse, dentes testantur lenta sorde onerati. In febribus spiritus offendens, malum, itemque ex somno pavor, aut nervorum disten-

*Pericu-
losæ fe-
bris no-
ta-*

tio. Mali etiam morbi notæ sunt, sopor, vigilia, caligo oculorum, singultus, lassitudo, exudatio, novusque post hanc exortus calor, inquietudo diebus nata judicialibus, simulque ex rigore citra sudorem judicationemque refrigeratio, aut rigorem exiguus secutus sudor. Malæ item sunt sanguinis stillæ pusillæ, & atra bilis per initia febris sursum vel deorsum erumpens. Sed & vultum intueri oportet, qui, si in acuta febre nimium torvus est, aut minus, quam par sit, pro acumine morbi foedatus, aut præter rationem benè habitus, tutus non est. Malus etiam censetur esse vomitus sinceræ vel pituitæ, vel bilis, magisque si viridis humor aut niger prodit.

Nocet etiam alvus ex toto suppressa, & rursus adeò soluta, ut conquiescere ægrum in cubili non patiatur, maximè si eadem hæc perliquida, aut albida, aut pallida, aut spumans est. Mala etiam

judicatur exigua, tenax, levis, alba, vel quæ livida est, aut biliola, aut cruenta, aut pinguis, aut insueti foetoris. Ejusdem notæ alvus est varia, quæ strigmentum, cruorem, bilemque viridem fundit; aut quæ post longam ægritudinem sincera est. Lumbricos quoque per febres de-
jici tutum non est, præcipuè ante mor-
bi declinationem. Sed sub acutis febri-
bus vivos eos excludi haud juxtâ pericu-
losum est, potissimum ad meliorem jam
valetudinem inclinante homine; at vitæ
cassos exisse, prorsus inutile est, idque
declinante morbo. Per principia tamen
febrium mortuos eos esse præstat: vivi
enim pestilentiae injiciunt suspicionem.
Mala quoque in febribus potissimum a-
cutis urina diluta, atque alba est, ut quæ
periculum insaniae prælagit. Æquè inu-
tilis est ea, in qua quod subsidet, sub-
rubrum, aut lividum est: aut tenuibus
filamentis furturibusve quid simile repræ-
sentat. Non bonum quoque si num est,
post appetentiam, postve longas febres,
cibum fastidiri cœpisse, aut multos su-
dores esse, maximèque frigidos, aut eos
ferri non toto corpore æquales, sed circa
caput, & circa cervices. Adhæc sudo-
ribus febrem non finiri, aut post hos

horrorem incidisse. Auriginem denique febre exceptam esse, utique si dura præcordia sunt. Æquè horrendum est febricitantem multum atque crebrò spirare, itemque sexto die cœpisse inhorrescere, difficulter ferre morbum, præterque rationem sine vasorum inanitione imbecillum esse, immoranteque febre insudare, aut modò frigidum, modò calidum esse variisque sæpe coloribus affici. Tum etiam quod aliqua parte corporis abscessit, id non maturescere, sanitatemque non consequi, aut ipsum inter hæc ægrum passis manibus, pedibusque supinum cubare, somnum totis noctibus non videre, quantumvis interdiu is accedat: pejusque est, nequè per noctem, neque de die quietem esse ullam potuisse, sed continuam urgere implacabilemque vigiliam, aut contrà jugi ægrum somno sopiri. Atque hæc quidem sunt quæ terrere metu periculosæ febris possunt.

*Longæ
febris
nota.*

At longam fore hanc existimandum est, ubi tumida præcordia sunt, præsertim, si dura quoque hæc & dolentia, & inflammata, & intenta sunt. Talia enim non modò longum vicium, sed periculo quoque esse opportunum, denunciant. Febris etiam inveterascit, ubi tubercula

aut

aut labores incumbunt in articulos : Ubi dolor inguina & glandulas exercet : Ubi frigidus sudor in febre non acuta circum caput tantum oritur , & circum cervices : Vel ubi aliquis sudor alius febrem neque levat , neque finit. Ubi exortus abscessus non sanescit. Ubi urina alias alia mejitur. Ubi corpus variè , modò calore , modò frigore , modò hoc colore , modò alio afficitur. Ubi idem pro morbi spacio , parum emacrescit. Ubi multo tempore posteriores accessiones eadem qua priores hora incipiunt , æqueque sunt , & vehementes , & durabiles. Ac his quidem notis cognoscere longas febres licet , quæ si jam diutius secutæ *Abscessus* trahunt , neque vitam adimunt , scire *præsentia* licet expectari abscessum oportere , eumque in articulorum aliquem , præcipuè *gla.* inferiorum , cum tumore , atque dolore decubiturum. Id tamen junioribus tantum accidere consuevit , & per febres non intermittentes quæ jam vigesimum diem superaverunt. Portò senioribus autem & febre occupatis intermittente , & incerta , non quidem abscessus , sed ferè incidere quartana solet : utique si in proximo quoque Autumnus est. Ut enim iis qui infra trigesimum sunt annum ,

num , potius abscessus fiunt , ita quarta
na eos magis excipit , qui eum gradum
ætatis superaverunt. Nosseque oportet
abscessum magis hyeme consuesse fieri,
longiusque durare , & minus reverti.
Haftenus ea signa posuimus quibus malæ
febris pericula , vel longæ tædia signifi-
cantur Itaque proximum est eas modò
notas sequi , quibus salus promitti ægro
potest. Ergo hanc expectare quam dico
salutem , non sine causa licet , si aurigo
vel septima febris die , vel nona , vel un-
decima , vel decimaquarta mollibus præ-
cordiis oritur : si æger morbum facile
sustinet , nulloque conflictatur incom-
modo , si mente constat : si neque som-
no , neque vigilia nimium urgetur , noctu
dormiens , & vigil interdiu : si post som-
num firmior est : si non difficulter spirat ,
quod certè signum omnibus in febribus ,
quæ intra diem finiuntur quadragesimum ,
principem inter bona locum habet. Si
denique constat appetentia , vel ab ini-
tio servata , veletiam post cibi orta fasti-
dium. Si præcordia sine ullo sensu do-
loris æqualiter mollia , parte dextra , si-
nistraque sunt. Jam etiam ubi vomitus
incidit , si mistus is ex bile & pituita fuit:
si id quod in urina , vel subsidet , vel in

*Salutis
in fe-
bribus
præsa-
gia.*

me-

medio suspenditur, vel superius innatat, album, leve & æquale est: præstabiliusque fuerit nubeculas ad imum matulæ consistere. Si insuper dejectio alvi mollis est, & probè figurata, & ruffa, neque supra modum foetens, ejusque moles modo assumpti cibi respondet & eruptio eodem penè fit tempore quo per secundam valetudinem. Si totum corpus æqualiter molle & calidum est, æqualiterque insudat. Si sudore febris conquiescit: si æger facilè convertitur: si decubitus ei naturalis est: si ea quæ corpore efferuntur, sine multa molestia, & post concoctionem efferuntur. Si post eandem concoctionem, labra, nares, aut linguæ extremum leviter finduntur, pustulisque minutis exulcerantur: si denique concoctio citò fieri incipit cum pulsu constanter bono.

Tempora etiam febrium sic ex modo accessionum distinguuntur. Quum plures accessiones æquè vehementes, & æquè sunt diuturnæ, eademque hora repetunt, scire licet principium febris nondum transisse. Quod si sequens accessio *Principium febris.* tempora solita prioris antevertit, eademque magis, & diutius affligit jam tum esse febris incrementum cœpit. Status
au-

Declinatio.

autem ferè esse solet , cùm accessio vehementissima est , neque antevertit tempora prioris , neque post sequitur : verùm omnia ex toto penè sunt æqualia , quæ ad duos circuitus pertinent. At verò quoties hic cunctari accessionem dico , aut etiam antevertere , magis id ita intelligo fieri , quàm exigit circuitus febrilis proportio. Qui enim sic non fiunt motus , ferè naturam febris sequuntur , non tempora definiunt. Id quod haud rarò contingere solet tertianæ febris , & quotidianæ , & quartanæ , quæ semper donec ex toto solverentur , anticipaverint. Cæterùm , si cunctatur accessio , breviorque ac mitior superiore est , constat utique tum febrem cœpisse declinare. Pro materiæ quoque ratione unde febris fit , tempora ejus captantur , itemque ex iis casibus quæ præter naturam incidere per febrem solent , συμπτώματα Græci vocant. Siquidem principium febris cruditas materiæ facit : incrementum , fieri cœpta concoctio : statum , eadem absoluta : declinationem , concoctæ materiæ vacuatio , vel translatio. Casus etiam quos modò dixi , omnes per principia februm atque declinationes mitiores ; per incrementa , perque status atrociores

ciores sunt. Illud etiam his addi quæ hæcenus comprehensa sunt, aliquo modo posse videatur. Quæ febris die non judiciali sine bonis signis subito finita est, ea ferè revertitur, multòque magis, si commissus aliquis in victu error est. Sed ne hoc quidem etiam præteribo, mitissimas febres, notisque fretas securissimis, quarta die vel antè solere conquiescere: pravissimas autem & casibus terrentes horrendissimis, eodem spacio temporis, vel antè occidere,

His ita animadversis, proximum est febres pestilentialis observationes proponere.

*Febris
pesti-
lentialis.*

Ubi autem ea nondum quidem est, verum ut ne incumbat, metuitur, talia contingunt. Ver atque æstas calida, humidaque, austros sine ventis exhibent, cælum frequenter eodem etiam die mutatur, fitque modò calidum id, modò frigidum, modò nubilum, modò serenum: sæpius tamen nubilum, pluvioque proximum, at nihil pluens tamen. Accedit multa insectorum animalium copia, multusque quadrupedum interitus. Insueti etiam ignes per noctem in aëre cernuntur, ortique subinde Cometæ calamitosam hanc portendunt lue. Ubi
raptus

raptus aliquis jam morbo est, hæc incidunt. Bubones sine causa manifesta, vel ponè aures, vel sub alis, vel frequentius in inguinibus, aut certè carbunculi variis corporis locis, purpureave exanthemata subito exoriuntur. Inter hæc febris invadit continua, atque acuta, sub qua extimum corpus vix incalescit, & sensu interdum frigoris afficitur, interiora autem gravi incendio uruntur, ipse homo cum animo mœsto ac pleno malæ spei lassus, segnisque fit, & ineluctabili dormiendi urgetur necessitate. Ejus ferox vultus, & qualis temulentorum esse solet incertus, atque turbidus est, spiritus malè olet, ac difficulter trahitur, dejicitur cibi cupiditas, os amarescit, ingens oritur sitis: Fitque frequens & nausea, & vomitus, quo optimi etiam alimenti speratus fructus corrumpitur: Pulsus exiguus, languidus, celer, frequens, & inæqualis est: Alvus foetida atque grave olens. Urina aliàs sicut jumentorum turbida, cruda, crassa, foetidaque est, alias qualis in homine sano sine vicii nota mejitur. Siquidem ubi simplex hæc febris è sublimi mundo mortalibus immissa est, neque putridæ implicatur, ferè obscuris in-

Innititur signis, sic ut neque vehemens vel incendium, vel fitis, vel inappetentia afficiat, sed & urina concocta, omnibusque absoluta numeris sit. Etenim homo ad speciem non admodum æger crebra animi defectione, vomituque labefactatur, ac tandem, subita raptus syneope, inopinanter exstinguitur. Porro omnis pestilens febris, ut per se semper tota perniciosa est, sic tum demum, & celerem, & certam mortem affert, cum opproßo intus corde, nihil foris, vel bubonis, vel carbunculi, summo corpore efflorescit: aut si quid efflorescit, inde tamen neque morbus, neque æger levatur. Quinetiam æquè mortiferum est semel natum bubonem, vel carbunculum rursus intrò delatum, repentè delituisse, itemque foetente spiritu, ac frigescentibus extremis creberrimum vomitum, atque ipsam syncopen incidisse. Illud quoque novisse non inutile est, satis incerta sub hoc morbo salutis esse prælagia, adeò ut propter bonas notas plenum spei atque promissi medicum mors sæpe inopinata decipiat.

Quoniam acutis. magnisque morbis *Signa*
plerisque omnibus febris jungitur putri- *judica-*
da, adeòque judicatio accidit ea quam *tionis.*

απιστοι Græci dicunt , (longi enim morbi itemque alii febris expertes , & parvi paulatim sine judicatione solvuntur) non abs re facturus videor , si febribus observationes quoque judicationum addidero.

Ut cœli variæ tempestates , sic etiam morborum judicationes signis quibusdam (*αποτομα* Græci dicunt) præmonstrantur. Ea quidem hæc sunt, Delirium, sopor, vertigo, oblivio sensuum, inusitatus error, dolorque capitis, cervicis, stomachi, præcordiorum, aliarumve partium insignis; adhæc aurium susurrus, falsi oculis objecti splendores, invitæ lachrymæ, frequens nausea, æstus, sitisque solito vehementior, pulsus repente ordinis redditus expers, & inæqualis, urinæ suppressio, alvi insueta murmura. Inter has turbas ipse æger totus angitur, & in omnem partem corporis sese varie jactat, idemque vociferatur, exilit è cubili, omnia furioso similis. Id temporis accessio febris vehementissima est, ferè horæ spatium priorem antevertens, inciditque magnus & insolens quidam ipsa cum accessione rigor, hinc subito (si quidem bona futura judicatio est) profusus erumpit sudor, aut sanguis ubertim è naribus fertur, aut vomitus multi humoris

moris incidit, aut alvus multum solvitur, post quæ febris incipit tota conquiescere. Horum autem signorum aliqua præbetur significatio superiore nocte, quum postridie febris judicatione solvitur, idemque de die fit, si proxima nox finem morbo aliquem imponet. Inquietam enim esse noctem oportere, quæ cum antecedit diem, quo die futura accessio, omnisque absolvenda judicatio est, vetustissimus autor Hippocrates proposuit. Illud quoque novisse licet, nocturna signa diurnis esse atrociora, itemque ipsorum adeo signorum alia esse judicationum duntaxat, alia harum, & signa, & causas putari. Sub his sudationes, vomitus, dejectiones alvi, mictiones, & sanguinis profluvia sunt: sub illis deliria, vigiliæ, sopores, lachrymæ & hujusmodi. Utrisque signis ita comparatum est, ut post notas concoctiones salutem promittant, substante cruditate perniciem minentur. Quare bona ea esse non nisi vigente morbo, aut paulò antè possunt. Scilicet eo tempore humoribus maturitas accessit. Itaque non sine causa Hippocrati placuisse video, judicationum celeritatem concoctionibus significari. Eadem signa, incipiente

C 2

mor-

morbo, penitus exitiosa sunt, increscente autem eoque maligno morbo, mortem quoque minantur, at sub levioris morbi incremento, imperfectam fore judicationem ostendunt. Natura enim corporis, ubi ex morbo quis penitus convalescet, judicationem omnem tantisper linquit, differtque donec absoluta materiæ sit concoctio. At si morbo fractus homo succumbet, semper multò ante tentare natura judicationem conatur, ejusque exhibet non obscura indicia. Adeò apparet semper bonas notas concoctionis esse, certæque nuncias salutis: verum judicationis signa parum firma habere, diversaque (prout cruda, concoctave morbi materia est) ab iis & significari, & effici. Porro observare operæ pretium est, quo demum genere vacuationis, quave via futura febris judicatio fit, ut hac quoque parte instructum, probatumque sit medici judicium. Ergo si febris acuta est, propterque celerem concoctionem, primis judicatio fit cir-

*Signa è
naribus
fluxuri
sub ju-
dicatio-
ne san-
guinis.*

cuitibus, scire licet excretionem potius aliquam quàm expectari abscessum oportere. Primùm itaque ubi futura aliqua vacuatio est, incidere fluxus sanguinis è naribus solet, si præcordia, vel dextra,

vel

vel læva sine dolore intenduntur, simulque spiritus fit difficilis, & caput pulsante, atque distendente affectum dolore exardescit, & facies tota, potissimum oculi, nares, ac malæ rubescunt: si hebes fit visus, vel objectis quasi splendoribus eluditur: si collum dolet, & tinnunt vel obsurdescunt aures: si illachrymant repentè oculi, & rubescunt: si venæ in temporibus vehementer agitantur: si nares velut extenuantur, & pruriunt: magisque, si dolor juxta faciem atque tempora tum quoque gravis versatur: adhæc, si pulsus præterquam quod ut in omnibus vacuationibus altus & vehemens, ita hic etiam undosus est. Frequens hæc vacuatio febribus est ardentibus, & ei insanix, quam græcè *φρενίτις* dicunt, itemque acutis, continuisque, vel sine febre etiam, capitis doloribus, præcipuè si frontem hi atque tempora occupaverunt, adhæc omnibus quæ sub præcordiis fiunt, calidis & acutis inflammationibus, maximèque jecinoris & lienis. Cujus rei certior fuerit eventus, si æstas est, ipseque ætate florens homo nondum quintum & trigessimum annum superavit. Ut verò acutis maximè febribus, atque ei quam proximè dixi in-

sanix, sanguinis è nare profusio familiaris est: sic minimè aut lethargo, aut pulmonis inflammationi, quam περιπνευμονίαν Græci vocant. Inter hos morbos anceps, mediaque est lateris inflammatio, πλευριτις græcè dicta, minus quàm priores profusioni sanguinis opportuna, magis autem quàm posteriores.

Signa
vomi-
tionis.

Cæterum expectari vomitus debet, si toto capite gravi, ac vertiginoso, oculisque caligantibus, afficitur doloris morfu stomachus, & crebrò nauseat; idque cum ore ferè amarescente, & multæ, tenuisque salivæ sputo, & labri inferioris tremore. Tum quoque hypochondria antè, veluti suspensa tenduntur, spiritumque premunt, ipse pulsus contractus, atque durus est. Certior autem vomitus erit si febris tertiana subest, homoque quintum & trigessimum ætatis annum excessit, si æstas est, si rigor incidit, simulque loca inferiora præcordiis refrigescunt. Jam verò alvus profluet, si humor ad interiora corporis movetur, neque tamen vomitus aliquis sequitur, aut plenior urina fertur, magisque si alvus tum & biliosior, & fusior est, quàm antè judicationem fuit: si denique æger rarò cruorem per secundam valetudinem

Signa
proflu-
vii alvi.

è naribus fudit, raròque insudavit, sæpè
 alvo cita fuit, & potare frigidam aquam
 consuevit. Ubi jam autem in propinquo
 dejectio est, venter murmure quodam
 fluctuat, rugitque & pungitur: mox
 gravitas, vel dolor intus oritur, primùm
 circum lumbos, hinc ad imam partem
 ventris delapsus. Hoc ipsum non malè
 observasse Hippocratem constat, qui per
 febres in dolore præcordiorum submur-
 murante, si lumborum dolor superv- *Sudoris*
 nit, alvos ut plurimum humectari solitas *nota.*
 esse scripsit. Cæterùm sudores erum-
 punt alvo & urina sub firmis viribus
 compressa: maximè si tum etiam nulla
 vomitus nota antecessit, quæ si est, tum
 eo ipso vomitu, tum sudationibus judi-
 catio perficitur. At etiam certior fue-
 rit sudor, si cum superioribus signis in-
 crescens accessio (ut in febris ardente, si-
 milibusque gravibus morbis incidit) deli-
 rium intulit, simulque summa corporis
 magis incalescunt, atque rubent, vapo-
 remque quendam emittunt calidum, qui
 antè non fuit. Tum pulsus simul undosus,
 & insigniter mollis fit, urinaque
 crassior, & penitus biliosa. Firmior quo-
 que sudoris prædictio fuerit, si æger sub
 judicationem balneis sese prolui sub in-
 somnio

somnio putat, id quod mihi quoque per acutam febrem sudaturo contigisse memin. Sudores omnibus febribus familiares sunt, maximèque acutis perurentibus. Insania etiam, quam græcè *φρενίτις* appellari dixi, sudores, si boni sunt, expetit. Bonos esse sciendum est, qui ex capite uberes calidique feruntur, reliquo simul insudante corpore. Non inutiles quoque sudores esse (si boni sunt) perhibentur omni acutæ inflammationi quæ sub præcordiis consistit. Porro utrum fusis, vel hæmorrhoidibus, vel fœminarum mensibus, judicatio futura sit, ex utriusque affectionis propriis signis innotescet.

At verò abscessu quoque nato, solvi febris potest: ubi is generabitur, hæc *Abscessus præsentia.* ferè incidunt. Morbus diu trahens, paulatim non solvitur, sed permanet eodem febris & doloris tenore: ita tamen ut alia salutaria signa adsint, nihilque de ægri vita dubitetur. His accedit quòd nulla evidens facta vacuatio sit, quòd cunctentur concoctiones, quòd subitus dolor, & lassitudo, & debilitas, & sudatio alicujus fuerit particulæ vilioris, quòd ipse morbus non lethalis, tardè moveatur, vigesimumque jam egressus diem

fit

fit, quòdque pulsus sit bonus, & virium robur non infirmum. Inter hæc autem certior etiam futurus abscessus est, si cruda diu urina atque tenuis fertur. Sub his autem casibus abscessûs metum detrahit urina multa, crassa, alba, in qua quod residet, perquam multum est. Scilicet tum malum paulatim concoctione solvitur, tandemque sine vacuatione alia evidente, sive abscessu conquiescit.

Qui juxta aurem abscessus inhærescit, (Græci *παρὸτιδα* vocant) his notis futuris esse cognoscitur. Spiritus repentè, nec tamen diu difficilis est, hinc protinus capitis sequitur gravitas, atque dolor, altiusque sopor, & surditas. Παρὸ-
τις.

Est hic casus febribus acutis, atque non valde longis frequens, soletque interdum, & lethargum, & insanix genus, quod *φρενίτιν* dicunt, similiaque capitis vitia judicatione finire. Quum vero morbus multa occupatur vetustate, & certis de causis expectatur abscessus, notæque desunt parotidis, quæ tum profectò penè nunquam incidit; sed & in partibus corporis inferioribus dolor aliquis, vel gravitas, vel tensio, vel ardor est: scire licet abscessum his locis oriturum ad articulum esse. Illud quoque hîc

Abscessus in inferioribus locis.

repetere , quæ superioribus locis dixi , operæ pretium est , protinus de abscessu haberi opinionem oportere , ubi vicesimum diem febris exegit : tum hunc magis hyeme fieri , tardiusque cessare , & minus reverti consuesse : adhæc frequentiore junioribus esse nondum annos triginta natis , senioribus autem minus sub febre quantumvis longiore accidere , sed his quartanam potius sub hujusmodi casu imminere , utique si quæ urget febris , non continua , sed vago incertoque intermittens circuitu , diu ad Autumni usque tempus traxit. Hoc etiam rectè notatur , febrem etsi diuturnam , quæ tamen ab rigore incipit , & sudore solvitur , qualis tertiana , aut quartana est , rarò in abscessum desinere. Purgatur enim singulis accessionibus morbi materia. His adde abscessum omnem in parte corporis inferiore tutiorem esse , qui lentam , longamque febrem sequitur , quam is qui in superiore corpore ponè aures emergit. Talis enim ferè proprius morbis acutioribus est. Jam verò si orto abscessu , aliqua febris manet , isque foras non resolvitur , scire licet , hunc non ante vigesimum diem , sed totum intra eum ipsum , & sexagesimum suppuratum iri.

Quod

Quod si illud quoque incidit, ut priusquam suppuret abscessus, immorante etiam solita febre subsederit, periculum *Abscessus optimus*, utique si is ponè aures fuit. Tutissimum autem existimare abscessum oportet, qui inferiorem partem corporis occupans, quàm longissimè à morbo, & à vitæ abssistit penetralibus, & qui amplo inclusus loco, materiam morbi omnem continet, quique maximè foras emergens, non ægrè erumpit. Talis enim minimè reverteri priorem morbum finit. Bonus quoque est acutus & fastigiatus, & æqualiter maturescens, deorsum vergens, non obdurus, non bifidus. Pessimus is est qui interius tendit, sic ut hic nullus exteriori cuti accedat color. Jam si foris quoque prominet abscessus, scire licet pessimum esse qui maximus, quique planissimus est. Aliquid etiam affectus animi facere ad judicationis modum solet. Metus enim proclivem alvi dejectionem, aut vomitum, aut urinam reddit. Lætitia contrà magis sudores fundit. Illud quoque observatione dignum videatur sæpe judicationem pluribus vacuationibus, non semper unica perfici consueisse: ut si ea fortè per febrem fieri ardentem, san-

sanguine è naribus fuso , coeperit , quam
 mox effusi sudores complent , absol-
 vuntque.

*Optima
 judica-
 tio.* Porro judicationem perfectam esse
 decet, & fidam , & certam , & secu-
 ram , & evidentem , itemque prius in-
 dice die nunciatam , bonam denique &
 salutarem. Hanc profectò concoctio-
 nes comitantur , potens dies judicialis ,
 & quod morbo convenit , excretionis
 non obscuræ genus. Proximè autem
 antecedit pulsuum inæqualis motio : in
 qua plures ictus sunt magni , quàm par-
 vi : plures celeres , quàm tardi : plures
 moderati , quàm crebri : plures vehe-
 mentes quàm languidi , cum rythmis pa-
 ribus moderatis , vel celeribus. Sequi-
 tur autem melior vultus , expeditiorque
 spiratio , & major in convertendo levan-
 doque corpore vis , & pulsuum ad justam
 mediocritatem , æqualitatem , ordinem-
 que reditio. Bonam quoque sperare ju-
 dicationem facit genus morbi , quod sæ-
 pius , faciliusque per eam ipsam finitur ,
 qualis febris est ardens , qualis tertiana ,
 & hujusmodi.

*Utrum
 futura
 sit ju-
 dicatio,
 necne.*

An verè per febres futura omnino ju-
 dicatio sit , nec ne , sic habetur. Si
 magnus est morbus , multumque semper
 &

& anticipantibus , & incrementibus accessionibus movetur , si inter hæc viribus natura valet , & concoquitur promptè morbi materia ; si denique ætas , & natura hominis , & ipsum tempus anni , & morbi genus futuris judicationibus consentiunt : scire licet ingentem morbi mutationem fore , idque eò citius , quò hæc ista fuerint potentiora. At si sub infirmo corpore magnus est morbus atque pravus , hujusque diu persistit cruda materia , reliquum est oppressâ naturâ mortem sine judicatione sequi oportere. Ferè autem sic incidit , ut ubi notæ judicationis adsunt , ibi judicationem seu bonam , seu malam fieri necesse sit. Has notas dico , non eas quidem omnes , quæ morbo succedunt , sed quæ incipienti judicatione , vel paulò antè apparent. Quòd si hoc etiam fit , ut cùm signa judicationis existunt , ipsa tamen non protinus sequatur judicatio ; scire licet , vel hanc post instare difficillimam , vel hominem interiturum. Magna verò ex parte futuræ judicationis bonæ certiora prælagia sunt , malæ non perinde firma , utraque in acutis morbis semper dubia. Quinctiam signis bonis , ubi morbus viget , rutò
li-

*In quæ
tempo-
ra, judi-
catio,
itemque
ipsa in-
cidat
mors.*

licet fidere, malis non item, nisi cor-
pus viribus careat. Nemo profectò mor-
bum acutum sine judicatione evasit,
multi repente sine hac interierunt. Ut-
que judicatio salutaris non nisi juxta vi-
gorem morbi est: ita mors incidere, &
incipiente, & incremente, & consisten-
te morbo potest. Declinatio autem ma-
li cujusque nulli unquam exitium, aut
judicationem attulit, quoniam qui mor-
bus semel vigorem superavit suum, is si-
ne judicatione permanet, sensimque (nisi
quis incidit error) solvitur. Moritur au-
tem aliquis interdum incipiente febris ac-
cessione, ut per mortiferas internarum
partium inflammationes, perque febres
è crassa natas pituita, oppressio intus,
præfocatoque naturæ calido: tumque re-
frigeratus æger non recalescit, pulsus
vermiculans fit, totusve deficit, ipseque
æger profundo oppressus somno, exani-
matur. Interdum etiam incremente (quod
rarò fit) accessione, interitus accidit,
frequentissimè eadem consistente: scili-
cet magno morbo naturam superante:
delirat autem id temporis æger, animo
ac manibus violentus, exilitque cum im-
petu, & maximo æstu extorretur: his-
que magnis victus malis, accedente tan-
dem

dem animi defectione atque syncope extinguitur. Rarò aliquis declinante febris accessione moritur, quod tamen ubi incidit, anima deficit, toto naturæ calore cum febrili unâ expirante; ipse æger pauco, ac tenaci exorto sudore surgens, vel etiam quiescens, protinus emoritur. Illud ubique perpetuum est, eo tempore accessioneis, ægrum mori consueſſe, quod omnium est difficillimum.

Videar modò omnem judicationum absolviſſe observationem, niſi dierum ſupereſſet explicanda animadverſio, quibus vis obtigit febres judicatione finiendi. Unde ipſi etiam ab Hippocrate (quorum is author eſt) *ἡμέτεροι* nominantur *Dierum
judicia-
lium ra-
tio.* Sunt autem hi qui ſequuntur, tertius & quintus, & ſeptimus, & nonus, & undecimus, & quartusdecimus, & ſeptimus decimus, & viceliſimus. Explent hunc numerum vicenarium tres ſeptimanæ: ſic ut dies octavus ſecundæ ſeptimanæ principium, quartusdecimus autem terminus ſecundæ, exordiumque tertiæ (ſic judicante Hippocrate) habeatur. Jam quoque hi ſeptenarii dies per quaterniones digeruntur: eſtque quartus dies primi quaternionis noviſſimus, & ſecundi primus. Tertius au-
tem

tem quaternio à septimo orsus die, clauditur undecimo, quartus hinc incipiens quaternio quartodecimo finitur die, hic ipse dies initium quinti quaternionis est & decimus septimus finis, ab hoc sextus quaternio incipit, & vicefimo terminatur: adeò apparet hunc ipsum vicefimum, & sexti quaternarii, & tertii septenarii novissimum esse. Porro eadem proportio dierum est judicialium in secundo vicenario: hoc est, à vicefimo die ad quadragesimum, quæ in primo fuit. Post exactum autem quadragesimum diem, ut non sunt amplius morbi acuti, ita nec amplius etiam imparibus diebus, five quaternariis, five septenariis, sed omnino partibus judicialio perficitur, singulos dico vicenarios, sexagesimum scilicet, octuagesimum, centesimum, & sic deinceps. Illud quoque novissimum oportet, non eandem diebus judicialibus vim esse omnibus. Etenim septenarii omnium sunt efficacissimi, post hos quaternarii, qui singulis septenariis suis sunt: inde illi, qui in medio sunt utrorumque, Medici intercurrentes vocant. Ex judicialibus autem boni hi sunt. Septimus, decimus quartus, nonus, undecimus;

vigefimus , feptimus decimus , quintus quartus , tertius. Mali autem , & parum tuti , minimèque judiciales funt sextus , oétavus , decimus , duodecimus , sextusdecimus , undevigefimus. Tertiumdecimum quidam ancipitem eſſe , mediumque inter bonos & malos volunt. Jam verò , etſi non æquè potenter , omnes tamen judicare acutum morbum impares dies poſſunt , qui primo continentur vicenario , quoniam eo ſpatio morbus vehementius movetur : poſt autem is ipſe magis remittitur , miteſcitque. Ex quo incidit , ut in ſecundo vicenario vix ulli dies præter ſeptenarios , puta vigefimum ſeptimum , & trigefimum quartum , & quadrageſimum , judicare aliquid poſſint. Porro judicialium dierum , alii aliorum ſunt judices , quos ideo contemplatorios Hippocrates vocat , quoniam hi quid proximis judicialibus futurum ſit , certis antè notis oſtendunt , prænunciantque. Itaque indicem ſeptimi quartum eſſe , is autor obſervavit : itemque decimi quarti undecimum & viceſimi ſeptimumdecimum. Ergo ſi primo die ſine ulla periculi ſuſpicionè protinus acuta febris eſt , & urinæ evidens accedit concoctionis nota ,

D

ta ,

ta, extendi judicatio non supra quartum diem potest. Ut contrà, si multa primo statim die concurrunt exitii signa verisimilia, æger utique infra quartum succumbit. Rectè enim Hippocrates judicavit, iis qui brevi perituri sunt, maxima quæque ab initio accidere oportere. Jam etiam si septimodie judicatio futura est, rubram urinam nubeculam quarto exhibet, cæteraque pro ratione signa sequuntur bona, nisi tamen errore aliquo, vel medici, vel ægrotantis, judicatio cunètetur, cadatque in nonum, vel in undecimum. Propter errorem enim, in iis quidem morbis, quibus periculum deest, judicatio tardatur: in lethalibus, constitutum anticipat diem. Adhæc, si nihil etiam judicatum die undecimo est, fieri judicatio ante vigesimum non potest: si moderatiora ad septimum usque contingunt, potest. Qui verò morbi ad decimum usque quartum omnino cruditatem habent, & lentè admodum moventur, non ante quadragesimum judicatione finiuntur. Quamadmodum enim dies judiciales potentiores sunt; ita & indices. Illud quoque notare non inutile est, ad quartum usque decimum

magnos esse morborum impetus, minores his à decimo quarto ad vicesimum: morbos autem qui ab hoc die ad quadagesimum immorantur, paulatim vim omnem remittere, ut qui quadagesimum superaverunt, prorsus languescere, longaue potius concoctione, vel abscessu, quam solvi judicatione posse. Postremò Hipocrates post diem centesimum, alios quidem morbos conquiescere dixit septem mensibus, alios totidem annis, alios, ut verisimile est, binis annorum hebdomadis & ternis.

Proximùm est post febres quæ humorum vitio fiunt, earum quoque proponere observationem, quas *intus Græcæ* *Febris hectica* dicunt. His præficcus, squalidus, & perennis calor est, sineque dolore constanter æqualis, sic ut ne in febris quidem esse se, æger existimet. Tametsi increescere aliquo modo calor horâ unâ, aut alterâ post sumptum cibum solet, quo concocto, ad pristinam æqualitatem febris redit: ut primum injecta corpori manus est, calor occurrit obscurus: sed tandem sub longiore mora acris fit, atque mordax. Pulsus debilis, parvus, ac frequens: sed sumptis epulis, altior atque major est. Ferè

etiam arteriis plus caloris (si has tangas) quàm proximis locis subest. Cutis vehementer arida, corpus ipsum imbecille, & languidum est. Atque hic quidem primus esse gradus hecticæ febris censetur; quæ curationem non difficilissimam habet; verùm haud ita facile cognoscitur. Secundus esse gradus potest, ubi siccitas major corpori dominatur, sic ut vehementer id liquefcere, consumique incipiat.

Tum urina pinguitudinem habet, telis araneorum persimilem: Pulsus durus tensusque est, debilior tamen atque minor, quam primo febris gradu: Cutis quoque corporis magis dura, aridaque est. At verò ultimi gradus hæ no:æ sunt: Cavantur oculi, & quæ juxta sunt ossa prominent. Iidem oculi arida forde onerantur: palpebræ ægrè moventur, crebròque, ac si homo dormiret, sine somno tamen connivent: cutis in fronte fœca duraque est: tempora collapsa sunt: ipse vultus vividi coloris gratiam amisit: capilli celeri incremento inaufcunt: hypochondria sursum videntur ad thoracem convulsa: venterque totus contractus, & inanis, sic ut, eo denudato, neque intestinum su-

superesse ullum, neque viscus existimetur. Pulsus maximè durus est, itemque debilis, & frequens: Urina velut oleum suprà pinguis: Ipsum corpus adeò contabuit, ut ossium ubique extrema, maximè autem in scapulis, promineant, ac veluti grandescant: Cutis instar corii dura est, non mollis atque rugosa, qualis eorum esse solet, qui aliis de causis extenuantur. Ferè etiam pediculorum per hunc morbum molesta copia est. Hujus ordinis hecticam ut facillimè quidem noscere, ita verò nunquam sanare est. Ea enim planè est marcida (*μαρσμάδης* Græce appellata) certamque perniciem afflictis affert. Rarò autem simplex esse hæc, sic ut alteri feбри non misceatur, solet. Sæpè ab acuta febre incipit incendio humorem corporis insitum depascente fitque tum id genus febris, quam colliquantem dixerunt. Repentè autem satis ea & nascitur, & occidit, id quidem brevi efficiens, quod simplex sensim, longoque spatio: Lentè enim hæc ipsa movetur, pervenitque lentè ad summum. Itaque ægrè quoque per initia, antè quàm huc ventum sit squaloris, cognosci solet. Ferè autem quibus hectica infecta est, calida,

ficcaque natura obtigit : multique vel moerores , vel labores , vel inedia , vel fitis antè fuerunt. His enim ferè causis levioribus , febris ephemera : vehementissimis , hæctica movetur.

ἢ τὸ σωμα-
ματος
ἀτροφία.

Proximum hic malum est τῆς ἀτροφίας , sub quo , quia homo sumpto alimento non alitur , summa oritur macies , sensim , ac sine evidentibus causis corpore exarescente. Id vitium inprimis grave est , & quia vires vehementer atterit , tandem tollere etiam hominem , nisi curatione occurratur , potest. Ferè autem hæcticae jungitur febris , & cordis affectibus , & pulmonis exulcerationi , itemque gravibus ,isque calidis ventriculi , lienis , aut jecinoris vitiis.

Facilè tum ex hoc ipso morbo tum ex hæctica , in corporis transigitur marcorem , quem Græci μαλασμόν appellant , quod ubi incidit , nulla curationis reliqua via est.

Ut veró in hoc isto maciei vitio , prorsus non alitur corpus : ita in alio , quod Græci καχιάν , nos pravum habitum dicimus , malè alitur : Idem corpus sub-
tumidum , laxum , molle , grave , segne-
que est , & vividi coloris gratiâ caret ,
virore quodam albicans : ipsum adeò im-
potens

potens est, crura etiam interdum eundo vacillant: Incipiente morbo vitatur cibi concoctio, incolumi etiam appetentiâ, spatio tamen hæc quoque offenditur. Spiratio debilis ac rara, alvus varia, & inæqualis est. Suntque hæc signa ei ferè cachexiæ propria, quæ à substante humore, cruda, seu pituitosa nominatur, quæque sæpissimè id hydro-
 pis genus antecedit, venturumque præ-
 nunciat, quod ^{λευκοφλεγματίαν} Græci
 nominaverunt. Hoc ipso vitio maximo
 capiuntur pueri & senes, at verò ado-
 lescentes, & juvenes rarius sic laborant
 & citius curantur. Magis autem ita af-
 ficiuntur hi, qui ex longo morbo con-
 valescunt: utique, si id quoque tempo-
 ris, duro tumore, quem ^{σπύλλον} Græcè
 dicunt, viscus aliquod, maximèque je-
 cur, aut lien obsidetur. Idem morbus
 non rarò etiam longa excidere tormina,
 & levitatem intestinorum, & hæmor-
 thoides, menstruaque foeminarum, vel
 fusa nimium, vel compressa solet. Est
 autem præter hanc crudam, alia insuper
 ex corrupto sanguine, melancholica ca-
 chexia, quæ ferè elephantiam, tum an-
 tecedit, tum præfagit. Alimentum quod
 assumitur intus vitatur, indeque tum spi-

ritus, tum os, tum alvi, & vesicæ excrementum, itemque sudores, gravem odorem habent: tædus, squalidusque toto corpore, maximèque in vultu color est. Quibusdam etiam cutis per assiduas pustulas, aut ulcera exasperatur. Totum corpus infirmum est, & interdum tubera quibusdam partibus habet.

*Magni
lienes.*

Ex hoc protectò cachexiæ genere, eum esse morbum judico, quem expressisse Hippocrates sub magnis lienibus videtur. Siquidem interdum bilis atra ita pestilens fit corruptione, ut cùm in corpus extra lienem diffunditur, planè ejus habitum universum corrumpat. Id vitium his signis sese prodit. Os, ipseque spiritus malè olet, gingivæ vitiantur, sublividæque, & nonnunquam subatræ redduntur, ac digito, vel leviter pressæ, atrum cruorem emittunt: Eadem sic laxæ sunt, ut à dentibus discedant, facilèque eos, vel omnes interdum eximere liceat. Aliquis etiam capiti, itemque præcordiis dolor est, urgetque cibi fastidium: Crescente morbo, hæc quoque crescunt, & maculæ quædam lividæ, tanquam vestigia sugillationum, variis corporis locis efflorescunt, in brachiis scilicet, in coxis, in cruribus, sæpèqu

pèque per universi corporis cutem, adeò ut hæc quasi arquato videatur foedata. Inter hæc magna imbecillitas oritur, præcipuèque in cruribus, quorum impotentes compages fiunt. Nonnullis, ac potissimum junioribus, crebrò sanguis è naribus fertur: quod ni fiat, in cruribus hæ maculæ, quas dixi, & interdum ulcera fiunt. Is morbus Batavis, aliisque populis, qui humiliora, atque palustria loca incolunt, frequens est, utique si his quoque alimenta crassæ duræque materiæ sumuntur. Rarissimus ficcis regionibus atque editioribus est. Omnem ætatem quolibet anni tempore nullo discrimine impetit: Senibus tamen gravior, sed frequentior juvenibus esse creditur: Quibusdam tamen locis frequentissimus pueris est: Idemque Autumno, atque Vere maximè recrudescit.

Grave inprimis, & horroris plenum vitium Elephantia est: ut primum id invasit, summa pars corporis crebris maculis inspergitur, crebrosque tumores, maximè juxta summam frontem, ac mentum habet: Maculæ modò subnigræ sunt, modò subflavæ, modò subalbidæ: Cutis inæqualiter crassa, horrida, duraque, qualis anserum est, eademque quasi

Elephantia.

squammis quibusdam exasperatur, potissimum in facie, in manibus, & in pedibus. Pili rariores omnibus locis corporis fiunt, spiritus difficulter trahitur, & malè olet, vox obscura, atque subrauca est, crassescunt malæ, mentum dilatatur, amboque ruborem exhibent, non floridum quidem illum, sed livore quodam turpem: urina, qualis jumentorum, crassa, turbidaque est. Mores denique accedunt & somni, & insomnia melancholicis familiaria: Quidam etiam sese præfocari inter dormiendum rati, cum impetu expergiscuntur, atque exiliunt. Plerique Veneris quoque ingenti desiderio capiuntur. Increcente autem morbo, hæc ista etiam increscunt, ipsumque corpus malè foedum emacrescit, os, suræ, & pedes intumescunt, hique ut plurimum frigidi, torpidique sunt. Varicosæ venæ, subnigræ, ceu verrucæ quædam, aut grandines, in linguæ radice, sub palpebris, ponèque aures cernuntur. Ubi vetustatem morbus accipit, eroditur narium media cartilago, tandemque aliquibus corrupta partibus decidit, ipsæ nares simæ fiunt, & alarum crassamento obstructæ. Itaque per has sic impeditas, ipse ferri spiritus, verbaque

que proloquentis hominis videntur, Labra etiam crassa sunt, & inversa, oculi juxta angulum interiorem rotundiores sunt, quod in iis album esse oportuit, flavescit, crassumque fit, ac quasi ungue obtectum. Ex supercilus autem præduris illis, ac penè callosis, itemque ex palpebris, & mento pili decidunt, alique horum loco longè quàm antè rariores, ac tenuiores exurgunt. Aures etiam per hæc ferè tempora acutæ fiunt, extenuantur, & eroduntur. Manuum, pedumque digiti siccis fissuris dehiscunt, atque non rarò sic attolluntur, ut sub tumore condantur. Musculi toto corpore consumuntur, maximèque juxta pollicem: ipse vultus horridus, ac, qualis Satyrorum esse fingitur, deformatur. Ad extrema ventum esse vox docet summe rauca, & cava, virulentaque manuum, ac pedum ulcera, quibus subinde hæ partes vitiatæ cadunt. Eodem penè tempore cutis quoque sensu propè in extremis pedibus caret, adeò, ut ne doleat quidem, si quis hanc, vel intromissa acu pupigit, vel ferventibus undis adussit. Novissimè febricula oritur, quæ facilè tot modis obrutum hominem tollit. Signa hæc alia in aliis, non omnia

ta-

tamen observari in omnibus solent. Scire tamen licet, inveterascentem morbum hunc depelli remediis non posse: Neque enim sola cutis, sed totum etiam corpus intus, forisque afficitur, sic ut ipsa quoque vitari ossa credantur. Contagione etiam id malum contrahi, (non solum spontè,) intimoque corporis vitio potest; idemque à parentibus transire ad natos, vel ab ipso etiam natali solet.

Morbus venereus. Haud multis ante nostram memoriam annis, horrendum, atque novum genus morbi mortalium valetudini tot alioqui casibus opportunæ, cœpit insidiari; quod, quia consuetudine Veneris contrahitur, venereum appellari posse videatur. Primùm, juxta naturalia crustosæ pustulæ oriuntur, hæque lentam saniem reddunt, & malignè exulcerantur. Accedit venereum seminis profluvium, vel inguinum venenati bubones. Hæc omnia, nisi altius intrò ad viscera subeunt, nondum cœpisse morbum, at in proximo esse testantur. Ut primùm verò is ipse incipit, tum levissimus est, cùm solummodo pilos, caput, ac mentum remittunt ægri, cætera rectè habent. Pauló gravius est summa corporis maculis frequentibus, iisque more lentiginis

ginis exiguis , aliàs rubris , aliàs flavis imbui , quæ maculæ non nisi resoluta quoque morbo tolluntur. Id vitium tum quoque majus est , certumque sui argumentum præbet , cùm in fronte , & in temporibus , & ponè aures , maximè circa radices capillorum , dein in capite , vel etiam in universo corpore , malignæ pustulæ , tumoresque non unius coloris efflorescunt , quæ sponte sine medicamento sanantur , iterumque passim expullulant. Pustulæ modò flavæ , modò rubræ sunt , rotundæ omnes , siccæ , puris expertes , & aridam crustam habent , ex his deinde in ambitum serpentinis pustulis , cutemque cavantibus , ulcus oritur virulentum , & sordidum. Quibusdam etiam tum manuum , pedumque cava finduntur siccitate , & squamas remittunt. Eoque propè tempore palatum , atque intimum anguli oris , nigris , foetidisque pustulis impeditur , adeò subinde ulcere cavatis , ut ejus rei causâ , potio per nares reddatur. Qui casus tamen rarissimus incipiente morbo , frequens tum veteri , tum bis terve reverso est. Exulcerantur quoque & lingua , & fauces , & partes quæ ad nares , & ad podicem sunt. Tum quoque caput prægrave

grave esse incipit, cervicibus, humerisque dolor inest, qui interposito spatio ad brachia, & ad crura pervenit, noctemque molestant magis, quam diem exhibet: maximè à tertiâ noctis hora ad nonam infestus. Idem mediis artubus profundè inhærescit in quibus sæpè tumores oriuntur, qui ægre vel dissolvuntur, vel suppurant. Interdum etiam in tophos vertuntur hi, maximèque in fronte, in capite, in claviculis, in medio humeri osse, itemque in cubiti radio, & in parte tibiæ priorè, & juxta alia nonnumquam ossa, quæ pessimis inde ortis ulceribus corrumpuntur. Tum perfectò gravissimum id malum esse judicatur: Nam solidæ quoque partes labefiunt, ossa, vincula, membranæ, nervi, circa quæ coëunte maligno humore, immanissimi doloris tormenta, maximèque per noctem incidunt. Atque his quidem ærumnis, mistisque vigiliis, ac febris oppressus, subinde homo perit. Cæterùm meminisse convenit, non omnia semper in omnibus ægris signa, verùm alia in aliis deprehendi. Modò enim solæ pustulæ, modò dolores, vel nodosa tubera, vel exulcerationes sunt. Sub solis pustulis expeditior curatio est, sub aliis nul-

nulla, aut certè difficillima: præcipuè si his multa vetustas accessit. Porro constat morbum hunc penitus contagiosum esse, ac solo vitiat corporis adhæsu contrahi, tum à parentibus quoque ad liberos more Elephantia transire, eique contagioni foeminas opportuniores, quàm viros esse. Recens morbus non difficillimè curatur, vetus vix unquam. Æquè inanis medicina est, si sub hoc vitio corpus marcore occupatur, aut orta Anhelatio, quam Græci *ἀσθμα* vocant, fuit. Post morbi curationem alii mirè corpulenti fiunt, aliis raucitas infesta est, aliis foedæ cicatrices manent, profundorum, turpium ulcerum vestigia.

M E D I C I N A L I U M

O B S E R V A T I O N U M

L I B E R . I I .

Q U O V I T I A S I N G U L A R U M *partium corporis proponuntur.*

VIX ulla pars corporis humani æquè doloribus opportuna, ut caput est: *Dolor capitis.*
Huc

Huc enim facile aliquid ex inferiore corpore aspirat. Ipsa quoque pars, propriæ constitutionis, atque temperamenti occasione impotens, non difficillimè doloris causam in sese tum admittit, tum gignit. Ergò si multis jam annis crebrò, levique de causa caput dolet, scire licet aut cephalæum, aut hemicraniam esse: sub illa proprio caput affectu labefactatur, ipsumque universum, aut certè maxima ejus pars dolet: sub hemicrania autem, alterum tantum capitis latus consensu præcordiorum, subditarumque partium dolor afficit, ferèque à temporum oritur pulsatione. Uterque dolor, ut quivis etiam alius, sub appellatione τῆς Κεφαλαλγίας continetur. In dolore autem capitis omni, eò periculum vertitur, qui continenter excruciat, & somnum tollit. Quod si vomitus etiam accedit æruginosus, & surditas, in proximo insaniam esse significat. Jam etiam ubi ingentem capitis dolorem distentio nervorum comitatur, vel inflammatio juxta oculos, aliamve corporis defixa partem, vel denique oculorum inflatio, aut subversio, summum periculum ostenditur. Illud quoque veterum observatione constat, vehementem dolorem

rem capitis , qui curatione non sanescit, sed magis etiam exasperatur , assidueque tenet , periculum insanix per febrem minari : sine febre autem , cum hanc quoque insaniam , tum magis cæcicatem prænunciare. Per acutos capitis dolores , si sonitus incidit aurium sine febre , & vertigo , & impeditus tardusque sermo , & manuum torpor , vel morbum expectari attonitum , vel comitiales , vel lethargum posse non alienum est. Ad hæc si vetus in capite dolor est ex frigida natus materia , difficillimè sanescit , maximeque in senibus. Quum caput parte aliqua , aut circum circa dolet , si pus , vel aqua , vel sanguis naribus , ore , aut auribus exit , scire licet malum solvi.

Nunc ea capitis vitia ordine sequar , quibus mentis error jungitur , incipiamque à delirio , Quod Græci *ωαρεπνεσις* dixerunt. Majoris ferè id terroris , quam periculi est , scilicet per acutarum febrium vigentes accessiones , sæpè contingit desipere ægros , & loqui aliena , verum levato accessiones impetu , protinus mens redit. Novisse tamen oportet , illud penitus non leve esse , neque incidere , nisi in vehementi febre

Delirium.

E

posse.

posse. Ferè autem hoc represso , gravi profundusque somnus obrepit. Sed imminentis quoque delirii non ambigua notæ sunt. Expeditior sermo ægrotanti est , quàm sano fuit , ac subita oritur loquacitas , eaque ipsa solito imprudentior. Stridor quoque dentium , firmo etiamnum corpore incidit, & gestus incontinentior est , & oculi frequenter moventur , hisque dolente vehementer capite , quasi tenebræ offunduntur , vel sine dolore somnus non accedit , fitque continuata per noctem , perque diem vigilia. Spiritus rarus , mirèque vehemens est , & pulsus citatus , ipsumque corpus prostratum in ventrem jacet , nisi si hunc decubitum tamen aliquis ventris dolor fecit.

Horroris autem , periculique plenissimum id genus insanix est , quod inflammato cerebro , ejusve membranis excitatur , Græci φρενίτις vocant. Id his signis notescit : Febris urget acuta , atque continua , continuusque mentis error , modò his , modò aliis animæ vitiatæ actionibus : expeditus in omnem audaciam homo est , & vicissim tum vigiliâ , tum somno difficili , turbulentoque impeditur , sic ut interrupta quiete protinus

cum

cum impetu è cubili profiliat , vocifertur , ferociat , ac modò ploret , modo cantet , verbaque sine sensu , sine ordine certo proferat , interrogatus ab alio omnia aliena respondit. Quæ quidem omnia eo plus ostendunt periculorum , quò quis initio morbi (ut ferè fit) pacatior fuit. Sub eodem vitio oculis insolita mobilitas accessit , hique cruenti , flammei , squalidique sunt , quos æger crebro perfricat , modo ficos , modo lachrymâ perfusos , lingua autem aspera , & nigra est , dentes stridore quatiuntur , sæpèque cruor è naribus aliquis fertur , & interdum posteriora capitis dolent. Adhæc vehementer sitit æger , & multum garrit nugarum , atque altè quidem , verum rarò tamen spirat. Idem manibus tremat , digitisque floccos vellit , & festucas è stragulis legit. Urina huic tenuis , flammea , interdum etiam (quod pessimum esse judicatur) tenuis , albaque est. Hoc istud genus insanix longè acutissimum est , brevique hominem , nisi maturè malum tollitur , tollit. Moriferum id esse testatur continua , tum dementia , tum vigilia , alvus & urina pertinaciter compressa , aut urina prius abundè colorata : post alba , tenuisque

reddita, itemque distentio nervorum; difficilis crurum extensio, atque contractio, syncope.

Sequitur tertium insanix genus, quodiu aliquis sine febre desipit, Græci *Melan-* μελαγχολία *choliam* vocant. Tristitia, metus, atque vigilia longo tempore afficiunt, itemque humanæ consuetudinis odium, idque perpetuo cum luctu, atque lachrymis, quanquam nonnulli etiam continenter rident. Omnes autem exercent vanæ, intentæque animi cogitationes, adeo ut sæpè humi fixis oculis, veluti stupidi consistant, subitòque falsis imaginibus exempti, celeriter cum suspirio procedant. Qui gravius laborant, sese vel pecudes esse, vel testaceos, vel etiam vitâ defunctos credunt; quare alii gallinacei cantum voce imitantur, alii occurrentibus cedunt, veriti ne (testacei cum sint) diffringantur, alii epulas pertinacissimè recusant, amissam esse vitam rati.

Qui hoc morbo laborant, ut mortem quàm maximè pertimescunt, sic hanc tamen sibi ipsi quàm sæpissimè desponso animo consciscunt. Omnibus autem caput, oculi, totaque facies calet: Somnus, ut præcipuè necessarius, ita maximè difficilis est. Ex eodem genere morbi,

bi, melancholia flatuosa habetur, quam *Melan-*
 Græcè *ύποχονδριακή* appellamus. Est ma- *cholia*
 lum affecti jecinoris magisque lienis so- *flatuo-*
 boles, modò cum lienis tumore, modò *sa.*
 sine eo, non solùm lienis, sed neque
 etiam mesenterii: Soletque tum sævius
 esse, vel exigua etiam adustæ bilis atræ
 atque perniciosæ portione, omnia suo
 halitu labefactante.

Isdem penè notis hic morbus, quibus
 prior,prehenditur: nisi quod hîc præ-
 cordia sursum convellantur, & interdum
 præter gravitatem calore ferveant. Sub
 his arteriæ vehementer, & molestè pul-
 sant. Accedunt capitis vertigines, au-
 rium sonitus, cruditas, acidi ructus,
 multatenuis salivæ sputatio, qua de cau-
 sa nihil etiam fititur, vomitus pituitæ,
 modò bili permixtus est, modò acidus,
 ex quo dentes etiam stupent. Dum epu-
 las stomachus concoquit, medio loco
 scapularum dolor inhærescit, qui illis
 concoctis, protinus conquiescit; Ven-
 ter sæpè adstrictus est, & intùs rugit,
 flatibusque turbatur. Quin etiam subin-
 de cordis fit palpitatio, & quædam quasi
 suffocatio. Cruditate maximè crescit
 morbus, concoctione summè levatur,
 estque eo morbo, quem priore loco po-

fuimus , longè mitior. Nonnulli autem , quibus hujus mali vis cerebrum penitus occupavit , in furorem aguntur , febremque patiuntur hæcticæ non abfimilem , & quæ in marcorem promptè vertatur. Melancholia omnis familiarior viris & senioribus , deterior fœminis est. Rarò quisquam tumorem effugit lienis , qui hoc morbo capitur. Si vel hæmorrhoides , vel varices , vel (ut quibusdam placet) aqua inter cutem accedit , solvitur malum : versam etiam melancholiam in morbum caducum fuisse , & rursus hunc in illam , quorundam observatione compertum est. Ferè autem sic incidit : ut , quæ melancholia recens est , curationem non difficillimam habeat : quæ inveteravit , vix unquam remediis tollatur.

Furor. Sequitur modò ea insanix species , quam nos furorem , seu rabiem , Græci *μῆνιν* appellaverunt. Adfunt quidem delirationes eorum quos Melancholia exercet , at his tamen insuper jungitur effrenis iracundia , clamoribus , minitationibus , torvo oculorum intuitu , violentoque corporis impetu formidabilis. Si sanguis magis subest , assiduus , & dissolutus oritur risus , jucundis ante oculos

los objectis imaginibus. Si verò magis in causa bilis est, omnia inusita & temeritatis, atque crudelitatis plena contingunt: Adeò constat rectè judicasse veterem Hippocratem, insaniam quæ cum risu sit, tutiorem esse, quæ dato studio, pejorem. Ut plurimum autem hic morbus sine febre est, tametsi ea quoque interdum accedere, atro humore putrescente, solet. Salutem promittunt, fusi menses, aut hæmorrhoides, aut natæ varices. Non tuta sunt ulcera in facie & in pedibus orta, aut amissa prorsus appetentia.

Huic furoris vitio id finitimum est, quod à morfu rabiosi canis infertur, Græci *ὀδοντοβία*, nos aquæ metum appellamus. Miserrimum genus morbi, quod hominem rabie, & siti & aquæ formidine cruciat. Ergo ut primum morsus aliquis est, moderato omnia pro vulneris modo fiunt; at interposito spatio, dolores ingravescent, ipsaque incipit vitari mens alienis cogitationibus impedita. Homo autem morosus fit, ferox, atque iracundus, multum secum obmurmurat, & quasi ab alio interrogatus, crebra responsa reddit. Post hæc conspectum metuere aquæ incipit, canemque in ea oc-

*Aquæ
metus*

culi existimans , metu exclamat , atque inhorrescit.

Ipsi adeò mens errat , ut ne familiares quidem agnoscat. Tum perfecta oritur rabies , atque aliis morfu nocendi cupiditas , inter quæ alii sicuti canes latrant , alii semen sine desiderio Veneris emittunt , alii cùm quid biberint , præfocati moriuntur. Omnibus autem somnus turbulentus , horroris , furorisque plenus est. Accedit nervorum distentio , singultus , fitis implacabilis , & (quæ ferè extrema esse solent) frigidus sudor , & syncope : quamquam non rarò prius siti homo enectus sit , quàm hæc ista eveniant. Porrò hoc genus insanix , ubi confirmatum spatium est , adeò sanari non potest , ut neminem constet inde unquam fuisse expeditum : Confirmatum esse dico , cùm simul mentis usus non est , simul timeri aqua cœpit. Quos calus accidere aliis post quadragesimum , aliis post sextum , aut septimum mensem observatum est.

Nec desunt Authores , quibus placuit , septem etiam annis occultari id vitium posse. Illud quoque constat , multos ita morfos , factum id à rabioso cane esse nescisse , vulnerisque curatione , ac ni-

mia

mia secundæ valetudinis fiduciâ , hujus sibi calamitatis authores exstitisse. Itaque utilis etiam experimento locus est. Nam accipitur panis frustum , imponiturque vulneri : id hinc detractum , alterique integro vorandum exhibitum cani , si rabiem ei non moverit , scire licet , qui momordit , eum non fuisse canem rabiosum. Ferè autem qui sic est canis , hæc habet : esurit , sitit , nihil tamen cibi vel potionis sumit , oculos flammeos , trucesque habet , auriculas demittit , linguam exerit , multum ore spumat , umbræ suæ oblatrat , sæpe sine omni latratu tristis , atque anxius discurret , crebrò tanquam cursu fatigatus spirat , caudam gestat intortam , nullo discrimine in quasque obvias animantes impetu , ac morso fertur , præcipite atque incerto oberrans cursu. Integri canes , & conspectum , & latratum ejus qui furit exhorrescunt , ac fugiunt.

Nunc ea capitis vitia proponam , quæ frigidis innixa causis , mentem etiam vitiant : incipiamque à Lethargo , cujus *Lethargus.* hæ notæ sunt ; Marcor , & penè inex-
pugnabilis adest dormiendi necessitas , febrisque lenta , neque caloris admodum mordacis. Accedit dementia , rerum-

que omnium tanta oblivio , ut quum o-
fcitant ægri, (quod ipsis perfrequens est)
claudendi oris obliviscantur : aut cum
mejendi causâ matulam petunt, mani-
busque tenent, mictionis tamen omnem
amittant memoriam. Adhæc claudun-
tur oculi , iidemque ubi voce compelli-
tur æger, palpebris ægrè diductis, vix
adaperiuntur, rursusque protinus coeunt,
ac pristino sese sopori dedunt. Is sopor
interdum adeò pertinaciter immoratur,
ut æger vulsis etiam capillis non doleat,
sed totus stupore oppressus, veluti trun-
cus cubet. Universum ipsi corpus se-
gne, graveque est, & ante omnia caput.
Nonnunquam singultus etiam incipit.
Ipse pulsus æquè magnus, mollisque, ut
inflammatis pulmonibus est : at tardior
tamen, & rarior, & minus inæqualis,
magis autem intermittens, quàm inter-
currens, interdum bis pulsans, semper,
ubi sopor dominatur, undotus. Spira-
tio rara, & imbecilla est; Alvusque aliis
liquida, aliis compressa. Urina, qualis
jumentorum esse solet, turbida mejitur.
Ipse æger supinus cubat, & ab aliis in
latus conversus, ultrò in dorsum revol-
vitur. Hoc certè genus morbi acutum
est, & cum parum in tempore succur-
ritur,

ritur, promptè interficit. Summi periculi nuncius tremor est: itemque vidente malo frigidus circum caput sudor. Qui ex hoc morbo convalescit, huic ferè in pectore suppuratio nascitur. Sæpè lethargus, abscessu pone aures exortō, solvitur.

Caros notis lethargo persimilis, *fe Caros,* *Caros,* brim non facit, sed sequitur, eamque non levem: quamquam etiam, & compressio cerebro, accessionibusque comitialibus succedit. Lethargus ipse per se morbus, propriâ quadam nititur consistentiâ. Neutrum vitium repenti accedit. Jam quoque in lethargo, etsi fit molestè, fit tamen omniâ ad interrogata responsio. In Caro spiritus illæsus est. Nihil verò istorum in attonito observatur morbo. Solutum quoque Carum ferè secunda valetudo excipit: attonitum morbum, resolutio nervorum.

Catalepsis autem, quam detentionem *Cata-* *lepsis.* interpretantur, sic cognoscitur. Homo repenti mente, ac sensu, motuque corporis destituitur: itaque in ea quoque figura, qua percellabatur, manet, sive federit, sive cubuerit, idque vel clausis, vel apertis oculis. Qui hoc morbo capiuntur, nisi maturè curentur, stupidi

di ac velut frigore quodam enecti moriuntur.

Κῶμα.

Κῶμα autem, quod Soporem, & profundum somnum appellamus, hic notis observatur: Æger demissâ inferiore mandibulâ obdormit, & expergefactus, rursus in somnum repenti delabatur, ideoque Græci id ὑπνῶδες appellaverunt. Quod si ad somni proclivitatem, vigilia simul accedit (ὀγρυπνὸν κῶμα Græcè dicunt) mens, sensusque omnes sopitam omnem actionem ostendunt: homo tamen vigilantis formam, figuramque retinet. In eo malo impeditus sermo, & spirantibus auditum in gutture murmur, & difficilis poculorum deglutitio, & pituita tenuis à naribus stillans, & urina, alvique retentio, promptaque resupinatio, periculum in proximo esse denuntiant.

Morbus
comitia-
lis.

Incipiam nunc de morbo dicere comitiali, quem Græci ἐπιλεψιν dicunt. Istum maximè timeri potest, cum caput grave est, & dolet, præcipuè permoto ad iram homine, cum mentis error incidit, & sensuum stupor, simulque vertigo oritur, & tenebræ oculis objiciuntur; & horrenda insomnia sunt, & linguae sine ordine orationis movetur, eamque

æque loquens æger commordet ; cùm vultus inter hæc pallet , spiritus difficulter trahitur , venter flatibus tumescit , urina præter solitum tenuis & cruda , cùm aliàs , tum si quis etiam dolor , aut convulsio summum humerum , aut cervicem , aut caput occupet , aut torpor corporis , aut turbulentum insomnium accedat. Ut primùm verò morbus invadit , homo subito convulsus concidit , vociferatur , stertit , spumat , interdum circumagitur & tremit : dein interposito tempore ad se redit , perque seipsum consurgit. Quibusdam stercus , aut urina , aut semen præter voluntatem in ipsa accessione elaboratur. Si à ventriculo vitium fuit , mordetur is antè , magisque per inediam , idemque palpitatur , & fluctuat : quumque in propinquo accessio est , nausea oritur , & stomachi dolor , aut animi defectio , qua finita , vomitus incidit , modò pituitam , modò bilem trahens , inter quæ frequens sibilus aurium est. Porro si ab aliquo loco corporis exteriori malum oritur , inde fieri raptus velut auræ cujusdam frigidioris per continuatas partes ad caput sentitur. Morbus autem comitialis tum pessimus est , cùm continenter recurrit , atque intervalla accessionum

ha-

habet quam minima, diuque, ubi invasit, immoratur; præcipuè si simul multa vertigo est, & difficilissima spiratio, & vehemens, longaque corporis agitatio, & post hanc succedens alta, plurimaque quies catochæ similis, sub qua amisisse homo quasi vitam credatur. Quod si inter hæc nihil juvare etiam videbuntur remedia, quæ movendis sternutamentis utilia sunt: scire licet, in pessimo rem statu esse, magisque ubi ab ore deterta spuma sæpiùs redit, simulque vehemens tremor, & vociferatio, & stertor est: neque finita accessione meminit quicquam æger, pudorve movetur factorum. Idem morbus magna ex parte esse longus solet, ad usque diem hominis supremum, neque vitæ tamen periculosus, tametsi interdum, cum recens est, hominem tollat crebris, gravibusque accessionibus.

Quomodocunque autem incidat, magis familiaris esse viris, quam fœminis consuevit: magis pueris, ac præcipuè nuper in lucem editis, quam adultioribus, minimèque senibus, atque ætate confectis. Nihil æquè ad depulsionem vitii hujus, ac processus ætatis facit. Nam pueris ferè post fœminæ consuetudinem solvitur, & puellis post orta menstrua.

strua. Quod si annum aliquis vigesimum quintum jam superavit ægerrimè, aut certè nunquam sanescit, per omnem vitam morbo opportunus, magisque si comitialibus natus parentibus, aut conceptus fluentibus menstruis fuit. Illud etiam non perperam anima dversum est, prægnanti foeminæ si morbus accessit comitialis, hunc, facto partu, solvi: & si quid inde vitii foetus traxit, id magna ex parte conquiescere, ubi editus in lucem infans protinus evomuerit, multumque ejecerit aquosi excrementi: sin minus, manere morbum. In eodem ipso Alphos albus in capite natus, puerisque crustosa scabies, spem curationis aliquam facit, maximè si morbus non ita diu traxit, & vitæ solummodo secutus intemperantiam est: aut si ab una parte corporis, sensus venientis accessionis incipit, idque à manibus, vel à pedibus potius, quàm à lateribus aut ab ipso (quod pessimum est) capite. Nam contrà, ubi totum simul afficitur corpus, neque antè in parte aliqua accedentis mali sensus est, sed homo ex improvviso concidit, cujusunque is ætatis sit, vix sanescit. In eodem morbo si mens læsa est, & nervorum facta resolutio, medicinæ locus non est.

Illud quoque constare iudicio quorundam video , prorsus pro valetudine esse , si morbo comitiali longa febris , ac præcipuè quartana accesserit.

Incubus.

Incubus , quem ἐφιάλτην Græci dicunt , notis cognoscitur. Per somnum mole aliqua sese opprimi homo , & ab alio urgeri credit : ipse totus torpidus , ac difficulter mobilis , imaginatione præfocationis edere vocem non potest , aut eam certè admodum incertam , exilem , & malè discretam edit , tandem hoc casu vehementer anxius , perrupto somno , repentè expergiscitur. Malum hoc familiare est hominibus crapulâ , & multa sæpè cruditate oneratis. Deterius est , ubi per noctem etiam vigilantibus incumbit. Si verò ubi idem dormientes occupat , post expergefactionem frigidi oriuntur sudores , & cordis tremor , pessimum est. Vix unquam incubus accidit in latus cubantibus. Qui hac ægritudine multo jam spatio temporis , ac frequenter occupantur , huic grave aliquod capitis malum , puta vertiginem , morbum tum attonitum , tum comitiales , maniam , nervorum distentionem , aut subitam mortem impendere sciendum est. Scilicet hoc modo reperi-

tos

tos mortuos , in ipso etiam cubili , multos esse constat.

Attonitum morbum , qui Græcè *Mortuus* *attonitus.* *ἀποπληξία* dicitur , etsi interdum nulla ferè signa præcurrunt , magna tamen ex parte antecedunt , capitis subitus , acutusque dolor , & vertigo , & oculorum caligo , & dentium in somno stridor , & totius corporis , maximèque extremorum frigus. Tum repentè homo , velut attonitus , cum clamore corruit , moxque clausis oculis stertit , & magna spiritus orta difficultate tantum non præfocatur , perinde laborante pectore , ac si vinculo quodam adstrictum , attolli prohiberetur : Adhæc sensus motusque omnis perit , unica miseris à spiritu spes vitæ reliqua. Is spiritus , prout aut facilè , aut molestè trahitur , morbi modum , omnemque magnitudinem ostendit. Quare etiam pestiferum esse sciendum est , si vel intermittitur multum spiritus , aut summa difficultate trahitur. Minus horrendus casus est , ubi cum spiritu non difficillimo , sumta pocula non resiliunt per nares , sed penitus descendunt.

Quicumque verò morbus attonitus magnus est , sanari non potest : qui levior , ægrè potest. Idem rarò sine al-

tero corporis resolutio latere , conquiescit, idque fere primis fit quatuor diebus , quod spatium si morbus transit, occidit. Sæpe tamen adeò leviter aliqui sic laboraverunt , ut solo distorto ore, sensuque , ac motu lapso , neque spumaverint , neque sterterint , remediisque curati, nulla orta nervorum resolutione, convaluerint. Morbus autem attonitus ei magis familiaris est, qui annum jam quadragesimum , nondum sexagesimum excessit , utique si idem frigida naturæ homo est , crebraque gravitate capitis, & sopore , oculorum caligine afficitur, si brevi & angusta cervice est, si ipse totus sine negotio deses , potationibus , atque ingluvie perditam vitam ducit. Adolescens autem , & eo ætate paulò grandior, sic laborare, non nisi maximis de causis potest , aut quivis etiam alius, quum tempus æstivum est. Sub his enim casibus ferè mors sequitur. Opportunior morbo hyems est : utique si præfrigidi venti spirant , densæque nebulæ cœlum obsident. Cæterum utile est in hoc morbo hæmorrhoides patefieri : inutiles sunt frigiditates , & torpores : mortiferi propter impeditum spiritum orti sudores. Per eundem morbum sæpè, quod multis videtur

detur extinctum corpus, vitam habet, præcipuèque foëminarum, & horum quoque virorum, quibus frigidior est natura. Rem omnem pluma detegit coram naribus, atque ore suspensa, aut certè vasculum aquæ plenum, atque sic supra pectus impositum. In his si motus fieri aliquis videtur, superest æger: si summa immobilitas est, periit. Minimè alienum id videatur, quod Hippocrates memoriæ prodidit: sanum hominem subito dolore capitis captum mutumque redditum, ac stertentem, intra septimum diem interire: servari autem, si ante eum diem febris venit, posse.

Proxima modò videatur observatio, quæ nervorum debetur resolutioni, Græci παρέλυσιν appellant. Ea autem, cum morbo attonito successit, παραπληγία Græcè dicitur, ac modò omne corpus, quod capite inferius est, occupat, modò alterum ejus latus duntaxat. Cum autem nullo antecedente morbo incipit, interdum & comprehensa quoque loca tenet, interdum unam quampiam partem, ut linguam, ut oculum, ut maxillam, ut labrum, ut brachium, ut crus, ut hujusmodi. Hujus itaque resolutionis nuntius stupor est, ex quo scilicet sensim

Resolutio nervorum.

crescente illa nascitur. Prius autem genus plus periculorum habet, sæpèque in morbum attonitum revertit, posterius hoc etsi æque ferè diuturnum, longè tamen esse mitius solet. In utroque aliàs sensus integro motu perit, aliàs illæso sensu motus, nec rarò (ubi consummatum id vitium est) simul utrumque. Ubi hic morbus alterum latus affecit, id nonnunquam frigidum deprehenditur, altero, quod integrum est, ardesciente. Oculus quoque, è directo lateris ejus, quod morbum sustinet, minuitur. Per eundem morbum pulsus languidus est, & parvus, & tardus, & rarus, & mollis: interdum etiam creber, inæqualis, sed nonnihil sine certo ordine intermittens. Urina tenuis ferè, atque diluta est, tamen nonnunquam propter imbecillos renes rubea fit. Idem malum semper longum esse solet, sæpèque, alios morbos excipiens, finit: puta morbum (ut proximè dixi) attonitum, itemque longas febres, coli dolorem atque ab utero factum strangulatum. Crebrò etiam per hyemem incidit, ægerrimèque in senem tollitur, præcipuè si jam in vetustatem incidit. Idonea ad medicinam tempora sunt, primùm ætatis, dein veris: vix
quic-

quicquam sperari hyeme, vel autumnopoteſt. Quæ verò pars reſoluta eſt, ea facilè refrigerſcit, gravisque eſt, mollis, & laxa, tandemque ubi morbus inveteravit, macie conſumitur. Tum profeſtò vix unquam ad priſtinum ſtatum revertitur, præcipuè ſi motu penitus caret, ſimilemque colorem reliqui corporis non exhibet. Quælibet autem nervorum reſolutio mediocris vix ſanatur, vehemens ſanari non poteſt. Eadem ubi ex rupto nervo, aut tranſverſim incifo nata eſt, non curatur. Pro valetudine eſt, febrem accedere, vel tremorem fieri.

Quoniam de vitiis agere cœpi nervo-*Disten-*
rum, non videtur omittenda eorum di-*tio ner-*
ſtentio, quæ Græcis *σπασμός* appellatur.*vorum.*
Membrum ſic contrahitur, ut reduci ad priſtinum habitum non poſſit, nervis, muſculisque verſus ſuam originem, præter voluntatem, convulſis, idque cum vehementiſſimo dolore, qui vires ſubinde hominis conſumit. Quod ad pulſum attinet, arteria tenditur, & undequaque ſeſe colligens cõit, eademque veluti chorda, quæ ſtringitur & laxatur, ſurſum, deorſumque fertur. Hic morbus rarus quidem, at multum acutus eſt, ci-
F 3 tòque

tòque adeò occidit. Quum repentè sanum hominem adoritur, repletionis sequitur causas, utique si necessariæ vacuationis facta suppressio est, si intermissa exercitatio, & continuata pocula fuisse: ubi vero magna febris, aut superflua vacuatio, aut nimius labor, maximèque vigilia, atque inedia antecesserunt, scire, licet id ipsum vitium ab inanitione profici, atque inprimis horrendum esse, vixque ulla medicinæ ope sanabile. Itaque rectè id ab Hippocrate animadvertum video, post acutas febres, & effrenatas, præcipuèque veratro tentatas purgationes, & post gravissima vulnera, aut post quamvis aliam sanguinis profusionem, semper mortiferam nervorum distentionem esse. Scire autem licet, sæpè hunc morbum febricitantibus subitò, sine ullis præcurrentibus signis, accidere, factoque bilis vomitu, protinus conquiescere: proin ejus causa ad stomachi affectum, non ad febrem referenda est. Porro est etiam levis quædam nervorum, musculorumque distentio, quæ à flatibus oritur, Græcisque σπασμὸς φυσῶδης appellatur. Nam etsi maximum dolorem, eum tamen perbreve, ac non magis horâ durabilem exhibet, sola frictione

mitescens. Id vitium sæpe manuum, pedumque digitos, interdum & crura tentat, summo ea cruciatu extendens, vel in sese contrahens. Iis autem familiare est, qui crapulæ dediti desidem vitam agunt. Distentio nervorum semper in pueris, præcipuè nuper natis, frequentior, & curatu facilior esse consuevit: quanquam interdum in iis ipsis periculum habet, maligna febre captis. Scilicet post septimum ætatis annum, nemo puer distensione afficitur nervorum per febrem, nisi hanc acutissimam, & malignam.

Opportunus autem dum febricitat, huic morbo is puer est, cui alvus diu compressa est, cui vigilia, & terror, & coloris mala mutatio accesserunt. Novisse autem oportet, eundem morbum aliàs uni membro infectum, ut oculo, cuti quæ in fronte est, linguæ radici, maxillæ, labris, brachio, manui, cruri, sed eum gravissimum in cervicibus esse: aliàs loca omnia capite inferiora obsidere, aliàs tota corpora convellere. Priora genera duo, *νιτάνου* appellatione Græci comprehendunt, quem Latini rigorem nervorum vocant. Novissimum

*Rigor
nervorum.*

quia caput quoque ægrotat, simul & mens, & sensus vitiantur, fitque non continuata, ut in superioribus afflictio: sed ex temporum recurrens intervallis. Ergo, quoniam hujusce morbi observationes suo loco proposuimus, rectè modò de rigore nervorum agemus. In hoc flecti cervix vel corpus non potest, sed recta intenditur, id τέτανον dicunt: quum in priorem curvatur partem, sic ut mentum pectori jungatur, tum Græcè ἐμ-
προσθότονός esse dicitur: quum autem in posteriora convellitur, caputque committitur scapulis, ὁπισθότονον vocant. Præter has notas aliæ etiam sequuntur, Nam facies rubet, atque dolet, maxillæ, ac si lignæ essent, obrigescent, os vix patefit, oculi distorti illachrymant, riget dorsum, vix contrahuntur crura atque manus, præcipuè in tetano. In opisthotono autem vociferatur etiam æger, & ingentibus doloribus excarnificatur: crescentibus his exilit è cubili, & magnas nugas dicit: mitescentibus, melior mens, & tranquillitas redit. Idem pollicem pugno includit, neque crura contrahit, neque manus extendit: interdum etiam accedente morbo, vocis usum amittit, & omnia similis homini furibundo

bundo redditur : sub quo casu certum exitium est , magisque si viribus æger caret , & insudat , & pocula per nares rejicit. Rigor nervorum omnis hominem intra quartum diem tollit , quem si is transit , convalescit. Ubi moritur aliquis , potionem , & sorbitionem , & pituitam per nares extundit.

Nunc de destillatione loquar , quam *Destil-*
Græci communi nomine *κατάρσιον* appel- *latio.*
lant. Leve est , è capite humorem in nares labi : pejus , in fauces , & in asperam arteriam ; pessimum in pulmonem. Si in nares materia fertur , eaque frigida , & ignava est : tenuis per has pituita stillat , caput leviter dolet , sed multum grave est : ex somno oculi caligant , frequentia sternutamenta sunt , extrema pars narium friget , sæpe gravedo has intus obstruit , vocemque offendit . Inter hæc ferè urina cruda , atque turbida est. Si materia in fauces & in asperam arteriam ruit , raucitatem , & tussiculam movet. Si in pulmonem , gravem tussim , ac spirandi difficultatem : atque hinc eam sputo expurgari intra vigesimum diem , observatione Hippocratis constat : quod nisi fit , ferè in Anhelationem , quæ Græcè *ἀσθμα* dicitur , transit. Porro si ca-

loris causa subest, rubet facies, humorque acris, falsus, & tenuis destillat, vehemens cibi fastidium est, sonant aures, arteriæ multum moventur in capite: tumque magna ex parte febris oritur, ex qua malum tamen nihil levatur. Sæpè etiam eo tempore proclive periculum inflammationis laterum est, quem morbum Græci *πλευρίτιν* vocant, maxime si tum quoque is ipse passim in populum grassatur. Jam verò si in fauces, asperamque arteriam humor hic decumbit, præter tussiculam, & raucitatem, etiam hæc loca exasperat. Si in pulmonem irruit, præter sternutamenta, & difficilem tussim, adsunt capitis gravitas, fitis, lassitudo, æstus, biliola urina. Ut cætera genera destillationis ferè sine metu, sic hoc illud periculosum est, itemque certò pestiferum, ubi pulmonem exulceravit, unde gravis oritur tabes, quæ hominem spatio consumit.

Hinc tabem vel esse, vel instare, inter cætera indicat urina oleacea, magisque id vitium timeri debet, si jam vetus destillatio corpus tenue, atque procerum tenet. Nonnunquam autem & loca septo transverso inferiora humor impetit, nempe ventriculum, cujus appetentiam con-

coctio-

coctionemque subvertit, & quæ in eum ingesta sunt, corrumpit: nec rarò etiam ubi is acris est, ventriculi tunicas erodit, atque alvi profluvium movet. Interdum etiam & venas mesenterii, & Colon convellit. Destillationibus ii magis expositi sunt, quibus, cum subjecto viscere intemperanter calido, puta Corde, vel jecinore, vel renibus, caput naturâ imbecillum est. Idem, quem dixi, morbus ægerrimè in sene maturescit, itemque in eo, cui simul continuò caput dolet. Nullum anni tempus æquè opportunum destillationi, atque Autumnale est: tum enim variè, sæpèque cœlum mutatur, quæ res, judice Hippocrate, maximè destillationes movet. In eodem morbo, pro valetudine est ad nares, vel ad os fluxionem verti.

Magnis & variis casibus oculi nostri patent. Ex quibus magis in usum veni-
re medicis consuêrunt suffusio, & lippitudo. Incipiam itaque à suffusione, quam Græci *ὀφθαλμία* nominaverunt. Visio paulatim hebescit, primùmque assiduè observari oculis videntur quasi pusilli culices, vel muscæ, vel alia lucentia, caliginosæque rerum simulachra, incerto motu huc illuc acta.

In-

Interdum veluti tenuia quædam filamenta, aut telæ araneorum offeruntur. Aliis lucernam intuentibus, cingere eam tanquam circuli quidam obscuriores videntur: post hæc pupilla turbida esse incipit, & tenebrosa, & malè ferena.

Denique pro suffusionis ob pupillam figura, variæ offeruntur rerum imagines: tantisper autem hæc ista interposito tempore crescunt, donec crassescente materia, totus aliquis cæcus fiat. Ferè autem id vitium, neque incipit simul in utroque oculo, neque simul, vel simili modo cernitur: interdum alterum occupat duntaxat. Semper autem ubi natum est, immoratur, assiduis rerum simulachris oculos illudens. Quibus nominibus ab eo suffusionis differt genere, quod ab stomacho proficiscitur: id enim & intermittit, & remittit, si curata concoctione prospectum stomacho est: invalescit autem, vel revertit, si is cruditate labefactatur. Quinetiam eodem tempore, eodemque modo ambos afficit oculos, quod si quis intuetur, nihil in se habere obscuritatis, vel concreti humoris comperiet. Vera oculorum suffusio, si longa vetustate occupatur, curari non nisi acu potest: quod tamen

auxilium , nisi eo quoque tempore adhibetur , quo id quod concrevit , satis firmum sit , ut subjici acui possit , anceps esse solet. Ergo si quid accrevisit , perfrictum diducitur , & sic manens , iterum non contrahitur : tum si æger quoque visione penitus non caret , sed quædam etiamnum rerum simulachra cernit , itemque si malum nondum tertium annum , vel quartum , vel quintum superavit , scire licet , nimis recens id esse , & acui inidoneum. Propter vetustatem autem curationi reluctatur , semelque ablatum , protinus recurrit , quod clauso oculorum altero nullis aut compressionibus , aut perfrictionibus dilatur , simulque omnem semel visum abstulit. Cæterum id tutò curari posse videatur , quod , ubi perfricatur , diducitur , iterumque rediens jungitur , coloremque exhibet obscure album. Nam quod nigrum , vel lividum , vel vehementer flavum est , id neque medicinâ curari , neque acu potest. Porro quæ suffusio oculis propria , nihil unquam concrescientis materiæ intuentibus exhibet , sed penitus serena est : ea perpetuam cœcitatem invehit , nullumque remedio locum præbet.

Lippitudo autem , Græcis ὀφθαλμία di *Lippi-*
tudo.

ſta, ſic cognoscitur. Vehemens oculos urget inflammatio, cum multo dolore, & tensione, & tumore, & ardore, & rubedine : interdum tanta etiam cum punctione, ut oculi tanquam ab infixa acu, aut ſpina ſtimulari videantur. lidem fervente lachryma implentur, ſequiturque pituita modò paucior, modò uberior. Sed & fordes quædam majoribus angulis oculorum inhæreſcunt, & ubi gravius malum eſt, vicina etiam loca ad malas uſque attolluntur, circum circa arteriæ vehementer pulſant, ipſa inflammatio ex oculorum angulis in omnem adhærentem membranam diſfuſa eſt. In hac tenues oculorum venæ turgent, conſpicuæque redduntur hæ, quæ per ſanitatem in oculorum albo fuerant obſcuræ. Ferè autem quod toto oculo album eſſe debebat, rubeſcit. Hic morbus tum maximè metui ſolet, cùm ſecunda valetudine ſæpè tempora dolent, noctuque corpora inſudant, & frons prurit. Principium autem morbi eſſe oſtenditur, quamdiu tenuis ex oculo pituita fertur : ubi ea craſſeſcit, albaque fit, incrementum eſſe : ubi tota craſſa, multaque eſt reddita, perque ſomnum oculos veluti glutine obliniſcit, veniſſe jam ſtatum ſignificat.

cat : declinatio est , ubi & pituita , & signa morbo propria minuuntur. Optimum autem est simul & lachrymam , & pituitam , & tumorem esse cœpisse , sicut lachryma non multum calens pituitæ albæ , ac molli permista sit , & tumor levis , non tamen perdurus. Tum namque palpebræ per quietem conglutinantur , neque dolores æquè afficiunt vehementer : ipse morbus tutus , ac minimè diuturnus est. Quod si autem lachryma multa , & fervida est , paucissimaque pituita , tumor tamen exiguus , vitiumque in altero oculo est : scire licet , dolore id atque periculo multo carere , sed casurum in vetustatem esse , neque solvi antè vigesimum diem posse , multis ad quadragesimum usque durare , quibusdam etiam ad ipsum extendi sexagesimum consueſſe. Itaque tanto spatio formidari etiam exulceratio solet. In omni autem lippitudine , pituitam , quæ fertur , albam esse oportet , & mollem , & lachrymæ perfusam , maximè ubi in propinquo judicatio est. Pituita aridior dolorem quidem abundè movet , ac citius , nisi si quid exulceravit , desinit. Nullum verò habere periculum tumor magnus solet , si expers doloris , & siccus est.

Quum

Quum dolorem exhibet , malus est , si siccus est , metusque fit , ne exulceretur oculus , ac concreascit. Sed & malè securus tumor est , cui lachryma jungitur , atque dolor. Ubi enim lachryma fertur calida , ac salsa , periculum exulcerationis , & pupillæ , & palpebris affert. Jam si tumor quidem confedit , at copiosior diu profluit lachryma , scire licet , eversionem palpebrarum viris instare , foeminis autem , atque pueris etiam , exulcerationem. Lippitudine affectum alvi corripi profluvio , bonum. Si lippientibus caput assidue , longoque tempore dolet , futuræ cœcitatatis metum denunciat. Interdum lippitudo ex uno oculo in alterum , quadam veluti contagione transit , idque ominis non mali esse creditum est.

Sanguinis è naribus fusio. Ab oculis ad nares descendam. Ex his cruor tanto impetu interdum fertur , ut hominem inanitione exanimet. Tum certè color corporis pallidus fit , aut lividus , aut subviridis , extrema vehementer refrigescunt , & mortis proximæ nuntia oritur syncope. Quibus sæpè è naribus sanguis fertur , his ferè aut lien tumet , aut caput dolet , aut caligines oculorum , suffusionesque fiunt. Si pueris

ris sanguis è naribus fluxit, dein fluere procedente ætate desit, necessum est eos vel gravi articulorum exulceratione affici, vel gravi demùm morbo debilitari oportere. Cui fauces sanguine interdium, noctuque replentur, sic ut neque caput, neque præcordia doleant, sed nec tussis, nec vomitus, aut febricula antecefferit, hujus in naribus, aut in faucibus ulcus est. Sanguinem ex contraria regione erumpere, malum: ut in liene magno, si dextra nare emanat: aut in jecinoris inflammatione, si sinistrâ.

Nunc de faucium morbis dicam, primumque de tumore tonsillarum, qui de-^{Ton-}glutitionis molestiâ plus terroris, quàm^{sillæ.} periculi exhibet. Is tumor intuenti, tingentique intus obvius est, moleque sua impedit, quominus homo potionem, salivamque possit suam devorare. Qualiscunque hoc loco rubor, aut nullus ardor est. Sæpè hic tumor inflammationem adsciscit, tumque dolor & ardor, & major rubor, & sitis, quorum nihil in superiore vitio animadvertitur, adsunt. Facta, ruptaque suppuratione, materia in fauces fertur, oriturque ulcus fordidum, cujus putri nidore ipse quoque spiritus foetet.

Columella etiam, ubi vel laxatur, vel (quod raram est) inflammatur, animadversione non indigna est. Ea è palati extremo propendet, inque fauces, & gulæ caput fertur. Itaque hæc loca titillatione quadam afficit, metuque præfocationis sollicitat. Crescente inflammatione, ima ejus pars grandescit, summa tenuis est, tumque malo Hippocrates τῆς σαφυλῆς, id est, uvæ nomen dedit. Rarò hic morbus, si protinus ab initio rectè curari cœpit, hominem tollit. Columellam ita, ut dixi, tumidam, & rubentem, magno periculo incidi, Hippocrates scripsit: gravior enim hinc inflammatio, & sanguinis profusio sequuntur, maximè si succis plenum corpus est. Quibus præfecta est Columella, his pulmo facilè læditur, ferèque eos homines tabes perdit.

Angi-
na.

Proximum est, observationes anginae, quam Græci σνδάχην dixerunt, proponere. Sub hoc malo fauces, id est, extremæ gutturis, gulæque partes, quibus cibus, spiritusque introfertur, inflammantur: fit spiritus hoc nomine difficilis, molestaque deglutitio, sic ut interdum sumta pocula per nares resiliant: accedit autem acutissimus dolor, tumor,

ru-

rubor, calor, & febris, aërisque frigidi cupida attractio. Levissimum malum est, ubi tumor tantummodò, & rubor in sola cervice, ejusque musculis insunt, cætera non sequuntur. Eò gravius est, tum in hisce locis, tum in faucibus interioribus, tumorem, calorem, ruborem, doloremque versari. Penè gravissimum est, foris nihil horum esse, omnemque morbum intùs consistere, ubique (validè depressâ linguâ) speciem ruboris, tumorisque esse, semper aut vehementissimum dolorem, ac summum strangulatùs metum accedere. Porro mortifera est, atque omnium horrendissima angina, citissimèque incidit, & necat, quæ neque in cervice, neque in faucibus quicquam conspicui, vel tumoris, vel ruboris exhibet, simulque summi doloris tormentum, & vehementem febrem, atque tantum non præsentem suffocationem infert. Tum profectò oculi vertuntur, & rubent, & veluti iis qui strangulantur prominent: vox impedita nihil significat, & qualis catulorum est, tenuis editur: os apertum hiat, frigidi aëris cupidum, ex eoque spumans saliva movetur: lingua exeritur, crebroque, ut in anhelis propter laboris impe-

tum equis, agitur : potui datus liquor per nares remeat : labra livefcunt : cervices rigidæ contractæque funt : ipfe æger totus inquietus eft, crebrò è cubili exilit, moleftè fupra dorfum, commodius recto collo atque capite cubat ; videt, auditque obtusè, & præ fuffocatione non intelligit, quid audiat, quid dicat, aut gerat : tandem verò ftrangulatu, atque fyncope oppreffus, perit : id quod horis à cœpto morbo octodecim, integra mente atque fenfu quibusdam accidiffe, doctorum virorum obfervatione conftat. Semper autem fub hoc cafu, mors vel primo die, vel fecundo, vel ad fummum quarto occupat. Salutis in angina fignum facilis fpiritus eft, facilisque falivæ, ac potionis deglutitio, febris non vehemens, quies, fomnus, levamentum doloris, cæteraque iis contraria, quæ fuperius comprehenfa funt. Æquè bonum fignum eft, ruborem, tumoremque quam maximè foris in collo, & in pectore confiftere. Tum namque extrà ferri morbum fciendum eft. Perniciofum autem eft, tumores fine bonis fignis, fine manifefta caufa defiffè, itemque præcordii dolorem fine judicatione fub infirmis viribus, atque corporis

ris torpore coortum esse : si quidem tum latenter mors adoritur , tametsi perquam rectè habere se æger existimet. Omnia autem in eodem morbo pestifera sunt , quæ non manifestum dolorem exhibent , neque in collo (ut modò proposui) neque in faucibus evidentem tumorem. Si autem tumor , atque faucium rubor est , ingens quoque periculum ostenditur : sed morbus longior erit , utique si major rubor est. Morbus quoque producitur , ubi & fauces , & cervix , & pectus simul rubent : quem casum ferè secunda valetudo sequitur , mox rubores non intrò recurrant , id quod tum metuendum est , cùm subito hi evanescunt , simulque pectus grave fit , ac difficiliorem homo habere spiritum incipit. Tum profecto malum ad pulmonem vertitur , & delirium movet , & pullum facit undosum , intraque septimum diem occidit , aut certè aliqua parte suppurat , nisi subinde pituita tussi educatur. Suppuratio autem pectoris ex prægressa angina ita noscitur. Faucium dolor sine certa ratione subito desinit , febrisque multum remissa est , insolita gravitas pectori juxta septum transversum accessit , vehemens etiam tussis , ac ferè per omnia sine sputo sicca est : A-

liud genus oritur febris inordinatum , languidum , atque hecticum. Jam autem cum in angina repente evanescit rubor , idque die non judiciali , ac neque tumor extra vertitur , neque pus tussi exscreatur , æger autem quietus , ac sine dolore esse cernitur , scire licet , aut mortem instare , aut reversurum ruborem esse. Periculosum etiam est , non citò concocta exscreari , sputumque violenter educi , idque viscosum , crassum , vel valde album esse. Æquè malum est subaridum , multumque tussim , ac lateris dolorem movens , & quod inter potandum per tussim subemergit. Angina omnis , per judicationem alterius morbi orta , lethalis est. Observatur autem & aliud esse genus anginae , quam notham dicimus , neque acutorum accensemus numero morborum. Ea frigidum humorem secuta , febris est expers , nullum autem neque ruborem , neque ardorem , aut febrem , aliquem tamen dolorem exhibet. Illud vitium , ut longius , sic & tutius esse consuevit.

*Angina
notha.*

*Vulne.
rati
mem-
brana-
rum.*

Vulneratis cerebri membranis , sequitur bilis vomitus , & dolor incidit non levis , qui intento spiritu , & adductis maxillis crescit. Ipsæ cruorem nares , & in

interdum aures fundunt : aliis trux vultus , aliis oculi , quasi resoluti hac illuc moventur , sensusque omnis , velut attonitus , stupet : nec parum multis , nervorum accidit distentio. Accedente post hæc inflammatione , febris oritur , itemque delirium , sub quo multi fascias , quibus deligatum est caput , lacerant , & nudum vulnus frigori exponunt , omnia citæ mortis præfagia. Ipso autem percusso quoque cerebro (quod facilius plenâ incidit lunâ) hæc ipsa , quæ proposuimus , graviora sunt omnia , oriturque ingens delirium , vel tertio , vel quinto die. Quinetiam ipsius interdum excidit cerebri particula. Quod si ad huius quoque partis ventriculos telum , maximèque per transfossos oculos penetravit , protinus homo vitam amittit. Nemo eorum quibus vulneratum cerebrum est , redire ad sanitatem potest. Ubi aliis partibus caput ictum est , optimum iudicatur febrem non esse , neque auribus cruorem , vel naribus , vel ore promanasse , neque inflammationem , neque ullum simul dolorem accessisse. Si autem quid horum inciderit , tutissimum est inter ipsa incidere initia , neque diu tamen immorari. Conducit etiam sub

acutis doloribus inflammationes appare-
re, & pus in sanguinis eruptionibus fer-
ri. Cæterum pessimum est stuporem,
aut delirium accessisse: itemque lethale,
febrem die quarto, aut septimo, aut un-
decimo esse cœpisse. Itaque pereunt ple-
rique omnes; si quarto die febris orta est,
ad undecimum: si septimo, ad decimum
quartum, aut ad decimum septimum: si
undecimo, ad vigesimum.

*Observationes in vitiis pectoris, & cordis
utiles.*

PECTUS lateribus cingitur, intus pulmo.
atque cor sunt. In his varia genera
morborum fiunt, quæ nunc proponam.
Incipiam autem à laterum inflammatio-
ne, quam Græci πλευρίτιν dixerunt. Ea
has notas habet: Pungens atque disten-
dens dolor latus exercet, ilque modò ad
jugulum, & ad claviculam, modò ad
præcordia, pro situ morbi, procurrit:
febris adest acuta, & continua: & spiri-
tus difficilis, frequens & parvus: acce-
dit etiam tussis, initio quidem sicca, qua
nihil expectoratur, sed mox ferè humi-
de ea fit, ex locoque affecto ducere ali-
quid incipit. Id primò flavè coloratum,

Πλευρί-
τις.

postea rubrum , ac cruentum , dein maturata inflammatione , purulentum est. Pulsus autem frequens est, & inæqualis, durus ,ensus , neque nimis magnus. Hunc morbum (ut si quid aliud) sputa bona citò, facilèque rejecta, & salubrem fore, & brevem ostendunt. Itaque esse id malum in principio statuitur, dum nihil extireatur de latere affecto : sed tenuis solummodò è pulmone pituita , vel crassum quid , & tenax , & rotundum , idque cum difficillima tussi fertur.

Incrementum morbi dicitur, ubi sputum jam utcunque concoqui cœpit , majorique copia, & facilius flavum educi, & ex liquido magis crassescere, & ex cruento magis album fieri.

Status autem ex plurimo cognoscitur sputo , eoque albo, levi & æquabili , quod & promptè rejiciatur , & maximè dolorem levet. Declinatio deficiente dolore, & sputo, & febris, similibusque aliis animadvertitur. Sed sputi ubique intueri notas oportet. Optimum enim id esse judicamus , quod modò in statu esse hujus morbi propositum est. Proximum est id, quod statim flavo admodum mistum est. Quod si non protinus , at longè post dolorem educitur flavum,

vel non mistum, multamque tussim movens, malum est. Flavum autem sanguine mistum non multo, in principio quidem, salutare est, septimo vero die, aut post, minus tutum. Subcruentum ab initio malum non est. Sincerum autem, vel cruentum, vel flavum, periculosum est, sic, ut hoc tamen deterius illo sit. Malum id etiam ex cruda pituita album: tum viscosum quoque & rotundum inutile est. Eò deterius est id, quod ex virore valde pallidum est, itemque quod spumosum, & quod lividum, vel æruginosum est. Muscosum autem, quod ad concoctionem citò colatur, idque intra quintum diem, tutius est. Vehementer autem cruentum periculosum est. Sic autem se res habet: Omne sputum quantò magis commistos, non inter se deductos colores habet, tantò deterius est; & tamen nihil pejus est, quàm sincerum id exscreari, sive flavum est, sive cruentum, sive glutinosum, sive spumans. Quod si ita meracum est, ut etiam nigrum sit, præcipuèque si unà etiam foetidum, hoc ipsum omnium pessimum est.

Omnia verò mala sputa sunt, quæ
do-

dolorem non sedant : optima , quæ sedant. Quicumque incipiente hoc morbo sputum exscreat omninò purulentum, is tertia die , aut quinta perit : quod spatium si transit , haud multò melius valens septima die , aut nona , aut certè undecima , incidere in suppurationem potest : Etsi perquàm rarò observatum est , quenquam supra diem durasse quartum decimum , qui purulenta septimo , aut antè spuerit. In omni lateris inflammatione , dolores magis ferre interdiu , quam noctu leviores sunt. Eundem morbum in nervorum rigorem , vel distentionem (illum *τέτανος* dicunt , hanc *σπασμὸν*) verti , pestiferum est : æquè ut in pulmonis inflammationem , quæ Græcè *πνευμονία* vocatur. Ad cerebrum etiam aspirare materiam , ibique delirium , amentiamque facere , mortiferum est. Idem exitium denunciatur , si morbus dorso inhærescit. Tum autem rigor invadit , & febris , & molestissima tussis , ipsum dorsum , tanquam illatâ plagâ verberatum , dolet , cumulataque fit cum suspirio respiratio : pauca autem tussiendo eliduntur , modò ex virore pallida , modò etiam subcruenta : dolor in inguina incidit : ter-

tio

rio quartove die urina mejitur cruenta, totum corpus velut ex itinere lassum est : mors occupat die quinto, aut certe septimo : quem diem si morbus (quod tamen rarò fit) superat, sanescit. **L**ateris inflammatio omnis senibus, & foeminis uterum ferentibus perniciosa est, itemque iis quibus secundò jam, tertiove recurrit. Occidit autem hic morbus, aut magnis symptomatis, aut præfocatione, aut materiæ translatione ad alium locum, unde inflammatio pulmonis, tabes, syncope, infania. Dixi sub quibus casibus certum exitium est : nunc, in quibus grave periculum vertitur, proponam. Ergo si sputum multum intus in pectore strepit, & tristior vultus est, oculi colore auriginis imbuti, ingens esse vitæ discrimen significatur. Periculosum quoque est nihil exspui, neque quicquam à pulmone extundi, sed plenum fervere in gutture. Æquè malum est hominem ante probè spuisse, ac deinde ex toto spui desisse, sic ut subinde neque gravitas in pectore, neque dolor cessent. Metum quoque non levem facit pectus vehementer calens, extremis multum frigentibus, itemque increfcescens dolor, cùm in latus vel in-

fir-

firmum, vel sanum cubatur, sic ut supinum esse ægrum necesse sit : adhæc longè post morbi principia infirmis jam viribus fusa alvus, ex qua non corporis inquietudo, non ipse spiritus levatur.

Æquè grave discrimen est, si morbus dolores supernè exhibet, aut in posteriorem corporis partem, aut si ficcus is, & sine sputo est : nisi ipse tamen per se levis sit, ut parum materiæ videatur expurgandæ. In sinistro etiam latere plus periculi quàm in dextro habet : verùm in sinistro citius maturescit, & solvitur. Omne verò morbi hujus periculum, ferè maximum esse, vel septimo die, vel nono solet. Atque hæc omnia terrere aliquo periculi metu possunt. At securitatis indicia sunt, protinus à primo die facilè exspuisse, & flavum sputo mistum esse, eoque dolorem levare, non ægrè hominem ferre morbum, facilè respirare, ac sine siti esse, itemque strepitum in pectore non fieri : adhæc somnum, sudorem, urinas, alvumque probè habere : totum denique corpus æquali calore temperatum, ac molle esse.

Ubi hujus morbi dolores non conqui-

quiescunt, neque missio sanguine, neque sputorum exscreatione, neque victu, neque fomento, aut medicamentis; & tamen non lethaliter affectus æger videtur: scire licet suppurationem, seu abscessum fieri. Qui casus certissimus fuerit, si intra dies quatuordecim morbus sputo non depurgetur. Orta autem suppuratione, si ea post ruptionem omnis intra dies quadraginta exscreationibus tollitur, sanitas redit: si non tollitur, tabes sequitur. Quæ verò suppuratio sputo etiamnum bilioso orta est, sive id sincerè biliosum, sive unà cum pure est, majus periculum minatur, præcipuè si, quum septimum jam diem morbus attingit, suppuratio ab hujusmodi fieri sputo cœpit. Metus enim est (nisi quid subinde intervenerit boni) mortem die decimo quarto secuturam. Verum operæ pretium videatur, notas, quibus incipere suppurationem quis intelligat, proponere. Nihil, aut certè parum tussis, cujus magna tamen cupiditas est, exscreatur, simulque febris, & cum nova, insolitaque gravitate, dolores acrius urgent, idque cum aliàs semper, tum maximè per noctem: spiritus etiam admodum difficilis est: venæ sub lingua

inal-

inalbescunt : malæ rubent : perit cibi cupiditas : crescit potionis desiderium : vigilia exercet : juxta claviculam & collum sudores fiunt. Quod si fortè malum in vetustatem incidit, oculi etiam cavi redduntur, & in manibus adunci ungues, summique digiti refrigescunt: multis denique sudor toto corpore oritur, & in pedibus tumor. Quod suppurat ea quam afficit parte, inflammationem, doloremque movet, multoque quam proxima loca, calidius est: & si in partem aliquis non infirmam decubuit, onerare ægrum, veluti pondere videtur. Confecto jam pure, paulum quid & febris, & dolor remittunt, sæpè etiam, prout sensus judicat, desinunt: verum gravitas loci increscit, tussis vehemens, siccaque est, etsi ad hanc interdum humidum quid accedit, ex quo levare subinde homo videtur.

At verò ubi jam turgens abscessus perumpit, horror fit, ac vehementior febris, cor intremescit, hominisque robur quasi labi videtur, spiritus debiliter trahitur, ipseque æger in sermone conturbatur, offensus inspiratione: pulsusque debilis fit, & tardus, & rarus. Sed ne hæc quidem, etsi horrenda videntur,

tur, terrere protinus debent, dummodò caulâ perrumpentis abscessus, non virium radicitus afflictarum contingant: utique si signa quoque in sputo & similibus cernuntur bona. Ferè enim sequitur, ut hæc ista turba paulò post ultro quiescat. Quo autem temporis articulo abscessus rumpitur, tum transfluere aliquid profundo in pectore, prout variè corpus reclinatur, apparet, atque hinc pus educitur modò purum, modò fæculentum. Ruptiones rarò fiunt decimo quarto post cœptam suppurationem die, rarissimè septimo, plurimæ in vigesimum incidunt, aliæ ad quadragesimum, nonnullæ ad sexagesimum etiam perveniunt. Supputandum autem ab eo die est, quo quis gravitatem loci affecti pro dolore sensit, cæteraque suppurationis habere signa cœpit. Hæc signa (inter quæ præcipua potentissimaque, febris est, & post hanc spiritus difficilis, & dolores) quò plus exhibent afflictionis, hoc eruptio fuerit celerior, quò illa mitiora sunt, eo hæc ipsa fuerit tardior. Itaque ferè sequitur, ut si ab ipso principio, vehementior tum dolor, tum tussis, tum spiritus difficultas fuit, abscessus circa diem vigesimum, vel antè erumpat.

rumpat. Rarò quidem, at interdum tamen, abscessus tum lateris, per intestina & alvum, tum pulmonis, per vesicam cum urinis expurgari visus est. Sæpissimè autem, ac tantùm non perpetuò, sese inane exonerat pectoris spatium, ex quo materia intra diem quadragesimum tussi rejicitur, quod ni fit, tabes, ut proximè dixi, succedit. Ex rupto abscessu maximè sine metu est is, cui febris, eodem quo ruptio facta est die, conquiescit, ægerque appetere cibum incipit, & venter mollia, compacta, ac probè figurata reddit: & pus facilè educitur, album, leve, inodorum, & ejusdem per omnia coloris, & pituitæ omnis expers. Contra vero is perit, quem febris non defecit, aut quem, cùm semel ea defecisse visa est, iterum crescens invadit: item cui cibi cupiditas amissa est, sitis manet, alvusque ex toto liquida est, & pus extussitur ex virore pallidum, vel lividum, vel pituitosum, vel spumans. Quodcunque pus sub imbecillis viribus copiosum est. Æquè metuendum id quoque fuerit, quo specillum, veluti ab igne, coloratur. Atque hæcenus veram lateris inflammationem secuti sumus, quæ ex sanguine, eo-

H

que

*Pleuri-
tis no-
tha.*

que potissimum bilioso inter costas, & has succingentem membranam, aut certè in musculis intercostalibus orta est. Verùm, non ut hæc, genuina, sed notha est ea πλευγίτις, quæ vel ex destillatione, vel ex flatibus, vel alioqui, etsi vera inflammatio quoque ut prima est, musculos tamen occupat pectoris exteriores. In hoc morbi genere omnia insunt mitiora, quàm in vera lateris inflammatione. Verùm dolor externa compressione ingravescit, molestè æger in partem sanam decumbit, in affectam facilius: pulsus, quamquam frequens, & inæqualis, nequaquam tamen (quia non afficitur membrana) aut tensus, aut durus est. Porro dolor lateris acutus, tum ex destillatione pituitæ, tum ex flatibus, quantum in se est, febre caret, Flatus immanissimi doloris tormentum excitat, quod tamen fomentis, atque frictionibus levatur, & sæpius etiam discutitur. Is dolor non uni inhærescit loco, sed ferè huc illuc per latus vagatur. Ubi autem destillatio humoris frigidi causam morbi dedit, evidens causa prægressa est. Nam primùm cervicæ, vel scapulæ doluerunt, hinc materia ad pectoris externos musculos delata ibi dolorem,

lorem, quem dico lateris, movet, qui & pressu crescit, neque, ut is qui ex flatu est, fomentis auscultat. Non rarò autem observatum est, ex his quos fieri dixi, tum ex destillatione, tum ex flatu doloribus, si nimium vel graves, vel diuturni sunt, ortam etiam veram lateris inflammationem esse. Dolere quoque latus tumidi vel jecinoris, vel lienis causâ potest, horum scilicet viscerum pondere membranis retractis. Sed hæc vitia propriis signis suo loco discernenda, æstimandaque sunt.

A costis ad pulmones veniam. Horum inflammatio Græcis *περιπνευμονία* dicta est, quæ his notis cognoscitur. Febris continua, atque acuta est, difficilis spiritus, frequens, & calidus, itemque tussis, & præcordiorum totiusque pectoris gravitas, atque distentio, idque sæpissimè sine dolore: malæ cum tumore rubent, in has subinde quidam veluti igneus fervor aspirare ab inferiore corpore videtur: nares autem simæ in summo sunt: venæ temporum grandescunt: oculi eminent: lingua sicca est, prius ex flavo rubescens, dein procedente morbo, crassa, nigraque redditur, tandem etiam finditur, digitoque admoto

adhærescit : aliquis etiam medio spacio scapularum dolor versatur : ingens cibi fastidium , frigidique tum fontis , tum aëris hauriendi cupiditas est : pulsus undosus , mollis , magnus , celer , rarò bis pulsans , sæpe intermittens , & intercurrentes est. Si quid tussi rejicitur , spumofum id est , ac modò cruentum , modo flavum. Ipse æger lubenter supinus cubat : nam in latus reclinatus , quasi enecari præfocatione videtur. Ubi gravius malum est , continua oritur vigilia , simulque soporosi , sed tamen breves somni tenent , sputum admodum cruentum , ac floridum sequitur , incipiunt frigere extrema , unguetque lividi curvique fieri. Sub hoc casu , si sanguis è naribus ubertim fluit , ac fusus venter multa biliosa , & spumosa reddit , expectari bona valetudo potest : sin minus , non potest. Quarto enim die , aut ad summum septimo , certa mors venit. Ferè autem quæ in lateris , eadem & in pulmonis inflammatione , & mitiora esse signa , & graviora solent. Morbus tamen pulmonis plus periculi , quàm doloris habet : utque aliàs semper , sic tum potissimum lethalis est , cum insaniam movit. Idem si natus ex angina est , ferè intra diem

diem septimum occidit, aut transit in tabem. Destillationes autem, & sternutamenta, tum antecessisse morbum hunc, tum secuta esse, periculosum est, multoque magis si subita inter hæc accesserit dejectio. Erectum sedere ægrum cupere, atque decubitus omnem odisse, ut in acutis morbis malum, sic pessimum in inflammatione pulmonis & lateris est. At verò tutius esse malum judicatur, quod expeditam per sputa non mala purgationem habet. Neque inter initia terri oportet, si protinus sputum ruffo quodam, & sanguine imbutum est, dummodo statim id exscreetur. Quinetiam si sputo ipse levatur dolor, quamvis id purulentum est, æger tamen facile spirat, facile exscreat, morbum ipsum facile sustinet, potest ei secunda valetudo contingere. In eodem modo si abscessus ponè aures oritur, & ad suppurationem, maturitatemque pervenit, aut si idem inferioribus locis corporis enascitur, & in fistulam abit, spes esse multa vitæ debet. Jam verò ubi sputum pro ratione non prodit, & febris dolorque manent, neque alvus bilem multam profudit, neque urina multa cum multo sedimento micta est, & nullæ tamen exitii notæ sunt,

scire licet morbum suppurare. Ex quo casu homo servatur, si (quod rarò fit) transumpta in venas materia, per urinas, aut per alvum exturbatur, aut si (quod sæpius incidit) disrupto abscessu, pus in pectoris cadit spatium, indèque totum quadraginta diebus expectoratur. Hujusmodi depurgatio nisi fit, alterutrum sequi necesse est: aut ut exulcerato pulmone tabes occupet, aut ut pure acervatim in spiritus instrumenta ruente, protinus homo præfocetur: quod ubi incidit, semper æger difficilius indies spirat, tractoque spiritu stertit, tandem autem obturatur à sputo, & moritur. Quòd si abscessus ne multo quidem disrupti tempore possit, sive sponte, sive ope medica; consumitur profectò æger, vehementibus doloribus, nutritionis defectu, tussi & febre debilitatus. Æquè verò etiam perit, si cùm sic extenuatus aliquis est, abscessus in lectum reclinato erumpit. Jam verò si id quod suppurat erumpit quam citissimè, ex toto maturum, & plurima sui parte ad septum transversum effunditur, protinus levatus esse æger videtur. Atque hinc fanè, ubi totum tussi rejicitur, ipseque in quo pus erat ventriculus resiccatus fanescit,

nescit, ipse æger imbecillus non exscreat: scire licet certò hunc ipsum periturum. Itaque tum etiam si uestus vel sectus fuit, pro tempore quidem moderatius habet, at nihilominus tamen interposito spatio extinguitur. Suppurationes à morbis pulmonum ortæ ferè fenes tollunt, aliæ juniores.

Erysipelate etiam capi pulmo solet. ^{Erysipelas pulmo.} Tum febris oritur longè ardentissima, dolorque antè, & retrò acutus, maximè circa spinam, tametsi pectus non æquè gravè & angustum est: spiritus erecta cervice trahitur, & præ ardore æger, veluti equus à cursu, nares expandit, & linguam ut æstuans canis exerit: vomitus fit modò subcruentus, modò lividus, idemque aliàs bilem, & pituitam trahit: adest etiam frequens (quod familiarissimum hujus morbi signum est) animi defectio: tussis vel sicca est, vel flavum sputum trahit non multo imbutum sanguine. Illud malum citissimè ac ferè semper hominem tollit. Evadere aliquis potest, si desertis interioribus, foras versum Erysipelas est.

Non omittendum autem id vitium pulmonis est, quod ex tenui, acri, multaque destillatione è capite confectum &

in hunc ipsum illapsâ oritur. Scilicet hinc multus ardor, & febris excitatur, quæ febris, quia lenta est, paulatim hominem consumit. Ad hanc & tussis & spiritus difficilis accedunt, sic ut nullum tamen vel ulcus pulmonis, vel sputum cruentum adfit.

*Cru-
dum
pulmo-
nis tu-
bercu-
lum.*

Interdum etiam crudo tuberculo pulmo impeditur. Initio dolor exilis est, tussis sicca, cum magna inspiratione, subdifficilique spiritu, calores item oriuntur, doloresque obscuri antè & retrò fiunt. Ferè autem eadem hîc quæ in Astmate signa apparent, nisi quod crudum tuberculum pulmonis sensim crescit, non prægressâ destillationis alicujus notâ, quodque sub hoc ipso difficilis respiratio sine ullo stertore, ac sibilo est. Si altius intra pulmonem in vitium insedit, pulsum exhibet varium, inæqualem, intermittentem, vel etiam intercisum, qualis in Antipatro medico fuit. Tum certè non sine causa (quia vitium levibus arteriis inhærescens propius ad cor accessit) animi quædam defectio, & palpitatio cordis incidere consueverunt. Itaque mortiferum esse id malum, ubi ita promovit, solet. Expectari autem salus potest, si asperis in-
fidet

fidet vitium arteriis , citóque mature-
fcit , & erumpit , fimulque pure exfcrea-
to univerfo , penitùs reficcatus , quo id
tenebatur , ventriculus fine ulcere ma-
net. Quæ omnia ni fiant interposito
fpatio , confumtus homo perit.

Occultum profectò vitium , & quod *Vomica*
fæpè fiducia fecundæ valetudinis fallit , *pulmo*
vomica pulmonis eft. Hanc abfcelfum *nīs.*
dicimus exiguum , aliqua in pulmonis
parte inhærefcentem , atque arctè mem-
branulâ claufum fuâ. Id malum tabidos
maximè exercet , & eos , quibus pate-
facta , aut rupta in pulmonibus vena eft.
Spiritus autem , multo antè , quàm rum-
pitur vomica , malè olet : interdum cruor
extuffitur , femper grave corpus eft , &
tuffis difficilis diu multumque tenet ,
quam nonnunquam ipfius etiam fequitur
vomicae expectoratio : quod ubi fit , fe-
bris corripit non levis , fputumque fequi-
tur cruentum , & ingens corporis per-
turbatio : quem cafum fequi etiam bona
valetudo poteft. Non rarò , vomica ,
ubi fubitò disrupta & in cordis arcem
lapfa , celerem inopinatumque exitium
attulit.

Varii cafus , variaque pericula fieri à *Sanguini-*
fanguinis fputo poffunt , (quod vitium *nīs fpu-*
tum.

Græcis *ἐπιπύλωσις* appellatur,) utique si
 è pulmone aut pectore sanguis fertur. Ita-
 que videre oportet, anne is aliunde e-
 tiam ducatur. Ergo à capite hunc de-
 scendere credendum est, ubi titillatio in
 palato, frequensque scretus est, ubi
 tussendi quidem cupiditas, sine multa
 tamen tussi est, ipso cruore ad guttur il-
 lapso, iterumque sursum scretu per os
 rejecto: si quidem is sese in linguam pro-
 tinus infert rotundus, subniger, ac satis
 multus, itemque lenis cum pure & pi-
 tuita mistus, cujus subinde pars per na-
 res emungitur mucò delibuta: magna
 autem ex parte, capitis dolor, aut gra-
 vitas, ubi destillantem inde cruorem an-
 tecessit, levatio secuta est. Cæterum,
 qui ex faucibus & gurgulione sanguis fer-
 tur, is scretu pellitur: qui ex ipso ore,
 simplici sputatione: qui ex ventriculo,
 vomitu: qui ex gutture, tussiculâ: qui
 ex thorace & pulmone valida tussi: ubi
 de ventriculi teritur substantia, non mul-
 tus vomitur. Abundantior esse is solet,
 qui ex jecinore, aut liene deductus in
 ventriculum est, tumque spumare etiam,
 si horum aliquod viscerum inflammatio-
 ne obsidetur, consuevit: estque is casus
 tum hîc, tum in quavis acuta febre le-
 thalis.

thalis. Jam si sanguis spumans tenuis, ac floridus, ex intervallo per tussim sine dolore educitur, hunc profectò è pulmone ferri sciendum est. Quod si factum à disruptâ venâ, præcipuè grandiori fuit, ubertim sanguis quasi vomitu quodam prorumpit, adeò, ut interdum pelves etiam implessè visus sit. Magna sanè pericula hic casus affert, vel enim nimia exanimare profusione hominem potest: vel ubi intùs cohibetur, etiam præfocare, nimiaque mole cor opprimens, inductâ syncopâ subitò occidere. Et ut quàm maximè hæc absint, vitaque maneat, gravissima tamen ulcera (nisi maturè succurritur) & insanabilia in pulmone facit. Quamquam recens ruptio non posse sanescere videatur: compertum est tamen, fuisse servatos non paucos, quibus adhibita curatio primo triduo fuit. Verùm ubi vetus malum est, medicina omnis inanis est. Minus cruentæ profusionis, minusque periculi ruptio parvæ venæ exhibet. Ubi ab erosione contractum vitium est, ejus evidentes causæ, atque notæ antè fuerunt: acris scilicet destillatio, febris, sputum purulentum, aut aquæ persimile, qua caro animalium, quæ recenter sunt mactatæ, ablu-

abluta est : his accedit , quod ipsius etiam pulmonis putrefacta particula subinde tussi redditur : ipse sanguis paulatim sputo miscetur , isque exiguus est , pulmonis exesis carnibus , at uberior erosâ ejus venâ , quæ si , ut modò proposui , grandis est , abundantissimus sequi cruor solet. Eodem tempore quod exspuitur , id parvi & coloris , & odoris est. Magnam intus esse erosionem sic licet animadvertere. Superioribus temporibus sanguis particulatim modicis intervallis extussitur , sequentibus hinc diebus cumulationior venit , sic ut neque casus aliquis , neque superfluous aut cursus , aut quid aliud externæ accesserit injuriæ. Porro cùm neque erosâ , neque exesâ pulmonis venâ , sed reclusâ (Græci id *ἀναστόμωσις* vocant) sanguis fertur ; is certe initio paucus rejicitur (quod disruptâ venâ non fit) idemque spissior est , ac magis rubeus , quàm qui à pulmonis vulnerata substantiâ , aut exesa proficiscitur. Siquidem hic tenuis est , subflavus , floridus , spumofus , atque ei qui arteriis inest simillimus. Ferè autem sic incidit , ut patefactam venam repletio corporis atque gravitas antecesserit , nullus comitetur dolor , agilitas

tas effuso cruore sequatur. Etenim hæc
vacuatio sæpè fœminis, quæ compressis
menstruis ægrotabant, levamen, auxi-
liumque mali attulit, sine ullo vel ulce-
ris, vel tabis metu. Sanguis, quem pul-
mo fundit, omnis spumam, ut proximè
dixi, habet, & sicuti multa tussi, ita
nullo dolore effertur. Qui ab aspera du-
citur arteria, etsi interdum etiam spu-
mat, dolore tamen non caret, idemque
exiguus est, & parva tussi, moxoreque
screatu pellitur. Multa ac vehemens
tussis est, si sanguis è locis trahitur pe-
ctoris profundioribus, ut in lateris & pul-
monis inflammatione: minor autem, si
à superis. Jam etiam qui à substantia
pectoris sanguis venit, subniger est, cras-
sus, & grumosus cum paucula spuma,
isque non abundanter, at sensim vehe-
menti sollicitatus tussi prodit: ipse locus
qui afficitur dolorem habet, qui dolor
per somnum etiam increscit. Minus iste
casus periculorum, quam cruor à pul-
mone redditus, habet. Expeditior enim
sanatio est, quæ si non fit, ulcus inde
non æquè malignum nascitur: quod i-
psum si in pulmone est, & tabem, &
hecticam febrem, & marcorem, & mor-
tem affert. Verùm nigricans atque gru-
mosus

mosus sanguis tussi rejectus, non semper proficisci a thorace videtur. Potest enim is, ubi nuper è naribus in fauces, & hinc in pulmones lapsus est, formam hic grumi adipisci. Qui sanguinem spuit, is si in latus infirmum decumbit, impensius id facere consuevit. Ubi vena intus fauciatata est, probèque coaluit, sæpè iterum iisdem causis rumpitur, quibus rupta prius fuit: quod ubi incidit, protinus cruor prodit, isque affatim sæpè veluti vomitu quodam profusus hominem repente strangulat: aut certè in pus crassum atque multum putrefactione versum, tandem tabe occidit. Rectè enim iudicavit Hippocrates, si sanguis in superiorem funditur ventriculum, debere non necessariò in pus verti. Nullus medicinæ locus est, si sputum cruentum ab eroso esse pulmone coepit: à venæ autem ruptione, si quidem inter principia occursum est, dum recens vulnus, & inflammatione & pure caret, observandum est secundam sæpè valetudinem contigisse. Neque enim simplex venæ ruptio tabem excitare (modò reliquus pulmo sit integer) potest. Is enim propter dimanantem ex rupta vena in se sanguinem (ubi tamen facit) afficitur. Semper autem

tem sanguinis sputum, si diu tenet, in tabem transit. Itaque rectè Hippocratem animadvertisse video, post sanguinis sputum, puris sputum sequi.

Proximum est pectoris suppurationem, quam Græci *ἐμπίμυξ* vocant, proponere. Ea has notas habet. Febricula assidua, languida, incerta, sicca, ac vetè hectica tenet, eaque interdum levior est, noctu increscit: frequens tussis, validaque est, qua nihil tamen excluditur: multus etiam sudor toto corpore funditur, post quem interdum æger inhorrescit: dolor item varia loca pectoris afficit: frequens spiritus, & vehementer impeditus est, sic ut præceps sermo & multis partibus intercisus sit. Itaque nares etiam inter spirandum arctantur, fitque per has ducti aëris sibilus. Adhuc maxillæ rubent, manus pedesque calent, & in his adunci ungues fiunt, summique digiti (ubi malum promovit) pallent. Semper autem cibi urget fastidium, quo assumpto gravius esse corpus incipit. Tussis, ut proximè dixi, sicca est, nisi quod, ubi suppuratio erupit, humida fiat, pusque fundat modò purum, modò sæculentum. Talis esse etiam solet, ubi pus ab ulcere pulmonis intus colligitur.

Resolutio nervorum.

tur. Pulsus incipiente suppuratione inæqualis est, & sine certo ordine, & per omnia hecticus. Confecto pure, fit paulò æqualior. Rupta suppuratione, latior, tardior, rarior, languidior. Ubi verò sub hoc morbo ad extrema ventum est, totum corpus sudoribus diffluit, in pedibus tumores fiunt, iis similes quos facere hydrops solet: aut certè toto corpore pustulæ oriuntur. Quæ suppuratio ab angina, vel à pulmonis inflammatione nata est, ferè utrumque pectoris finum (qui mediastino distinguitur) occupat. Quam autem latus inflammatum fecit, ea illam solummodo quæ afficitur regionem prehendit. Sed quoniam de hisce suppurationibus abundè dictum suo loco est, nunc eas sequamur, quæ fieri etiam aliis de causis possunt. Ergo si è capite pituita destillavit, & initia huic invaletudini præbuit, primùm quidem ea ferè latenter in pulmonem lata est, tenui cum tussi, & sputo liquido, præterque morem falsiore: inter quæ levis interdum jungitur calor. Interposito tempore exasperatur pulmo, & ab inhærente ac putrescente pituita exulceratur, simulque gravitas oritur in pectore, dolorque antè, & retrò, jamque magis
cor

corpus incalescit, totumque impotens fieri & extenuari incipit. Spiritus etiam cum sibilo quasi per arundinem trahitur. Et quidem quò magis inveterascit morbus, eò pus sincerius exscreatur, magisque febris invalescit, & tussis, sitisque vehementior est. Interdum ingens cibi aviditas, interdum vini meraci est. Nec rarò sudoribus æger diffluit. Tandem autem pedes intumescunt, alvus infernè turbatur, sputum retinetur, atque homo moritur.

Qui sic laborat, is ferè intra annum corruptus perit. Sub eo tamen casu, expectanda bona valetudo est, si prius pituita, quam ad pus ventum sit, expuitur, aut si intra vigesimum diem (ut ferè fit) intus maturata tum quoque sputo eliditur. Nisi enim hæc ista contingunt, vel tabes exulcerato pulmone sequi solet, si acris est humor, vel certè Asthma, si ignavus atque expers mordacitatis est. Porrò fit etiam non rarò, ut pituita de capite illapsa ad latus, membranis interclusa, adglutinetur, atque suppuret. Quo casu latus, ut plurimum, exardescit: spiritus multus est: vox rauca fit, qua parte corporis morbus est, ea pectus paulum incurvatur: tandem pedes,

des, genuaque intumescunt, interdum horrores incidunt, sæpè copiosi sudores. semper imbecillus homo est, & modò calidus esse, modò frigidus deprehenditur: ungues etiam contrahuntur, & alvus calefcit: orta que præfocatione, vel certè viribus exhaustis, mors incumbit, nisi rupto abscessu multò priùs, quàm hæ notæ cernuntur, pus omne sputo vacuetur.

Cæterùm si propter ruptam venam facta exulceratio pulmonis, atque puris collectio est, hæc signa comitantur. Sanguinis pars confestim spuitur, pars in pulmonem fusa computrescit, & in pus vertitur. Post sanguinis namque sputum, ut superius retuli, puris sputum est. Interposito spatio, aliàs pus sincerum, aliàs cruore mistum aliquo per tussim fertur. Quod si autem grandior, repletiorque vena est, sanguis interdum magnâ copiâ effunditur, atque hinc crassum pus excreatur. Hujusmodi casus juniores citiusprehendit, gravius afficit, & citius tollit quam seniores: tametsi, utrosque succumbere juxtà necesse sit, utique si vetus jam malum est, simulque incipit affici caput, & corpus tabe consumi. Similis etiam suppuratio fieri à vul-

vulnere potest, quod aliqua parte in pectus illatum est. Sanguis enim in vacuum pectoris illapsus, non potest in pus non verti. Itaque idem incommodum non sine causa etiam metuitur, ubi sauciato pectore foris tantum, non item interiore parte sanatum vulnus est. Haud sæpè venæ pulmonis atque lateris, quibusdam veluti varicibus occupantur, tumque primum quasi acutus quidam incidit tractus, quem tenuis dolor & tussis arida sequuntur. Ubi jam diu vitium (ut fit) neglectum est, modicum sanguinis, ejusque subnigri (si è pectore morbus est) exspuitur: hinc idem majore copia sincerissimus venit, & post hunc, pus ipsum, unde tolli hominem, ut in superioribus casibus monstratum est, interposito tempore contingit. Nunc in genere de suppuratis hæc addam: Si eo qui sic laborat concussio, multus intus auditur strepitus, scire licet, hunc ipsum minus habere puris, faciliusque spirare, & melioris coloris esse. Cui autem nullus fit strepitus rupto jam pridem abscessu, verum ingens spirandi difficultas est, & ungues livescunt, is pure scatet, ac brevi perit. Quod latus pus habet, id & gravius, & calidius est: ubi in id quod

sanum est cubatur, major tussis, majorque angustia, & gravitas est: ubi autem in infirmum aliquis decubuit, tum hæc ista, quæ proposui, minuuntur, tum melior sequitur somnus, magisque materia & maturescit, & exspuitur. Febres intermittentes suppurationem secutæ, cum multis esse sudoribus consueverunt. Suppurare dolores juxta præcordia & pulmones, periculosum est. Ferèque sequitur, ut cum omnis longus tumor ad suppurationem spectet, tum is maxime, qui his locis inhærescit. Si quum uritur aut secatur aliquis propter hunc morbum, pus universum, semelque effluxit, certa mors sequitur. Quod si paulatim moderatis portionibus emissum, subcruentum est, vel lividum, vel nigrum, itemque coenosum pariter ac foetidum, æquè certum pernicipis indicium præbet, magisque, si unà etiam syncope comitatur. Sperare salutem id jubet, quod sub viribus non infirmis purum, album, & æquale est. Sollicitato in pectore per multam tussim pure, si nihil tamen ejus redditur, homine jam tum imbecillo, mortiferum est. Per eundem morbum, si, cum quis rectius habere videtur, sputum excreat graveolens, maxi-

maximèque ubi carbonibus injectum ignitis est, hunc mali recidiva occidit. A puris sputo tabes & fusa alvus, mortifera sunt. Ferè autem qui reliqua parte anni vitam infirmam traxerunt, eos Autumnus tollit.

Proxima his vitiis tabes est, ea scilicet quæ exulceratum sequitur pulmonem, & cruentis exscreationibus succedit, Græci *φθίσις* vocant: ubi ea incipit, frequens tussis est, & sputum sine dolore cruentum, idemque post sordidum, ac mox verè purulentum redditur. Tum corpus extenuari incipit, assiduaque, atque hæctica febre affici, quæ sumptus epulis, & per noctem invalescit; per vehementes labores, aut tussés, vel iram, sanguis nonnunquam inter puris sputa exscreatur. Ubi crescit malum, perniciemque propinquam minatur, summum urget cibi fastidium, crescit potionis desiderium, oculi concavi fiunt, & nares acutæ, & tempora collabuntur: scapulæ foras veluti alæ prominent: summa pectoris gravitas est: pus injectum carbonibus, vel per se foetet: curvi, pallidique ungues fiunt: capilli excidunt: profluit alvus: pedes intumescunt: pars subinde aliqua putrefacti pulmonis

I 3

exit:

exit : sputum tandem penitus supprimi-
tur, homoque perit. Longum hoc ma-
lum est, & certam ægrotis perniciem
affert, eique magis opportuna ea ætas
est, quæ anno decimo octavo, & trice-
simo quinto intercedit. Corpora autem
citius afficiuntur gracilia, pressi pecto-
ris, & colli longioris, magisque si sca-
pulæ macræ prominent, si intortæ tibiæ
sunt, si frequentes destillationes. Au-
tumno id malum & nascitur maximè, &
occidit. Pueri facilius cæteris liberantur.
Ex aliis minus convalescunt, & virgi-
nes, & hæc foeminæ, quibus principium
morbi retenta menstrua dedere. Ferè au-
tem is homo, de quo sub hoc morbo
spes haberi aliqua potest, sputum ex-
screare debet album, per omnia æquale,
tum substantiâ, tum colore, simileque
etiam esse id debet, quod à capite in na-
res destillat. Optatissimum est, febrem
non esse : secundum est, tantulam hanc
esse, ut neque cibum impediat, neque
crebram sitim faciat. Bonum itidem est,
coactam indies dejectionem esse, atque
iis quæ assumpta sunt mole respondere.
Pestifera contrà cita alvus est, itemque
vomitus frequens, ac præcipuè cruentus.
Cum in omnibus morbis incommoda tu-
mida

mida præcordia , tum maximè horrenda in tabe sunt. Signum quoque esse solet non bonum , si post lubricam alvum corpus prurigine afficitur. Jam etiam sputum mistum purulentum , idemque fœtidum , quod halitus etiam contagione imprudentes alios labefactat , assiduaque febris , & quæ opportuna cibo tempora eripit , & multam sitim movet , in tenui corpore certum esse periculum ostendunt. Æquè pestiferum est pus aquæ , potissimum marinæ , non innatare , sed protinus ad imum sedere : aut id antea exspui solitum , nunc spui ex toto desisse. Tum enim errare mens incipit , ac primo ferè abhinc quatruiduo mors occupat , peritque æger à cita alvo , ipso loquente , atque res omnes intelligente. Quare satis anceps fallaxque in hoc morbo novissimus vitæ articulus est. Idem malum magna ex parte à parentibus ad liberos transit : sic ut integras etiam familias veluti quodam hæreditario jure oppugnet. In his autem , alii prius cruentum exspuunt , inde pus : alii humorem diu liquidum & sufflavum , ac tandem sanguinem cum pure exscreant : alii latenter etiam , sine sanguinis sputo , sine signis momentaneæ destillationis prægeßis con-

tabescunt. Tabe verò, vel post sputum cruentum, vel sine eo tandem consumitur, quisquis infirmos naturâ pulmones, mollesque, & tenellos, & languidos, & vitiatos habet.

Tussis.

Aliqua etiam tussi debetur animadversio. Ea si ex illapsu fit humoris ex capite in asperam arteriam, pulmonemque ruentis, sentitur ipsis faucibus quædam quasi titillatio, & sæpè molestus ardor: ipse fit subinde difficilis spiritus: &, si quidem tenuis humor est, nihil aut certè quàm minimùm tussi eliditur. Solet etiam eadem sicca esse compresso septo transverso, aliisque partibus, quæ respirationi inserviunt: sequiturque aliàs etiam affectum jecinoris, lienis, ventriculi, atque uteri: aliàs frigus externum, aut tuberculum, aut ictum pectori illatum. Ut autem humor præter modum tenuis, sic & nimium tenax, atque crassus siccam tussim facit: estque id deterrimum tussis hujus genus, quod virium sequitur infirmitatem. Permotâ enim intus materiâ, neque eductâ tamen, nihil mirum hominem, sub imbecillis viribus labefactatum, mori. Quæcunque tussis modico fit conatu, celerique ac facili materiæ educatione, cum multo levamento,

&

& sine dolore, five oculorum rubedine, optima esse censetur : quæ contrà fit, pessima. Si, cùm prius humida tussis fuit, nunc subitò sicca redditur, sic ut pectus grave maneat ; scire licet febris vel putridæ, vel hæcticæ, aut pulmonis exulcerationis periculum instare. Omnis tussis mala, quâ somnus aufertur. Inutilis etiam, quæ longo tempore frequens, gravisque hominem exercet, idque cum destillatione. Hinc enim sanguinis sputum, & tabes sequi consueverunt. Ferè, ubi vitiosus pulmo, aut vetus intra pectus obstructio est, continua exercet tussis, nullis intermittens temporibus.

Quæ verò à destillatione est, ea quibusdam intervallis, prout humor irruit, bis terve per annum molesta est. Si lentus intus humor est, vehementissima, eaque sicca fit tussis, qua nihil ferè rejicitur : spiritus difficulter trahitur, idque cum quodam stertore ac sibilo, qualis audire in ipsa anhelatione solet, de qua nunc agendum est.

Difficilis spiratio multa sequi pectoris vitia potest, quorum observatio superioribus locis proposita est. Nunc notas ejus affectionis sequar, quæ propter humorem pituitosum pulmonibus infartum,

Difficilis spiratio.

Anhe-
latio

spirationem difficilem facit. Græci, ubi leve id vitium est, δύσπνοιαν vocant: ubi vehementius est, & spirare æger sine sono ac sibilo non potest, ipsi ἀσπμα, nos Anhelationem dicimus. Quod malum si ita crevit, ut spiritum difficillimè, ac non nisi rectis trahi cervicibus sinat, rectè ορθόπνοια dicitur. Ergò in Anhelatione pectus grave est, & crebra veloxque sine febre respiratio: quæ adeò molesta est, maximèque inter laborem corporis, ut homo, ac si cursu agitatus esset, ob angustiam pectoris propè suffocetur, ejusque rei metu, toto subindè recto corpore, rectaque cervice nitatur, ad trahendum spiritum. Quinetiam is ipse spiritus, quoniam angustis itineribus effertur, quendam veluti sibilum tenuem movet. Præter hæc dolor aliquis in pectore, & in præcordiis versatur, interdum etiam in scapulis, isque modò intermittit, modò revertitur. Quibus omnibus tussicula etiam intervenit. Id vitium longâ vetustate pulmones primùm, concretâ in grandinem pituitâ, & dein veris subinde calculis implet: quos tum secto corpore deprehensos, tum á vivis per exercitationes validâ tussi præduros rejectos, hordei, aut pisi magnitudine esse,

esse, quorundam observatione comper-
tum est. Dispnoea sine omni incommo-
do trahere diutius potest. Anhelatio ve-
rò, atque Orthopnoea, etsi longa quo-
que sunt, gravia tamen esse possunt, sæ-
peque, ubi inveteraverunt, subito stran-
gulatu hominem tollere. Eædem qui-
busdam temporum intervallis graves ac-
cessiones habent, quæ magis cœlo fieri
humido ac frigido, maximèque inter
multam crapulam solent. Quod si nova
inter hæc quoque destillatio irruit, ferè
hominem præfocatione occidit. Ex quo
ipsa quoque præfocans appellata est.
Semper meliori utuntur valetudine, qui
anhelationem patiuntur, per quietem
corporis, per jejunium & sereno cœlo.
Anhelationi magis expositi sunt hi, qui-
bus frequens destillatio ac tussis est, præ-
cipuèque si senes sunt, & angustos pul-
mones habent. Plerisque etiam aliis ac-
cidere hic morbus solet, maximè his qui
vel naturâ, vel otio, vel victus intem-
perantiâ redditi sunt obefiores. Anhela-
tio magna ex parte senes tollit: in aliis
difficillimè sanescit.

Periculosa tremula spiratio est, & pul-
sus inæqualis, inordinatus, intermittens,
deficiens: & quidem quò gravius malum
est,

est, eò magis fit languidus & magis tardus. Pessima inter hæc syncope est. Ad extrema ventum esse testatur spiritus parvus, tardus, & frigus: itemque pulsus ex tardo factus nimis creber, & languidus, cætera ei, quem mox retuli, similis. Interdum observatum fuisse constat, Anhelationem in pulmonis inflammationem transisse. Ex eodem morbo si factus aliquis gibbosus est ante puberem ætatem, perit.

*Vulne-
ratio
pulmo-
nis.*

Ictus pulmo his signis innotescit. Sanguis ex ore spumans, ex plaga rubeus fertur: spirandi cum sono quodam difficultas est: commodius in vulnus ipsum cubatur: etenim tum nonnulli loquuntur, qui, in contrariam conversi partem, obmutescunt. Ex vulnere nisi quis primis temporibus extinctus est, febre atque marcore sensim consumitur, ac perit.

*Vulne-
ratio
pe-
toris.*

Transfosso pectore, cum quis expirat, flatus è plaga exilit, vulnere si indita Aloë est, ejus percipit os amarorem.

*Animi
defe-
ctio.*

Nullum vitium terrere leviter debet, quod cordi accidit. Tolerabilis videri potest, modò brevis sit, animi defectio, quam Græci *λευποθυμία* dicunt. Scilicet non omnes semel (ut in syncope fit)

vires

vires collabuntur : sed spirituum tantummodo resolutio, ipseque ferè, qui sic afficitur homo, præsentes audit, videt, agnoscitque.

Gravior cordis is morbus est, quo ipsum veluti concussum intremittit, & palpitat. Græci παλμόν τῆς καρδίας, nos Palpitationem appellamus. Arteriæ toto corpore vehementer pulsant, nec rarò etiam dilatantur, maximèque hæ, quæ supra jugulum sunt. Idem morbus frequenter, ac præcipuè per quietem corporis intermittit : at superfluis laboribus, meraciore vino, concubitu, balneis atque irâ recrudescit. Palpitatio cordis si diutius trahit, periculum ostendit repentinæ mortis. Æquè ea horrenda est, si crebrò incidit, idque post solutos morbos, cum multa nausea, & bilis vomitu, qui vomitus neque nauseam, neque palpitationem cordis finit. Quibus autem hic morbus post menses aliquod, vel etiam post annum recurrit, eos ante senectutem omnes morte præveniri observatum est : alios quidem febribus fractos acutis, alios præcipite syncopâ raptos. Idem vitium iis familiarius est, qui intra quadragesimum annum & quinquagesimum sunt, & quos flatuosa me-

melancholia fatigat, & quibus atrâ bile ipse lien tumet. Syncopen autem palpitatio cordis, & antecedere, & in eam verti solet.

Syn-
cope.

Syncope, quæ præceps est virium lapsus, pulsum abolet, aut certè summè rarum, & obscurum, penitusque formicantem facit. In ea vultus, qualis hominis est emortui, fœdus ac pallens apparet, vis sentiendi, movendique deficit, tempora, cervices, & pectus gelido sudore madent, extremæque corporis partes refrigescunt. Quæ syncope novam sequitur stomachi, multamque nauseam movet, tutior est, adeoque ἡ στομαχικὴ appellatur. Quæ verò sine causis manifestis, sine stomachi vitio, sed & crebra cum palpitatione cordis accidit, grave periculum minatur, & ipsi cordi primitus inhærescit, Græci συγποσπνὴν καρδιακὴν nominaverunt. Hæc, & senibus, & convalescentibus, & quacunque de causa vehementer debilitatis familiarior est: soletque mortem, si frequenter incidit, repentinam referre. Quisquis enim sæpè, multumque, sine evidente occasione animo deficit, hunc rectè Hippocrates scripsit subito mori consueſſe. In eo morbo præsentis nota

exitii est, facies livida, viridis, aut nigra: vel si naribus acre inditum medicamentum nullam movet sternutationem; adhæc si spiratio, atque ipse arteriarum pulsus prorsus abolentur, simulque caput in humeros, vel in pectus delabitur. Ut cordis palpitatio, si syncopem infert, mortifera est: sic multo magis syncope, si cordis secuta palpitationem est.

Vulnerato corde sanguis multus extra funditur, utique si quæ majores vel arteriæ, vel venæ in eo percussæ sunt: pulsus elanguescit, color fit pallidissimus, sudor frigidus ac foetens oritur, extremisque multum frigidis protinus mors irruit. Si sola cordis icta substantia, non item interior sinus telo violatus fuit, vita modò diem, modò noctem durasse visa est. At si in sinum quoque cordis adactus mucro est, protinus refrigercentibus extremis, præceps mors incumbit.

Ubi septum autem transversum vulnus accepit, sanguis spumans fertur, spiritus fit difficilis, & rarus, præcordia sursum contrahuntur, spina dolet, sputum editur cruentum, accedit delirium, & interdum tussis, novissimè febris, & tabes (ut fit faucibus pulmonibus) hominem (nisi is inter initia periit) consumit.

Ob-

*Observationes in ventriculi vitiis, &
intestinorum utiles.*

*Imbecillitas
ventriculi.*

INfirmum ex calore ventriculum sitis arguit assidua, qua frigida pocula expetuntur, itemque cibi fastidium, æstus, ructus nidorosus, & noxius calidorum, utilis frigidorum usus. Si frigiditas subest, contraria his quæ sunt comprehensa, incidunt. Humiditatis autem notæ sunt, nulla vel pauca bibendi cupiditas, multa saliva, commodus ficcorum usus.

Contrà res habet, ubi ficcitas imbecillitatem fecit. Si vitiatum intus humor versatur, nausea urget, & vomitus, & ructus, maximèque sumptis epulis. Cum flava intus coit bilis, supra ea quæ inesse calido ventriculo dixi, os etiam amarefcit, ipse ejicitur vomitu amarus humor ventriculus roditur, maximèque per inediam, unde syncope etiam sequi stomaehica potest, potissimum si os ventriculi acuti admodum sensus est. Quod si pituita molestat, nunquam ea ventriculum, nisi cum falsa esse cœpit, mordet, neque sitim facit, sed multum salivæ sine tussi sreatum exhibet. Tum quoque acidus fit ructus, & infirma concoctio,

&c.

& inflatio, tensioque ventriculi. Id profectò vitium, si multum increvit, magnas tensiones, gravesque dolores, aliquot à cibo horis, ventriculo infert, & sæpè maximis valetudinibus initia, ut hydropi, & volvulo præbet. Jam autem, ubi atra intus luxuriat bilis, crescit cibi cupiditas, sputum malè piscem olet: palpitatione esse in mesenterio sentitur, ex qua modò morbus Melancholiæ, modò comitialis nascitur: somnus item absurdus ac vanis imaginibus turbatur, summoque dolore furarum muscoli contrahuntur: animus denique tristitiâ, atque metu concutitur.

Aliqua etiam animadverti circa appetentiam, aut fastidia ciborum possunt. *Cupiditas itemque fastidium ciborum.* Optimum signum est omnibus in morbis, benè sese ægros, ad alimenta quæ offeruntur, habere. At cibum adversari cœpissè per longos morbos, & post eos, malum est: itemque post cibi cupiditatem fastidio ejus affici. Nullum leve malum timeri in longa appetentiæ amissione potest, maximè si contractum à frigore id vitium fuit. Æquè periculosum est, boulimo aliquem, aut caninâ *Canina appetentia.* urgeri appetentiâ cœpissè. In hac ipsa desiderium plurium epularum est, mul-
K
tumque

tumque voratur : quod quia onere ventriculi gravat, iterum vomitu extunditur : atque sic levatus homo, vorare denuo nova cupiditate incipit, rursumque ut canis, quod assumptum est, vomit. Sæpe hoc vitium boulimum, & altum soporem, & lævitatem intestinorum, & hydropem, & atrophiam, ipsamque necem intulit. Cæterum in boulimo, primum ægri multa fame urgentur, quæ tamen non omnino immoratur. Quin animus subinde iis deficit, simulque concidit spiritus, extremaque refrigerant. Tum profecto in propinquo syncope est, quam ipsa excipit mors.

Boulimos.

Singultus.

De singultu etiam dici quædam possunt. Hic pueris familiarior est. In aliis quoque ætatibus interdum per acutos incidit morbos, & per febres ardentes, maximèque pestilenciales, ac tum ferè esse lethalis solet. Idem post citam alvum, sanguinisque profusionem, & post quamcunque aliam gravem inanitionem periculum ostendit. Itaque post vomitiones etiam, præcipuèque sinceras, singultum fuisse, grave est. Idem, si causâ inflammatori oritur jecinoris, periculum habet. Sternutamentum autem singultui accessisse, utile est. Ab illo enim

hic

hic ipse absolvitur. Delirium autem intervenisse, aut nervorum distensionem, mortiferum est.

Instante vomitu, crebræ sputationes, & nausæ fiunt, stomachusque subvertitur, præcordia tenduntur, & inferius labrum tremit. Is ubi fit, minimè molestus est, ex pituita & bile mistus, modò nimius non fit. Sincerus autem deterior est, magisque si simul vel singultus, vel distentio nervorum adsunt. Præsinus item vomitus, & lividus, & niger malus est. Nigro peior est is qui omnes colores fundit non bonos. Subitam perniciem denunciat niger malè olens, qui frequens in febribus pestilentialibus esse solet. Vomitus sine febre tum esse non malus potest, cum robur sequitur naturæ, quæ id humoris, unde gravatur, expellit: qui profectò humor ex jecinore huc derivari, vel ex liene, vel mesenterio, & intestinis, itemque è cerebro, totove denique corpore potest. Verùm eo tempore multum jecinori, aut lieni (ubi hinc humor fertur) tumorem esse præstat. Quæ foemina, dum jejuna est, biliosa vomit per multos dies, si neque uterum fert, neque febricitat, scire licet hanc lumbricos rotundos simul

vomere, aut certè hos vomituram esse? Vomitus, si rarus est, juvat valetudinem: assiduus, stomachum vitiat, & inducta imbecillitate, velut lacunam proluviei universi corporis facit. Sæpè profectò vomitus, præcipuè æruginolus, distentionem nervorum, & morbum comitiales, & profundum soporem, veluti quadam judicatione finiunt. Vomitus spontaneus, si id in quo vitium est, reddit, confert & faciliè fertur: sin minus, contra. Vomitioni singultum, aut nervorum accessisse distentionem, malum est: maximè si sinceri humores rejiciuntur.

*Vomit-
us
cruen-
tus.*

Sanguis etiam vomitione extundi solet, quod nunquam fieri, nisi malè affecto homine, potest. Is sanguis cibo, vel potioni, vel pituitæ mistus fertur, estque crassus, ac jam concretione nigrescens. Hujus subinde pars ex alvo etiam fertur, ita nigricans, ut pici similis videatur. Sub eo casu mirum non est à corrupto intus cruore crebram animi defectionem esse. Qui ab jecinore proficiscitur sanguis, splendidior est, ac magis purus. Quem autem lien fundit, is turbidior, & subniger, & interdum acidus est. Cæterùm qui à ventriculi substantia

stantia detritus sanguis evomitur, nunquam ferè dolorem aliquem non exhibet. Foemina si sanguinem vomit, fufis menftruis liberatur.

Non fæpè ventriculus inflammatione *Inflam-* rapitur. Gravis & affiduus cum arden- *matio* tiffima feбри incidit dolor, qui nullis fo- *ventri-* mentis mitefcit: locus ingentem, tactu- *culi.* que circumfcriptum tumorem, & interdum visu conspicuum habet. Quicquid cibi vel potionis affumitur, id protinus vomitu, aut dejectione extunditur: nifi tamen fumma vel ima ventriculi pars tumore obfidetur, quo itinera fic arctantur, claudunturque, ut nihil elabatur. Accedit vehemens æftus, & fitis, & naufea: & quum gravius malum eft, delirium, crebraque animi defectio. Quod fi præter hæc extremæ partes membrorum inalgescunt, exitium in propinquo effe significant.

Ubi ex hoc morbo abfcelfus fit, is in vacuum abdominis, vel in ventriculi fpatium internum erumpit: moxque ipfum pus vel ore, vel alvo effertur. Quod fi intus factum ulcus aliquod eft, prorfus id lethale eft. Tum profectò lentâ, affiduâque febre homo confumitur: ventriculus summè fit infirmus, & modò

dolorem habet, modò eo caret; frequens vomitus, frequentior liquida dejectio est, pulsusque creber, ac frequens: totum denique corpus alimenti fructum non sentit, sed paulatim ad novissimum usque vitæ diem contabescit.

Nunc de intestinorum vitiis loquar, quæ & acuta esse, & longa possunt. Omnium id penè atrocissimum est, quod *χολέρα*. *χόλεραν* Græci dicunt. Bilis suprâ, infrâque magno impetu prorumpit, primum liquidior, pallida, & subflava: dein crassior, majoremque colorem exhibens, flavum scilicet, prasinum, cæruleum, aut etiam nigrum: acuti in intestinum superum dolores, & torsiones, & inflationes incidunt: ingens afficit bibendi cupiditas: pulsus celer, frequens, parvus atque concisus est: sæpè sudores toto corpore moventur: ubi gravius malum est, pulsus propè totus concidit, crura manusque contrahuntur, frigida sudationes fiunt, anima deficit, & quum ad extrema ventum est, syncope accedit: quibus concurrentibus omnibus, mirum non est subitò aliquem extinguere. Is morbus frequentior æstate, atque autumno, est pueris familiaris. Senioribus rarior, & formidabilior est. Vehe-

mens

mens in eodem morbo fitis inutilis est, optimus accedens somnus. Pars sanitatis est, suppressum vomitum esse. Sæpè etiam versâ in vesicam materiâ, ardor inde factus urinæ fuit. Summum in periculum res vertitur, si syncope comitatur, aut si quod evomitur, malè olet, aut stercoraceum est. Quod autem non olet, id tutum est.

Quum profluere alvus cœpit, fusis scilicet sincerioribus humoribus sine inflammatione sive exulceratione, vel sensu doloris vehementi, id vitium Græci *διὰ πόσιν* nominaverunt; sub quo aliud atque aliud vacuatur humor, modò pituita, modò bilis, vel flava, vel atra. Hujus origo fluxionis variis è sedibus manat. Si è cerebro pituita fertur in ventrem: ea per noctem magis & post somnum fluit, tenuis, authore Hippocrate, atque spumans. Intervalla etiam fluxionis quædam fiunt, itemque destillatio, & capitis dolores antecesserunt: maximè si subitus calor atque frigus fuêre. Idem humor, si vitio funditur intestinorum, mesenterii, aut ventriculi, crassus est, atque mucosus, isque magis de die sine certis intervallis prodit. Ubi flava bilis, aut citrina, ardens, nec rarò etiam

Alvi profluvium.

spumans è jecinore, aut etiam (quod sæpè fit) è mesenterio in ventrem delabitur, id sine magno ventris dolore, sive torminum opinione certis quibusdam intervallis, & per noctem incidit : sed brevior hic fluxus eo esse consuevit, quem affectus ventriculus movit. Idemque ferè sequitur, si è liene, vel ab ipso fluere mesenterio atra bilis in alvum cœpit. Verùm hic casus, quoniam pejorem humorem sequitur, longè difficilior priore est. Sed discernere inter hunc convenit humorem, & inter sanguinem concretum longa immoratione, longoque ductu præassatum, nigricantem, ac liquidæ pici simillimum. Itaque si hic ipse, non autem melancholicus humor est, cruentus vel adest, vel præcessit vomitus, quo tincta linthea rubescunt. Nihil verò horum in dejectione bilis atræ subest. Uno die fluere alvum, sæpè pro valetudine est, atque etiam pluribus diebus, modò intra septimum conquiescat, neque de novo turbetur, ac neque febri hominem, neque vehemente siti afflictet. Verùm in spatio periculum vertitur. Interdum enim tormina ac febris concitat, viresque consumit. Febrem autem accessisse, aut semel quiescentem dejectionem

revertisse, eandemque diutius trahere
coepisse, periculosum est: sive biliosa ea
fuerit dejectio, sive cruda, ac pituitosa.
Æquè verò noxium est, inflammatio-
nem ortam esse jecinoris, aut præcordio-
rum, aut ventris, itemque alvum va-
riam, cum dolore diu profluxisse. Cæ-
terùm ante tempus compressam dejectio-
nem esse, tutum non est. Incipit enim
affici stomachus, febresque oriuntur &
viscerum inflammationes. Quinetiam
correptâ sursum materiâ, dolores in ca-
put incidunt, aut insania fit, aut lethar-
gus: prout humor est, qui huc fertur.
Quum liquida dejectio hominem exer-
cet, utilis est neque stridere eam, neque
nimis frequentem esse, sed paulatim fer-
ri. Crebro enim desessu homo delassa-
tur, & vigil manet. Jam si copiosa si-
mul frequensque dejectio est, periculum
ab animi defectione est. Cùm alvi pro-
fluvium in vetustatem incidit, tum, si
ultrò vomitus accedit, id ipsum con-
quiescit. Alvi fluxio sine ulla noxa est,
si maturè desinit: quod quidem fit, ubi
contracto jam ventre nullus amplius à su-
perinjecta manu motus ejus percipitur,
simulque novissimam alvum flatus secu-
tus est. Profluente alvo mutari excre-
menta,

menta, sed non in deterius, prodest. Biliosæ dejectiones accedente surditate cessant: & contrà surditas iisdem dejectionibus finitur. Longum alvi profluvium balbis frequentius est, & vomitionis interventu conquiescit. Ructus quovis in fluxu ventris acidus, qui quidem ab initio non fuit, sed post accessit, prodest. Ubi pluribus diebus non descendit alvus, docet aut subitam dejectionem, aut febriculam instare. Malum est fusa alvo cibi cupiditatem amitti, aut singultum fieri. Quibus propter morbum vel acutum, vel longum, aut propter vulnera, aliave occasione extenuatis, atra bilis ceu niger quidam sanguis alvo profluit, hi postero die tolluntur. Excrementa siquidem ventris more atrii sanguinis nigra, quæ & cum febre, & sine hac ultrò dejiciuntur pessima sunt: eoque semper pejora, quo eorum colores plures repræsentantur non boni. Eadem ut medicamentum eduxerit præstat, idque quando plures fuerint horum colores. Alvus ustam bilem fundens per morborum principia, mortifera est. Parque periculum ostenditur, si profluente ventre, nausea, vomitus, & delirium occupant: itemque si sic infirmus homo est,

est, ut pulsus ipsi assidue vermicularis & formicans, qui ne sumtis quidem epulis invalescat. Quum subito fluere alvus incipit, post longum morbum, aut si is etiamnum manens nihil inde mitescit, ægerquè hunc malè sustinet, in certo periculo esse sciendum est. Æquè horrendum censetur, citam alvum hydropi initia præbuisse, aut post ulcus accessisse melancholicum: itemque propter superiorum exulcerationem intestinorum ac præcipuè jejuni incidisse: aut perseverante profluvio pustulas, quæ antè fuerunt, subito delituisse: aut denique in sene fluorem inveterasse, aut hominem primò veluti aquam alvo excrevisse, deinde humorem more unguenti pinguem. Hoc ipsum excrementum, quod quasi adipe ut oleo perfusum videtur, pestilentibus febribus, atque ardentibus, corpus colliquantibus, & hæcticis, & tabi, & atrophix, & interdum viscerum inflammationibus familiare est. Persæpè tum à sincero alvi profluvio, tum à longo, nata fuisse tormina observatum est. Qui casus prægnanti foeminx exitiosus esse solet, & ut ipsa quam maximè convaluerit, partum tamen corrumpit, ac perdit. Ferè autem fit, ut quem longa

ga

ga exercent alvi profluvia, his pedes intumescant.

Non leviter ea quoque terrere alvi fluxio debet, quâ non sinceriores humores, ut in diarrhoea, sed epulæ, potionesque sine dolore crudæ, inæquales, aquosissimæ sic citò dejiciuntur, ut nihil ferè de forma amiserint sua, citra sanguinis aliquem aut bilis complexum.

*Liente-
ria.*

Græci *λεντερίαν*, nos lævitatem intestinorum appellamus. In hac ægri fructum alimenti non sentiunt, & in malum incidunt corporis habitum: ardor totis hypochondriis inest, & ingens urget cibi fastidium. Hic morbus ægros interdum trahit, interdum præcipitat. Facilius à teneris depellitur ætatibus, utique si moveri abundantius urina, & ali cibo corpus incipit. Difficillimus provectoribus hominibus est, maximè si longis torminibus intestinorum successit. Sub eodem vitio periculum majus fit, si ita frequens dejectio est, ut venter omnibus horis noctu & interdiu fluens, somni tempora corrumpat. Adhæc si cruda prorsus ea est, aut nigra, vel more bubuli stercoreis levis & foetida: si cibi admittitur cupiditas, crescit bibendi desiderium: si pro modo sumtæ potionis æger

æger non mejit : si os ipsi exulceratur, rubetque facies , & quasi maculis quibusdam colorum omnium distinguitur: si venter emollitus , sordidus , & rugosus redditur. Sub his signis certa mortis adventatio est , si id vitium jam diu corpus senile traxit. Per longam intestinorum lævitatem acidum fieri ructum, qui antè non fuit, pro valetudine habetur. Pars speratæ sanitatis est urinæ modum poculis respondere cœpisse, corpusque nutriri, ac sine febre, sine pravis coloribus esse. Ut in omni penè ventris fluxione, ita in hac quoque tumali esse finis creditur, cum nullum amplius intus fit murmur, & extremam dejectionem aliquis secutus flatus est. Quicumque autem diu hoc vitio exercitus, animalcula quædam alvo reddit, multis torsionibus atque doloribus; is, finitis his intumescit. Ex eodem morbo si lateris oritur dolor, & spirandi difficultas, metus est secuturam tabem esse. Sæpè etiam hic morbus corrupto cœlo in populum grassatur, nec rarò longa invaletudine confectos tollit. Interdum etiam pulmonis vomicam, vel abdominis abscessum, vel pectoris aut renum suppurationem certo ægrotantis

tis periculo secutus est.

Quæ cruenta alvi dejectio, cum ulcere intestinorum, cum dolore & torsione est: hanc Græci *δυσεντερίας*, nos *Tormina* appellatione comprehendimus. Incipiente morbo primum biliosa est alvus, aut certè mucosam fundit intestinorum pituitam: inde subpinguis fit, modico cruore perfusa: post hæc strigmenta interioresve tunicæ intestinorum prodeunt excrementis cruentis ac purulentis mixtæ: novissimè, ipsa deteritur, proditque cum purulenta intestinorum proluvie caro, quæ veram eorum complet substantiam. Inter hæc autem omnia, cruor paulatim, & brevibus intervallis per alvum manat, isque modò cum stercore aliquo semper (nisi inferius vitium est) liquido, modò cum quibusdam, quæ proximè dixi, mucosis & purulentis, & carnosis corpusculis excernitur: multus in ano dolor, multaque ac frequens desidendi cupiditas est: cum utroque hoc exiguum quid exit, protinusque tormentum intenditur, ac rursus post paulum levatur: ipse æger quiete caret, & à somno interpellatur, dejectionibus & interdum febriculâ impeditus. Si tenuibus intestinis vera de-

teritur

teritur tunica, desperata utique ægri valetudo est : verum si crassa tantum sic afficiuntur intestina, superesse spes vitæ potest. Sed certis quoque uti notis licet, ad loca, quibus morbus inhærescit, cognoscenda. Etiam si tenuia intestina afficiuntur, dolor altius circum umbilicum versatur : inter hunc plus intervalli & inter dejectionem ponitur : sanguis & quicquid intestini detruditur, exactius alvi excrementis miscetur : vehementius & crebrius delirium incidit : sitis urget, & febris : ipsum autem sterqus crudum profluit, malè olens, loturæ carniū simile, biliosum, porraceum, varium, non sine multa ventris torsione, & multa virium infirmitate, quæ animi quoque defectionem minetur. Atque cum quidem in jejuno intestino vitium est, cruda magis apparet dejectio, cum sanguine nigriore excrementis undique misto, & cum bile abundè flava. Plus etiam hic sititur, & nauseatur : sed & cibi magis afficit fastidium, & interdum vomitus oritur : dolor autem superior umbilico est, isque malignam febrem movet : ipse æger vivido colore caret, & ad animi usque defectionem exsudat : quibus concurrentibus facilè is
ipse

ipse robore destituitur virium, ac perit. Cæterùm ubi crassa intestina morbum sustinent, (qui casus tutior faciliorque superiore est), stercus sincerum, multum, densum, cruentis respersum guttis, & cum flatu prodit, nonnunquam etiam spumofum: semper autem quædam hic pingua miscentur, ipseque sic jungitur cruor, ut his particulatim supernatet, non autem totus totis veluti immersus temperetur, idemque ut primùm quis doluit, protinus sequitur, prima propè alvo redditur. Quævis autem tormina longa & difficilia esse consueverunt: sub quibus, si firmus etiamnum homo est, rectèque curatur, reddi pristinæ valetudini potest: si verò invalidus aliquis est, ac vehementer morbo extenuatur, ipsumque intestinum profundo vetereque ulcere labefactatur, scire licet medicinam omnem inanem esse. Ubi hæc res incidit, dejectio gravissimè olet, eaque cruda, levisque est, & subnigri coloris: sæpè etiam inter hæc plurimus sanguis effunditur. Tormina, si ab atra bile esse cœperunt, mortifera sunt, itemque si sub his quædam quasi carunculæ dejiciuntur: aut si post longum morbum, homine jam infirmo, subitò orta sunt. Æquè

malum est, molestam ægro suppressionem dejectionis esse, à solutione non nisi paucissimo tempore malum levare, idque ipsum diutius incipere trahere. Non tuta quoque tormina sunt, quæ cum febre adoriuntur, & cum vehementi dolore, variaque vel etiam crebra alvi dejectione, tum etiam cum jecinoris, præcordiorum, aut ventris ardore, quæque cibos intercipiunt, & multam sitim, & cibi fastidium inferunt. Par periculum est, si venter assiduè, & quiescentibus, & vigilibus profluit, similiterque noctu, & interdium: si cibi amittitur cupiditas, crescit bibendi desiderium: si pro modò sumtæ potionis æger non mejit: si extenuato jam corpore repente nigra alvus fluxit: aut si morbum hunc jam veterem lævitas intestinorum, aut hydrops exceperit. Ferè ubi dejectiones alienis temporibus supprimuntur, abscessus juxta costas, aut in visceribus, aut in articulis fit. Tormina, modò non nimis diu trahant, utilia lienosis sunt: ubi inveterascunt, nocent. Quum sanguis per tormina intus retentus concrevit, venter flatibus impletur, extremaque corporis repente inalgescunt, vis ægri, simulque pulsus collabuntur.

L**Proxi-**

*Tenē-
sinus.*

Proximus torminibus tenesmus est ; Græci *τενερσμον* appellant , qui illa sæpissimè & antecedere & sequi solet. Frequens æquè atque in torminibus desidendi cupiditas , dolorque in ano est , inter quæ mucosum quid pituitâque plenum , & modicè cruentum exit : hinc , ubi ulcus directi intestini increvit , purulentum quoque editur. Hujusmodi dejectioni nonnunquam id interponitur excrementum , quod ex cibo probè coactum figuratumque est. Hic morbus , ubi prægnantibus accidit , elidere etiam partum potest. Idem tamen non difficillimè tollitur , neque unquam per se occidit , præcipuè si sine febre homo cibum non fastidit : verùm in autumnum ubi incidit , contagiosus esse magna ex parte solet , utique si tum quoque in tormina vertitur : qui casus , ut cæteris hominibus non tutus , sic pueris maximè lethalis est. Tenesmus interdum ubi vetus fit , in volvulum , aut in coli dolorem (siquidem pituita subest) transit. Si bilis in causa est , potius torminibus excipitur. Sæpè ex neglecto tenesmo ulcus relinqui solet sordidum ac purulentum , idque in fistulam verti , quæ ægerrimè remediis tollatur.

Mor-

Morbus intestini tenuioris , quem Græci *ελεόν* , nos volvulum dicimus , sic noscitur. Dolor acutissimus , modò *Volvulus.* suprâ umbilici regionem , modò infrâ versatur. Fitque ex alterutro loco inflammatio. Tumor autem quidam sic prominet , ut ægrotans intestinum convolutum ad chordæ similitudinem videatur : ventris itinera , quibus excrementa feruntur , sic impedita præclusaque sunt , ut neque injectus clyster ascendat , neque cibus ore sumtus descendat , ipsaque alvus ne flatum quidem emittere ullum possit. Itaque sursum protrusis omnibus creber vomitus cietur tum bilis , tum pituitæ : hunc multa antecedit nausea , & ructus inanis , & ventriculi humiditas. Spiritus etiam fit difficilis , & , quicquid cibi , vel potionis assumitur , tametsi id intrò descendit , paulò tamen post , quia transire inferius non potest , iterum vomitu redditur impurum , ac malè olens. Id ferè tum solum sine saburra per os fertur , cum superior gracilis intestini pars laborat. Ipsum autem quoque sequitur stercus , si paulo inferior morbus est. Idem incommodum sub utroque casu tum etiam accedit , cùm ad extrema ventum est , subindeque lumbrici e-

L 2

vomun-

vomuntur, urina difficulter redditur; maximè assiduus vomitus est, ipsa alvus ita clauditur, ut ne acus quidem admittat acumen. Novissimè os, quique ructu effertur vapor, sed & totum corpus mali odoris est, acceditque singultus, & delirium, itemque nervorum distentio, & gelidus sudor, & extremorum frigus, & tremor cordis, & syncope, omnia certissimæ mortis nuntia. Hoc genus vitii omnium quæ intestinis insidiantur acutissimum est, &, nisi resolvitur intra septimum diem, occidit. Idem pueris familiaris, senibus rarius ac penitus exitiale est. Frequens sub eo vomitus, & surditas mala sunt. Sperare salutem licet, si purgans medicamentum ore sumtum, alvum perumpens dejectionis initium præbet: utique si reliqua quoque salutis concurrunt signa verisimilia. Minus etiam periculi esse solet, ubi dolor locum mutat, quàm ubi fixus is unà in fede inhærescit.

Coli dolor. Non admodum huic dissimile dolori tormentum in laxiore eo intestino est, quod Græci κῶλον appellant. Gravissimus cruciatus multaque inflatio incidit per totum abdomen in profundo, idque dextra magis parte, ubi affectum intesti-

num

num est : ipsum enim hinc incipit , & ad sinisteriorem partem illorum in modum zonæ procurrit. Itaque juxta renes etiam hic colici dolor , & circa dorsum versatur , itemque supra infraque umbilicum , magnam occupans ventris partem , modò dextram , modò sinistram , vagus omnino , & instabilis : utique si à flatibus esse morbus cœpit , qui flatibus sæpè intus quodam veluti rugitu obmurmurant , arctèque conclusi , neque ore , neque alvo erumpunt. Non rarò colici dolor uno in loco stabilis altè excruciat , eumque neque flatibus , neque ructus lenit. Ipsum intestinum immanissime doloris tormento affligitur , ut terebello etiam pertundi videatur , ac penè spiritum elidere. Inter hæc autem vomitus crebrò movetur , quo pituitosa , varia , porracea , & æruginosa vacuantur. Verùm hoc doloris genus tum potius incidere consuevit , cùm pituita subest crassa , ac maximè vitrea : utrisque generibus commune est , cibi cupiditatem , magisque dulcioris ac pinguis amitti : ventriculum assiduè , ac si pungeretur , dolere : multam sitim , multumque aquæ bibendæ desiderium esse , quod ipsum tamen potationibus non

quiescit: ructum item fieri, & interdum hunc jamjam eructaturum protinus cohibere: alvum etiam adeo impeditam esse, ut nihil intra, ac ne flatum quidem emittere aliquem possit: tum si quid vel sponte, vel arte redditur, id siccum esse, aliàs more ovilli stercoreis in globulos intortum, aliàs, ut bubulum, leve, flatibus plenum, atque aquæ supernatans: urinam denique nimii doloris occasione bilescere, & interdum consentientibus huic malo renibus retineri: ubi ad extrema ventum est, frigidus sudores fieri, crebrumque singultum, & delirium, & nervorum distensionem, & extremorum refrigerationem, & syncopen incidere. Ubi salus futura est, excrementa non nimium retineri, dolorem mutari, atque etiam intermittere, ipsum ægrum post redditum stercus, aut post emissos flatus, levare, & in quiete esse, semperque facile durante morbo spirare, bonum est. Sæpè coli dolor in resolutionem nervorum, vel in morbum tum articulare, tum comitalem, vel in hydropem transit: interdum etiam in volvulum abit, idque intra septimum diem. Sed operæ pretium videatur inter hunc ipsum morbum,

bum, & coli dolorem, notis quibusdam discernere. Omnia intestini gracilioris morbus atrociora, quàm coli habet. Utrinque alvus comprimitur, acutissimi dolores, & frequentes vomitiones fiunt. At ubi tenue intestinum morbum sustinet, quoniam id magis sentit, sæviorem quoque doloris sensum exhibet, & celerius occidit, ejusque rei causâ hic ipse morbus acutus est, prior esse longus potest. Adhæc sub volvulo dolor magis tum dextrâ, aut sinistrâ parte vagatur, magis ab umbilico superius tendit, magisque curatur per os sumtis medicamentis, quàm alvo injectis. Magis etiam subvertitur stomachus, & crebriores vomitiones fiunt, promptiusque delirium est, & frigidi sudores, & syncope, quàm ubi in colo vitium est. Jam verò multis etiam signis, & coli & renum inter sese consentiunt, dissentiuntque dolores: adeò ut, nisi arenula vel calculus exturbatur, sæpè renum cruciatus, specie colicorum, medicos etiam gnaros artis fallant. Ergo his differentiis uti licet. Nausea, & vomitus, & cibi fastidium magis urgent laborante colo, dolorque ferè ab dextra parte inferne incipit, & sursum ad sinistram ascendit. I-

dem sæpè veluti circumire in omnem ventrem videtur, & plurima loca occupare, modò hîc, modò alibi violentior. Dolor autem renum eodem stabilis loco est, nisi quod interdum ad coxendicem, vel ad testiculum, qui è directo est, pervenit, ferèque alterutrum latus juxta renem occupat.

Idem, etsi perinde ut coli dolor, non æquè tam efficaciter ducta clysteribus alvo, & emissis flatibus, remittitur: urina denique primum tenuis, pauca, & aquosa est, & interdum hæc tota supprimitur: interposito tempore uberior fertur, & crassa, & arenosa, & bullans, Itaque hæc etiam urina significare genus morbi potest quale sit, quoniam dolor interdum etiam colicus, ex vitrea potissimum natus pituita, uno esse stabilis loco possit: ut autem emictis arenulis renum dolor conquiescit, ita coli quoque cessat tormentum, frigido humore per alvum excluso. Illud etiam addendum videatur: multis frequentem renum dolorem esse, coli non item. Præter hoc ipsum, quod proposuimus, colici doloris genus, quod verè proprium est, & crudæ causas pituitæ, aut flatum sequitur, aliud nonnunquam posse re-

reperiri fatemur, cujus acris materia, ipsaque effectrix fit bilis. Tum febricula oritur, & vehementior fitis, & æstus, & vigilia. Ipse dolor non in variam regionem ventris divagatur, sed unicam ferè occupat duntaxat, idemque semper dejectione intenditur: urina admodum biliosa, atque acris est: noxius etiam est calidarum tum epularum, tum potionum usus. Magis stabilis uno in loco dolor esse coli solet, ubi id intestinum inflammatione cingitur, estque hoc genus morbi atrocissimum, soletque non raro *Coli inflammatione.* in volvulum transire. Valida febris multo æstu, ardoreque afficit, intus juxta morbum pulsatio est, oriturque fitis, nausea, ac vomitus, præcipuè biliosus, ex quo tamen nihil dolores levantur. Alvus nihil reddit, & ipsa interdum retinetur urina.

Observatum à doctis hominibus vi-
deo, gravissimis etiam doloribus urgeri *Peritonæi dolores.*
peritonæum consuesse, vel certè has
membranas, quæ abdomini ventrisque
partibus obtenduntur. Hi dolores, etsi
nullo jure ad coli tormentum pertinent,
quoniam tamen æquè graves sunt, ac
penè similes, neque etiam spatiis loco-
rum multum dissident, eos hîc quoque

ponere rectè posse videor.

Sunt autem hi, ut gravissimi, sic admodum diuturni, neque ullis remediis, quæ coli debentur doloribus, mitescunt; siue datum medicamentum fuit, siue adhibitum fomentum, siue subtrus injectus clyster. Ferè autem longas febres, & ea genera excipiunt morborum biliosorum, qui non facilè solvuntur. Sæpèque veluti quadam judicatione visi sunt continuas febres, & tertianas, & quartanas hi dolores finivisse: idque ita tamen, ut longo post tempore, qua die febris esse accessio solet, eadem hi dolores quoque increverent.

Lumbrici.

Lumbricorum, quos Græci communiter *ελμιντες* appellant, non una omnium forma est. Alii longi & teretes sunt. Alii breviores & ad speciem seminis concurbitæ lati. Alii exigui sunt, tenues simulque teretes, *αισκάριδας* Græcè dicunt. Communes hæc notæ sunt duorum priorum. Per somnum dentes strident, multaque saliva ex ore defluit, quam homo sæpius tum quoque devorare, quasi mandens aliquid, videtur: vigilianti sæpè pruriunt nares: & multa infesta fitis est, quæ poculis non sedatur: interdum venter distenditur cum murmu-

mure, atque multa torsione, idemque non raro, ac si hydrope affectus homo esset, inflatur: acceditque subinde lævitas intestinorum, oculorum suffusio, pallor faciei, sudorque frigidus ac malè olens. Nonnunquam ipsa etiam incipit affici mens: verum æger tum festucas non legit, ut in acutis accidit febribus, neque gravem dolorem capitis sentit. Ipsi subinde lumbrici modò per os, modò per alvum, & interdum naribus etiam redduntur, iidemque noctu esse molestiores, quàm de die solent. Per inediam autem maximè sursum repunt, tumque intestina, & præcordia, & stomachum morisionibus sollicitant, simulque animi subinde inferunt defectionem, vel præfocationem, vel tremorem, vel morbum comitalem, vel ipsam denique syncope: quibus malis sæpè pueri oppressi, extinctique fuerunt. Præter hæc quæ proximè dixi vitia, etiam & coli dolorem, & caninam appetentiam, & boulimon, & cordis palpitationem à lumbricis fieri animadversum est. Ferè autem longis proprium est, ut in gracilibus intestinis gignantur, utque hæc moribus per inediam impetant, & interdum in ipsum procurrant ventriculum, tumque

que dolorem moveant, & nauseam, & vomitum, & singultum, siccamque tussim, & tenuem brevibusque molestam intervallis. Idem, cum fortè ad stomachum perveniunt, difficilem deglutitionem reddunt. Inter hæc autem alii per somnum edito clamore expergiscuntur, & exiliunt è cubili, iterumque protinus sopiuntur. Alii inter dormiendum linguam exerunt, aut dentibus strident, aut aliena loquuntur, simulque vario decubitu corpus jactant. Pueri etiam sic formant os, ut quasi eo tenere mammæ papillam, ac devorare aliquid videantur. Multis oculi sanguineo rubore imbuuntur, itemque malæ: verùm is rubor post paulò perit livore è novo victus.

Pulsus inæqualis est, obscurus, deficiens, & recurrens. Nonnullis venter corruptum cibum dejicit, & flatibus intumescit, reliquum corpus sine probabili causa extenuatur. Si febris incidit, ea sine ordine, ac certe lege increscit, ac ter quaterque die vel nocte temerè recurrit, non sine ingenti extremorum frigore. Minus in longis lumbricis periculi, quàm in latis est, solentque his etiam illi esse frequentiores: præcipuè verò pueros ab ipsa exercent infantia ad puberem usque æta-

etatem. Lati autem lumbrici, qui vel in coeco intestino, vel in coli cellulis nascuntur, ut multa quoque habent, quæ esse familiaria longis dixi; sic soli assiduis morfibz hominem fatigant, & ingentem, insatiabilemque cibi cupiditatem inferunt: ut primum enim assumptum alimentum est, id ipsi continenter depascunt, quo jam consumto, mordere intestina protinus incipiunt. Sæpè hi intus magna mirabilique inter se serie coherant. Corpus autem quod occupant, macrum, imbecillum, atque inæquale reddunt. Porro ubi tenues lumbrici, quos *Ascarides* nominari dixi, intus versantur in ano scilicet, ac recto intestino, multus in his locis pruritus est, ex quibus interdum emergunt, & in femora, natesque quoquo versus prorepunt: sæpius in dejecto stercore cernuntur, id quod adultis etiam hominibus non infrequens est. Inter hæc assidua oritur desidendi cupiditas: homoque post redditam alvum rectius habet. Communiter autem omnis generis lumbrici pueros sæpius exercent, utique si multa cruditate onerantur, vitiosisque cibis longo ante tempore, ut caseo, fructibusque fugacibus usi fuere.

Nunc de eo ani vitio loquar, quo venæ,

Hæ-
mor-
rhoides.

næ , quæ in eum explicantur, sanguinem sine modo fundunt, Græci αἱμορροΐδας nominaverunt. Tametsi æquè etiam præter naturam sit, sanguinem in hæc loca delatum , pro consuetudine inde vacuari non posse. Itaque cæcam hanc esse hæmorrhoidem dixerunt, quæ intuentibus non patet , ac vehementem in ano dolorem , maximè ubi durum alvi excrementum exprimitur , movet. Is dolor interdum adeò gravis est , ut ani inde sequatur inflammatio : ubi verò aperta hæmorrhoids est, sanguinem semper in conatu , maximèque post extremam alvum, interdum etiam ultrò fundit. Is sanguis seorsim primùm melancholicus , dein purus ac rutilus exit, interdum, quia in vacuo recti intestini concrevit , formam grumi rubentis habet. Itaque ab eo quoque differt , quem vel mesenterium , vel jecur, vel loci superiores fudère. A mesenterio enim non multus fertur , ab jecinore infirmo verus sanguis non defluit, sed dilutus atque aquæ , qua carnem quis laverit animantis nuperrimè mactatæ , similis. A ruptis aut patefactis superiorum locorum venis sanguis manat picis specie retorridus , ac niger. Externa hæmorrhoids ex ano conspicua utcunque prominet : quæ
verò

verò intus occulitur, ea sine omni ferè dolore, sine tumore cruorem exprimit,isque cruor simul cum ejectione exit, excremento alvi nequaquam mistus. Hic fluor si nimius est, ingens periculum habet: tum vires hominis consumuntur: vividus faciei color perit, gravitas in coxis, & multa in cruribus imbecillitas est: ipse qui profunditur cruor, non jam amplius ater, atque crassus, sed purus ac rutilus est, necessarius naturæ thesaurus. Itaque si hoc vitium vetus esse cœpit, principium hydropis præbet. Nihilo leviora pericula fiunt, ubi in iis hæmorrhoides supprimuntur, qui sanguinis profluvio imbecilliores non fiunt, quique purgationis vice id, non morbi habent: scilicet inclinatâ in præcordia aut in viscera materiâ, subiti gravissimique casus incidunt, maximèque aut aqua inter cutem, aut tabes. Quare rectè etiam præcepisse Hippocratem video, sic curandas hæmorrhoides esse, ut ex multis una maneat aperta. Cui maturè fluunt hæmorrhoides, hunc neque lateris aut pulmonis tentare inflammatio, neque ulcera exedentia, neque lepra, vel elephantia, neque vitiligo, ac neque melancholia, aut quartana febris solet. His autem ferè morbis

rapi-

rapitur quisquis fluentes hæmorrhoides intempestivè curatas habuit. Melancholicis, vel renum morbo fluctuantibus, vel insanientibus hæmorrhoides fluere cœpisse, bonum est. Tum his etiam nimium suppressis, commodum est, aut menstruum erumpere, aut sanguinem è naribus ferri.

Ani inflammationio.

Anus etiam inflammatione cingitur, maximè si vel dura equitatio antecessit, vel cœcæ hæmorrhoides dolorem in eo nimium moverunt. Sub quo casu alvus propter ani tumorem difficillimè redditur, & interdum multis diebus retinetur: maximus dolor ineft, qui & compresso ano, & dejectionis nixu summè exasperatur. Ex eo malo febricula interdum oritur, utique si longo jam tempore nihil alvo redditur. Qui abscessus ab inflammatione gignitur, his sæpius in recti intestini cavum erumpit, tum ulcus fit, ex quo jam tum sordido pus fertur.

Fistula ani.

Id ulcus propter loci naturam facile ac brevi in fistulam vertitur, quæ post difficillimè remediis cedit: verùm diutissimè dolore etiam sedato, manat, pusque fundit ante primam alvum, aut certè, si media id dejectione fertur, excrementis non mistum.

Novissimum id modò superesse videtur, ut notas proponam, quibus vulnera totius ejus itineris, quo cibus ab ore per anum fertur, observari possint. Ergo ictâ gulâ, neque epulæ, neque pocula transeunt, sed ut primùm sumi cœperunt, vomitione redduntur: accedit singultus, animi defectio, & interdum nervorum distentio. A percussio ventriculo, frequens bilis vomitus, atque singultus incidunt, quicquid cibi vel potionis sumitur, id protinus vomitur, pulsus elanguescit, tenues sudores extremis frigidis oriuntur, quos ipsa demum excipit mors. Communia vulnerati tum ventriculi, tum tenuis intestini indicia sunt, cibum, potionemque per vulnus ferri, & in vacuum labi abdominis spatium, inde ventrem, præcordiaque intumescere, & subinde bilem vomî. Cætera icta intestina, vel stercus, vel ejus exhibent odorem.

*Vulne-
ratio
gulæ,
ven-
triculi
& in-
testino-
rum.*

*Observationes in vitiis mesenterii, jecino-
ris, & lienis utiles.*

NON levis mesenterii vitiis debetur observatio. In hanc enim sedem facile defluunt venarum superflua, indeque gravissimorum fiunt principia morborum,

M

cho;

Tumor mesenterii sine inflammatione. cholerae, melancholiae, fluxionis alvi, torminum, mali habitus, atrophiae, languoris, lentarum & errantium febrium, aliorumque difficilis notae ægritudinum. Ubi hæc pars tumore citra inflammationem obsidetur, is ferè primum laxus est, ac mollis, inde prorsus spatio siccatus, indurefcit. Idem quoniam (ut etiam ipsa pars) sine dolore est, tactu maximè pressoque exploratur: altè enim intus esse sepultus animadvertitur.

Itaque ipsa quoque urget, arctaque intestina, & causam tardioris alvi præbet. Non ita tumor musculorum abdominis, non venter adipis mole prominens se habet. Neutrum enim intestina, vel alvum sollicitat: adeps etiam manu apprehendi, & distingui ab abdominis musculis potest: hi ubi tumorem sustinent, primo contactu occurrunt, tumque semper, ubi premuntur & interdum non pressi dolent. Foras item horum prominet tumor non pressu, sed blando tractu perceptibilis, & figuram, qualis est recti in abdomine muscoli, oblongam habet.

Inflammatio mesenterii. Inflammatione etiam rapi mesenterium solet. Tum gravitas quidem intus, & nullus manifestus dolor inest: febris oritur levis, nullis molesta casibus gravioribus.

bus , ita ut sub ea vitæ etiam obire munia homini liceat : incipiente morbo , sanies parvum rubra quædam fertur : orto abscessu , pus album defluit , sæpissimè alvi permixtum excrementis , interdum etiam sine mixtione sincerum magnâ copiâ dejicitur , utique si morbus versùs novissima vergit intestina. Certissimum est , id genus puris à solo ferri oportere mesenterio , quoniam ab aliis locis descendere sine dolore , vel sine mixtione , vel sine febre vehementiori non potest.

Nunc jecinoris proponam vitia , quæ *Jecinoris in-* generis varii , & multæ esse observatio- *tempe-* nis solent. Si id viscus impensius calet , *ries.* ut inedia inimicissima est , ita tamen cibi amittitur cupiditas , maximèque carnis : frequens etiam ac multa sitis est : ipse homo toto corpore calet , præcipuè palmis , & plantis pedum : quæ partes etiam , si ad calorem siccitas accessit , inarescunt : si humor , madent. Ferè autem contraria his contingunt , si jecur frigidior , quod rarò fit , intemperie labefactatur. Et quidem si materia etiam qualitatum intemperantiis (quod fit ubi hæ diutius immorantur) accessit , si jecur calore urgetur , bilis est , quæ subinde vomitu vel alvo extunditur , primùm tenuis ac pal-

lida, dein crassa, flava, ac foetida. Inter hæc autem os amarescit, vehementior, & inappetentia, & fitis oritur.

Interdum & febris movetur, quæ ferè intermittens est tertiana, vel incerta, vel, si jecinoris quoque radicitus vitiata substantia est, lenta, per quam corpus interposito spatio sensim contabescit. Frigidi humoris notæ sunt, alvus nec frequens, nec multa, sine foetore, sine multa coloratione: rara febris tertiana: corpus quidvis potius, quàm macrum, cæteraque alia contraria superioribus signis hic signa esse possunt.

Imbecillo jecinore multa observari possunt, in quibus color corporis maximèque faciei, & alvi dejectio facilè principem locum tenent.

*Jecino-
ris im-
becilli-
tas.*

Facies tristis quodam pallore, aut virore foedatur: dejectio, si quidem parum jecur trahendo valet, liquida ut cremor est, tametsi eo tempore nullum vitium ventriculus, vel mesenterium sustinent. Id enim si hic esset, vix ullum concoctionis rudimentum, quod dejicitur, haberet. Quod si jecur non retinet, jam tum varii, difficilesque incidere casus à profusione alvi possunt. Eoque vitio raptos, fluxusque factos, Græci

ci propriè *ἰσχυρὸς*, nos jecinorosos appellamus. Dejectio primum similis est aquæ, qua nuper mactatæ animantis carnis ablutæ sunt, saniosa scilicet atque subcruenta. Interposito spatio, eadem variè mutatur, prout jecur variè intemperatum est. Quum enim id caloribus urgetur, sæculentus atque ex assatione crassus, ac melancholicus sanguis dejicitur, novissimèque ipsa etiam atra profluit bilis. Inter hæc totum corpus liquescit, febris oritur, & cibi fastidium, & sitis, estque pulsus celer, & urina biliosa. Cæ- *Deje-*
 terum si sine calore infirmum jecur est, *ctio cr-*
 parumque ea occasione retinet, dejectio *uenta*
 sequitur sanguinis limosi, ac veluti in *quæ je-*
 grumos coacti, eademque neque assidua, *cinoris*
 neque multa est, diversis excrementorum *vitio fit*
 ferè coloribus imbutis, certis tamen temporibus cumulatior est, ac semper haud multum foetens: ipsum diutius trahitur malum, ac sine febre incipit: quanquam interdum languida ea oritur, putrefacto in viscere sanguine. Porro siccitas crassio-
 rem & magis aridum humorem qui effunditur, facit: humiditas magis tenuem, & dilutum. Facile jecinorosa dejectio hæc, qua cruenta redduntur, à torminibus distingui posse videtur: in his

enim sanguis cum dolore, rosione, & strigmentis sensim, brevibusque interval-
lis paucus exprimitur. Contra autem
jecinore malè retinente, cruenta ferun-
tur sine dolore, sine ramentis, idque cu-
mulatim, & majoribus intervallis, duo-
rum scilicet & interdum trium etiam die-
rum. Si ruptâ intus venâ, aut adaper-
tâ sanguis dejicitur, is ab inferioribus locis
ferè purus fertur, parum nigrescens: à
superioribus autem protinus ater, ac li-
quidæ pici simillimus, quo tamen tin-
cta lintea rubent: ut hac nota is quoque fa-
cilè diffidere ab atra bile possit. Si mu-
tilato membro grandiori, aut propter ne-
cessaria solitæque vacationis compres-
sionem ex alvo sanguis diffluit, is multâ
copiâ purus subito prorumpit, subitoque
desinit, longissimis spatiis temporum re-
current. Qui autem ab ulcere jecinoris
cruor manat, is perexiguus admodum
est: sensimque descendit multo virulen-
to, turbidoque pure imbutus. Levicu-
lus etiam doloris tractus juxta jecinoris
sentitur regionem, atque ejus ulceris quod
illic inhærescit, aliquæ ante notæ fue-
runt. Eodemque modo propriis nosci
signis inflammatio jecinoris debet, quæ
saniosam subcruentamque alvum fecit.

His

His animadversis omnibus, facilè constat, quæ discrimina inter dejectiones sanguinis jecinorarias & has quæ proximè sunt comprehensæ, haberi ponique oporteat. Cæterum per hanc jecinoris imbecillitatem, quæ modò proponitur, sæpè ultro sanguis vel è naribus, vel ex utero, vel per hæmorrhoidas, vel cum sputo effertur. Idem morbus, ubi spatium temporis accipit, aut in malum corporis habitum, aut in ipsum vertitur hydropem. Quòd si prius atra dejici bilis incipit, quàm hi morbi nascantur, scire licet ægri vitam in præcipite esse. Huc modò referenda quoque ea jecinoris videtur imbecillitas, qua tametsi id sat probè trahit, retinetque, at debiliter concoquit tamen & imperfectè sanguinem creat. Itaque sub eo vitio cruditates humorum oriuntur, dein pedes, & mox reliquum corpus intumescit. Est id genus noxæ his perfrequens, qui à morbo vel gravi, vel longo convalescunt, & quos hydrops, aut durus jecinoris aut lienis tumor, aut longa aurigo labefecerunt.

Nullum æquè viscus obstructionibus, *Jecinoris ob-*
ut jecur, patet. Ea sic noscitur. Quo *structio.*
loco jecur est, in hunc gravitas (maximè cum quis protinus à cibo exercetur)

& distentio incidit, cui ut obscurus quidam dolor, sic nullus tumor, nulla febris accedit. Sub eo vitio foedus in vultu color est: spiritus interdum non facilè trahitur, utique si homo iter facit, altiorumque superare locum contendit, urina tenuis, diluta & aquosa est: alvus, si sima pars jecinoris obstructionem sustinet, liquida est cremoris specie, & multa, interdum (ut quidam volunt) etiam subcruenta: eadem, si gibbum visceris laborat, compressa, siccaque est: si utrinque vitium est, alvus modò adstricta est, modò liquida. Multos hoc malum gravesque casus infert. Ferè enim qui morbus jecinoris causâ incidit, sive inflammatio sit, sive durus sine dolore tumor, sive hydrops, sive febris, sive atrophia, vel alvi fluxiones, ita fieri prægressis visceris hujus obstructionibus videtur.

*Jecino-
ris du-
rus sine
sensu
tumor.*

Inveterascente jecinoris obstructione, interdum durus insensibilisque in eo gigni tumor solet, quem Græci σκίρρον dixerunt. Is tumor visceris situ & figurâ circumscriptus tangenti renititur semper (nisi si durius premitur) doloris omnis expers. Facilius autem sentiri, si quis in dextrum latus decubuit, potest, quàm si idem sit supinus: tum enim tumor

non

non nisi pressu deprehenditur. Magis etiam is sese prodit, si nondum principium hydropis esse coepit, simulque gracile atque expers adipis abdomen est. Semper autem commodior dextra parte decubitus, quàm sinistra est: vultus obscurum, foedumque colorem habet: spiritus difficulter trahitur: languet appetentia: sumtis epulis homo gravatur, detractis rectius habet: ubi jam vetus fit malum, maxillæ quodammodo laxantur: urina non æquè largiter, ut ante, profluit, tandemque totus venter, crura, pedesque intumescunt, pectus atque humeri extenuantur. Itaque tum (quoniam initio parum occursum fuit) hydrops nasci incipit, qui ut primùm jam accesserit, nulla ægrum medicina periculo subtrahit. Æquè horrendum est, durum jecinoris tumorem aurigine initia præbuisse, aut vicissim hanc ex illo esse coepisse. Tum enim id hydrops sequitur genus, quod *ἀσцитν* Græci appellare suo loco dicemus. Quum frigidus autem humor jecinori impactus longo temporis spatio durum tumorem fecit, is ferè nullo vitæ incommodo diu immoratur: aut certè si in hydropis speciem aliquam vertitur, primùm in vitium mali habitus,

dein in leucophlegmatiam , quam sic Græci vocant , transit.

*Jecino-
ris in-
flam-
matio.*

Quum jecur inflammatione tentatur, febris fit ardens & acuta , dextro præcordio tumor inest , cui dolor jungitur, qui ad nothas ejus lateris costas pervenit. Itaque levis quoque tussis , & crebra , & sicca oritur , spirandique difficultas : accedit ingens fitis , cibique fastidium : tum lingua scabrosa redditur , & lentore oneratur , primùm flavo , dein nigricante : quin etiam frequens movetur singultus , & nausea , & vomitus sinceræ bilis , tum vitellinæ , tum æruginosæ , & sub vehementi morbo , ipsius etiam atræ. Idem humor ita subinde violenter per alvum erumpit , ut grave ejus profluvium , aut tormina concitet : urina crassa est , rubicunda , ac turbida : totum corpus sæpè auriginis colore imbuitur. Quidam urgente accessione desipiunt , simulque accerrimum mejunt. Si gibbum visceris afficitur , tumor evidens , qui injecta manu , & interdum visu deprehendatur , dextro hypochondrio , ubi jecur situm est , inhærescit : mox etiam frequentior tussis , majorque oritur spirandi difficultas : ipse perstringit non solùm nothas costas dolor , verum etiam ad jugulum usque ,

usque, & ad ejusdem partis humerum pervenit. Interdum manus quoque dextra torquetur: adhæc gravitas in affecto loco major est: parum urinæ mejitur, atque, cum grandior est tumor, etiam nihil: rarius, minorque incidit singultus: tota corporis cutis novo colore imbitur. Molestius in dextrum latus decumbitur, premitur enim tum pars infirma, magisque dolet. Porro ubi in cava parte visceris magis consistit inflammatio, minor quidem gravitas subest, at fastidium cibi, sitis, nausea, vomitusque biliosus vehementius urgent: ipseque homo singultu penè strangulatur. Tum lingua etiam nigrior est, promptiorque biliosa dejectio, & summi corporis refrigeratio, & syncope. Magis etiam aliquis, si in sinistram partem decubuit, urgetur. Quæ hîc inhærescit inflammatio, securior est eâ, quæ gibbum jecinoris occupat: hæc sudationibus aut fufis urinis, aut manante è naribus sanguine tollitur: illa sudoribus quoque, sed & cito alvo, aut vomitu conquiescit. Hactenus ea signa posuimus, quæ vehementiori debentur jecinoris inflammationi. Verùm hæc tamen (quod nos frequenter usu medendi observavimus) adeò interdum

terdum levis, parvaque est, ut dolor, gravitas, totusque morbus magna potius respiratione deprehendi, quàm tactu debeat. Omnia sub hoc casu mitiora sunt, ipsumque vitium multis sæpè mensibus trahitur. In quavis jecinoris inflammatione, si crudo etiamnum morbo & viribus infirmis, alvi oritur profluvium, malum est. Inimica etiam corporis liquatio, præcipuè si vel raucitas, vel multa simul tussis accedunt. Mortiferum est spumantem sanguinem excreari, vel sputum statim subputridum, vel sincerè biliosum esse. Haud rarò morbus, ubi non solvitur, suppurat, oriturque abscessus prorsus exitialis. Is ubi jam fieri incipit, febres increscunt & dolores, nihilque ferè de loco affecto defluit: decubitus in omnem partem corporis molestus est, ipse æger sæpè sine ordine, sine certa causa inhorrescit, moxque majoribus caloribus urgetur. Facto pure, dolores quidem, ardoresque minuuntur: at homo longè fit imbecillior, id quod pulsu frequenti, parvo ac languido, crebraque animi defectione cognoscitur. Hæc defectio, ubi rupto abscessu pus effluit, increbrescit, & penè in syncopen transit, ex quo casu servatus vix unquam quis-

quisquam fuit. Quod si vita tum quoque manet, pus modò per alvum, modò per urinas defluit; & interdum vomitione quoque redditur. Non sæpè etiam exeso viscere in abdominis excidit cavum spatium, fitque extialis hydrops, quo venter manifestè intumescit, & inguina, pubesque gravitatem multam habent. Ulcus autem si jecinore relinquitur, nunquam sanescit, hominemque spatio extenuatum consumit: tum alvus putrida est, & saniosa, & nonnunquam subcruenta, ac si ex cadavere esset tacta colliquatio: ipsa quoque urina sanie perfusa est, maximè si in gibbo jecinoris vitium fuit.

Jecur quoque corruptionem totâ patrè substantiâ, ut pulmo, solet, unde homo spatio contabescit. Is morbus sensim oritur, sensimque crescit: quare per initia hominem lecto non afficit, sed obire etiam munia vitæ sinit, tumque febris esse nulla deprehenditur, quæ tandem tamen crescente admodum malo lenta oritur, qualem primo libro proposuimus. Non ingens sitis, non tumor in hypochondrio est: summum vini meraci optimique desiderium, maximum carnis, & præcipuè calentis fastidium afficit: totus homo

mo languet, tum animo, tum corpore; sæpè anima deficit, idquè ubi tandem violentius fit, sudor frigidus erumpit, sub quo æger perit.

*Tumor
lienis*

Lien sæpius quàm jecur tumore, tum laxo, tum duro oneratur. Creber ac difficilis spiritus est, maximè currentibus, vel intentè laborantibus, vel in dextrum cubantibus latus. Ferè manet appetentia, sed malè cibus concoquitur, unde fluctuatio gignitur, & multa oris saliva, rugitus etiam in sinistro hypochondrio auditur, & flatus suprà infrave plurimus editur. Interdum morbi materia ita corrumpitur, malignaque fit, ut totum quoque impetat corpus, idque vel ictero, vel malo habitu turpe reddat. Sub eo malo habitu os malè olet, gingivæ exeduntur, & à dentibus discedunt: loca sub inferiori palpebra tument: sanguis aliqua parte, præcipuè è naribus funditur: dum intus epulæ concoquuntur, acidum quid evomitur, tametsi vomitus in eo morbo semper difficilis est: alvus sæpissimè esse adstricta solet: venter sinistra parte intenditur: aliquis etiam vesperi cruribus est tumor: vultus pravo obscuroque colore foedatur: per quietem turbulenta, & aliena fiunt insomnia. Jam si neque san-

guis

guis uspiam erumpit, neque os foetet, ulcera in tibiis fiunt, quæ aut omnino non sanescunt, aut ægerrimè cicatrice teguntur. Et quidem si durus lienis sine sensu tumor est, quem Græci σκισπῶν appellant, is aliàs ipsius visceris obsidet corpus, situ, & partis figura circumscriptus, aliàs totum undique sinistrum occupat hypochondrium. Idem longiore tempore, quàm is qui latus est, contrahitur, duritiem, omniaque graviora & majora habet. Nihil æquè significare lienis, aut jecinoris vitia, atque color hominis potest, adeò ut ex eo quidam solo non exploratis tactu visceribus, morbum deprehendant. Tumor autem lienis iis insidiari solet, quibus crebrò incisâ venâ sanguis profunditur, & quibus vagæ & incertæ febres, maximèque pestilentialia fuere. Solet autem is plus habere spatii, & minus periculorum, quàm si jecinori inhæresceret. Sub eodem vitio si pedes intumescunt, in proximo hydrops est. Periculosum est sæpè tentatam medicinam non profuisse: urina etiam tuta non est, quæ diu tenuis & aquosa fertur: tormina non longa in eodem morbo utilia sunt, sæpèque malum ex toto finiunt: verùm ubi hæc invete-

rave.

raverunt, nocent : & quidem tum si eadem hæc vel in lævitatem inversa sunt intestinorum, vel in hydropem, nulla succurrere medicina potest. Quilibet lienis tumor curationem per initia difficillimam habet : at si is trahere incipit, nunquam, aut ægerrimè tollitur. Decrescente liene, salutiferum est urinam, amisso aquoso colore, ad sanguineum vergere cœpisse, aut crassam, fæculentam, multamque ferri. Quo magis grandescit lien, eò impensius corpus emacrescit, corrupti intus humoris argumentum. Varii eventus esse tumidi lienis solent : aliis enim per intervalla modò grandescit, modò minuitur : aliis assiduè magnus manet, neque ulla curatione extenuatur, atque hi majore in periculo versantur, hydropi magis opportuni : non paucos etiam videre memini, cum duro liene vitam omnem nullo incommodo exegisse.

Lienis inflammatio. Inflammato (quod rarò fit) liene, durus tumor, ac pulsans, dolorque finistrum obsidet hypochondrium, cum assidua vehementique febre. Ingens etiam æstus atque sitis est, linguaque subnigro lentore oneratur, cibi amittitur cupiditas, spiritus fit difficilis, ac velut imperfectus, qualis esse per iram ejulantibus

pue-

pueris solet. Si abscessus fit, itemque ulcus, iisdem propè notis hîc deprehendi, quibus in jecinore potest.

Proximum est de atra bile dicere; quem morbum miror (tam frequens cùm *Atra* fit) non nisi ab uno, & altero nostro *bilis.* rum hominum agitatum literis esse. Sinistrum hypochondrium neque tumet, neque distenditur, opprimiturve, nec unquam, nisi fortè obscurè, dolet, verùm præcordia æstuant, præcipuè vino aut calidioribus epulis assumtis. Siquidem hæc non facilè concoquantur, fitque plurimus tum ructus, tum flatus. Arteriæ in præcordiis supraque umbilicum vehementer moventur, ipsaque oritur ingens, crebraque cordis palpitatio, quam animi subinde excipit defectio, quo tempore pulsus etiam protinus mutatur. Inter hæc quibusdam incipit aliena esse mens, vanaque tristitia, ac metu concuti. Longus hic morbus est, sæpèque victus errore revertit.

Nunc de communibus vitiis loquar, quæ tum jecinoris fieri occasione, tum *Auriga.* lienis possunt. Incipiam ab Aurigine, quam Græci *ἰκτερόν* dicunt. Sub eo morbo bilis vel flava, vel atra in summum corpus effusa, suo id colore inficit. Hic

color maximè in oculorum albo, & circum tempora cernitur. Ubi à flava bile morbus oritur, fit capitis dolor, & sitis, venæque sub lingua plenæ tument, ingens corporis, maximè cum id movetur, segnities, ac mentis hebetudo est: aliquis etiam pruritus tota cute vagatur: ipsum tamen vix sudat corpus. Semper autem, quacunque de causa natus morbus est, accedit membrorum laxitas: & ubi vehementius homo movetur, spirandi difficultas, multo autem interposito tempore, totum corpus cum pallore quodam inalbescit: febris aut nulla aut admodum lenta inhæret: urina turbida, crassa, & crocea est: alvus, si quidem bilis intus cumulata morbi causam dedit, penitus biliola est: si verò quæ ad bilis folliculum pertinent itinera obstruuntur, dejectiones albicant, nulla amari humoris in alvum illapsa parte: descenditque paucum stercus, & subviscosum, idque paulatim, & crebrò ad desidendum progestu: tum quoque urina adeò rubra, crassaque est, ut propè nigrescat: sentus etiam gravitatis aliquis, at nullus evidens tumor dextra præcordiorum parte percipitur. Porro icterus si lienis sequitur affectum, obscuriore primùm colore corpus

pus

pus inficit, dein sublivido & subnigro: tum ferè sinistro hypochondrio gravitas inest, & subdurus interdum tumor: tristior & animus, atque alienis cogitationibus præpeditus: corpus minus grave, quàm in superiore vitio est: dejectio atque urina, modò pro natura sese habent, modò subnigra sunt: sæpius tamen alvus comprimitur. Hoc genus icteri superiore gravius est, & magis in vetustatem cadit. In eo ipso hæmorrhoides fluere cœpisse, bonum est. Nunquam lien flavum icterum fecit, jecur sæpè nigrum, tametsi hic iste non æquè per omnia niger est, ut is qui propter affectum lienem gignitur. Undecumque autem is esse morbus cœpit, periculum hydropis minatur, si urina prorsus alba, aut certè multum diluta diu fertur. Idem hydrops iis etiam insidiatur, quibus gravis aurigo, longaue fuit. Etenim spatio niger quoque lapillus in bilis concrevit folliculo, quem casum nunquam ferè non hydrops sequitur. Perniciosissimum est durum fieri jecur, aut ex hoc prius duro natam auriginem fuisse. Ea enim res extra omnem opem humanæ medelæ est. Periculum etiam habet orta inflatio, maximèque si ea curationibus non

solvitur. Tutum quoque non est nimiam vigiliam esse, itemque penitus amissam cibi cupiditatem, aut linguam resolutam, sic ut vix formare æger sermonem possit suum: metumque auget, delirium si his intervenerit. Grave etiam est post natam auriginem, febrem sequi, utique si dextra præcordia dura manserunt. Præter hanc auriginis speciem, quam veram esse perhibemus ac simplicem, alia atque alia est, quæ simplex non est, quæque multò rarius incidit. Siquidem ubi jecur inflammatione tentatur, corpus interdum præ sanguinis incendio undique torrefacta bile suffunditur: sub quo casu præter dextri hypochondrii gravitatem, tensionem, & dolorem, vehemens ardensque febris oritur: & accedit biliosa tum urina, tum dejectio: cæteraque signa sequuntur, quæ jecinori inflammato jungi suo loco demonstravimus. Aliud quoque auriginis genus fit per febrium biliosarum judicationes, cum flavus humor vi naturæ in summum corpus extruditur, suumque cuti imprimit colorem. Subitò hæc aurigo nascitur, &, si non alieno tempore fit, febrem absolvit. Tempestivè eam fieri Hippocrates scripsit, die septimo,

aut

aut nono, aut undecimo, aut decimo quarto, modò tamen mollia præcordia sint: ante septimum febris diem si oritur, periculum ostendit.

Grave inprimis malum & observatio-
ne non pauca dignum, aqua inter cutem *Hydrops.*
est, Græci ὕδρωσιν vocant. Tria ejus
numerantur genera. At primum qui-
dem est, cùm toto eo spatio quod inter
peritonæum & intestina vacuum est,
multa aqua coit, unde totum abdomen
distenditur. Græci id ἀσцитην appellant.
Secundum est, cùm hæc loca quæ dixi
plurimus intus flatus onerat, quod vi-
tium τυμπανίτης Græcè dicitur. Novis-
simum genus aquæ subier cutem est,
quod Græci λευκοφλεγματίαν nominant. *λευκοφλεγ-
ματία.*
Corpus molli tumore grandescit, maxi-
mèque tibix ac pedes, cùm aliàs tum
vesperrimè & post exercitationem, aut
quum diu declives hæ partes fuerunt. Is
tumor si premitur, fossulam quæ tardè
rursus impletur, habet, impressi digiti
vestigium: idemque sæpè tumor & ad
femora, & ad scrotum pervenit, quique
vesperi ingens in pedibus erat, mane o-
mnem penè molem deposuit. Venter ad
contactum crassus est, nihilo tamen fe-
rè plus tumoris huic, quam cæteris par-
tibus

ribus inest. Corpus siquidem æquabiliter molle, laxum, ac pallidum est, idemque enerve, ac languidum minimis laboribus frangitur. Ipse trahitur acervatim spiritus, maximèque sumtis epulis, febris item lenta continenter afficit: pulsus undosus est, & parvus, & creber, & inæqualis: dejectio cruda, & non sæpè subcruenta est: urinæ albæ tenues, aquosæ. Hoc genus hydropis ferè diuturnas febres excipit, vitiosumque ventriculi habitum, & nimium compressos nimiumve fluentes tum menses, tum hæmorrhoides; ad hæc spiritus longam difficultatem, & immodicam vigiliam. Idem pueris sæpius quàm adultis infidiatur, solaque magnitudine à pituitosa differt cachexia, quod in illo plus in hac minus tumoris insit. Ferè autem fit ut qui sic laborant, modò rectius sese modò pejus eodem etiam die habeant. Morbo autem incipiente, si alvus sponte profluit, principium secundæ valetudinis facit.

Asci-
tes.

Proximum est notas, quibus Ascites deprehendatur, proponere. Venter, totumque abdomen cum quodam gravitatis sensu intumescit, & quum impellitur, sonum collectæ permotæque intus aquæ præ-

præbet, qualis ab utre non omnino aquæ pleno redditur. Hic humor totus modò intra spatium abdominis includitur, modò pars ejus aliqua in scrotum, & in femora, & in pedes delabitur, maximeque post corporis exercitationem. Sæpè etiam & ad pectoris penetrat spatium, intra ipsum etiam uterum, utique cùm jam magnus morbus, & vetus esse cœpit. Ubi premitur tumor, spiritus fit difficilis: Ferè autem semper vehemens adest sitis: pulsus parvus, frequens, subdurus, atque tensus est: urina perpauca mejitur, eaque ferè crassa & rubicunda est, utique si ab jecinore ortum primò malum fuit: totum autem corpus denitò ventre, extenuatur, ac veluti liquescit: subinde etiam febricula, corruptâ intus aquâ, nascitur. Hic iste hydrops ferè duras veteresque mesenterii, jecinoris, lienis, vel uteri excipit tumores, itemque ardentissimas febres, & ex viscerum noxa contractam, diuque immorata auriginem. Idem infrequentior pueris est, quàm adultioribus, ferèque eos etiam adoritur, qui propter viscerum ruptam vel exesam venam, crebrò sanguinem vel vomitu, vel alvo reddunt.

Superest modò novissimum hydropis genus quod à flatibus oritur, & ob id

Tym.
ananas.

Tympanias Græcis appellatur. Venter, etsi minus quam in Ascite habeat molis, ita tamen tenditur vehementer, ut digito percussus tamquam tympanum sonet: idem parum fluctuat, sed leve murmur ac quendam veluti rugitum exhibet: frequens ructus desiderium est, eoque edito levare aliquantulum homo videtur: pedes non usque adeò ut in cæteris generibus hydropis tument: reliquum corpus extenuatur. Sæpè hoc malum ventriculi & coli inflationibus, itemque longis febribus successit. Illud rectè ab Hippocrate animadversum video: quibus tortiones, & circa umbilicum, circaque lumbos dolores sunt, qui neque medicamentis, neque ullo alio modo solvuntur, iis in hoc ipsum genus ficci hydropis ista consuesse firmari. Ascites atque Tympanias sic à Leucophlegmatia differunt. In hac totum corpus laxa mole æqualiter crescit, venterque nihilo plus hujus, quam cæteræ partes habent. At in illis prioribus solus venter attollitur, estque aliquis pedibus tumor, sed reliquum corpus emacrescit. Pulsus sub Leucophlegmatia undosus est, mollis, & latior. In Ascite parvus, creber, subdurus, ac tensus. In Tympania longior, celerior, creber, non imbecillus,

lus, subdurus, ac tensus. Illa ferè omni hydropi communia sunt. Ubi his nondum quidem est, sed ut fiat metuitur, solitas naturæ vacuationes præter modum compressas esse, potissimum hæmorrhoides atque menses, aut contra aliquid ex his ipsis æquo plus vel diutius ferri; adhæc vel durum in jecinore atque liene tumorem, vel auriginem, intestinorumve lævitatem inveterascere, neque idoneis tolli remediis potuisse; præterea diu malos succos, malumve corporis habitum fuisse, (illud Græci *κακοχυμία* hoc *καχεμία* dicunt). Sed & inter hæc vel testiculos interdum intumescere, appetentiamve modò ingentem, modò nullam esse. Ubi verò morbus invasit, inferiora corporis à ventre ad pedes usque tumorem exhibere, spirandique esse difficultatem, & colorem hominis vitari ex virore scilicet albicantem: adhæc cibi incidere fastidium, itemque sitim, ac siccam tussim, tametsi prior illa magis peculiaris sit Asciti, & tussis arida Tympaniæ. Æquè communia sunt semper in hoc morbo jecur affici, & humoris nimiam abundantiam esse, ob quam ne ulcera quidem in corpore facilè sanescunt. Hydrops sæpè per se incipit, sæ-

pè alteri vetusto morbo, potissimum quartanæ, supervenit. Ferè autem eum aquâ repletum iri timor est, cum sanguis ubertim suprâ infrâve erupit, itemque febris accessit: ex quo casu vix quisquam evadit. Tutius laborant hi, quibus magni modò fiunt tumores, modò rursus occuluntur. Verùm decipit ea sæpè res ægros, penitusque facit, ut curationes negligant medicorum, ac pereant, fiducia secundæ valetudinis falsi. Securior censetur hydrops, qui lienis, quam is qui jecinoris secutus tumorem est. Securissimus, qui nullo antecedente morbo coepit: utique si firma viscera sunt: si spiritus facilè trahitur: nulla aut tussis, aut sitis, aut linguæ ariditas est, præcipuè a somno, quo tempore incidere illa maximè solent: adhæc si nullum cibi fastidium, eoque sumto, nulla homini molestia est, si venter mollis est vel extenuatur: si is ipse accepto medicamento, movetur: aut si excrementum fundit molle ac figuratum: si urina, mutatione potionum, aut epotis medicamentis, ipsa protinus demutatur: si homo expers doloris, & caloris, & lassitudinis est, morbumque facilè sustinet. Qui omnia hæc habet, is tutò laborat. Bonum

num autem est, tumores in extremis tantum partibus esse: optimum est nusquam esse. Cita quoque alvus quæ levat morbum, utilis est: quæ gravat, prorsus inutilis, atque perniciosa est. At verò summum periculum significatur, si is morbus calidum siccumque corpus, ac simile jecur occupat: si ex acuto morbo coepit: si durum jecinoris aut lienis secutus tumorem est, sic enim nunquam, aut certè vix unquam sanescit. Metus autem augetur, ubi in eodem morbo sicca tussis oritur, aut fluxio sanguinis, alteriusve qui hominem non levat humoris, maximè si spiritus manet difficilis, & ipsa vertitur in tormina dejectio. Tum enim ægrum proximus ferè tertius dies tollit. Tutum quoque non est comitiales affectiones accedere, malè olere spiritum, itemve sputum, aut sudorem, aut universum denique corpus: adhæc ubi febris quoque accessit, urinam modicam atque turbatam esse, aut ubi aqua jam medium corpus implevit, sanguinem sursum, deorsumve aliqua parte prorupisse. Præterea sublatum morbum sæpius, & brevibus intervallis revertisse, multòque magis idoneis agitatum remediis remittere non potuisse, stabilemque,

&c

& inconcussum corpori inhærescere. Ad extremâ ventum est, ubi sub infirmis viribus incipit profluere alvus, simulque ingens spirandi difficultas urget: ubi prava ulcera grandiaque in ore, gingivis, tibiis, aut alia denique corporis parte oriuntur, ubi veluti concretus sanguis ab alvo dejicitur: ubi urina diversis matulæ regionibus diversos colores exhibet, sic ut infernè rubra sit, supernè livida, aut contrâ. Cita quoque mors occupat, si, cùm quis secatur, aut uritur, aqua ex ventre simul semelquè omnis effusa est.

*Vulne-
ratio
jecino-
ris &
lienis.*

Jecinoris atque lienis vulnus, si summa tantum parte acceptum est, hæc infert. Ad spinam præcordia reducuntur: sanguis vomitione, atque dejectione redditur: in latus dolor pungens incidit, qui in nonnullis ad jugulum etiam pervenit: inter hæc sæpè anima deficit, oriturque febris, atque alvi profluvium. Si æger primis diebus non moritur, spatio consumitur, egenisque nutritionis contabescit. At verò quum altius intra viscera mucro descendit, sanguis, qua parte præcordiorum vulnus illatum est, copiosè profluit, sequiturque bilis vomitus: ipse æger lubens, ac quadam voluptate in ventrem cubat. Hinc
ani-

animi oritur defectio, quæ sæpè gravis
recurrens, orto frigido sudore occidit.

*Observationes in vitiis renum, & vesti-
cæ utiles.*

Renes, ubi affecti sunt, diu malè ha-
bent, præcipuèque in senioribus. *Renum inflam-
matio.*
Eorum inflammatio, quæ tamen admo-
dum infrequens est, his sese signis pro-
dit. Assiduè febris tenet, & sine certo
ordine ea modò increfcere, modò minui
videtur: dolor gravis ac pulsans cum ve-
hementi ardore, paulò nothis costis al-
tior, in dorso versatur, ejusque tractus
inde ad jecur usque, si dexter ren labo-
rat, pervenit: deorsum verò ad vesicam,
ad naturalia, ad pectinem, & ad femo-
ra pervenit, magisque si vitium in rene
sinistro est. Hic ipse dolor sternutamen-
to, atque tussi intenditur. Idemque a-
liàs continenter hominem fatigat, aliàs
intervalla, quibus mitescit, habet. A-
deò verò in quibusdam effrenatus est, ut
animi occupentur defectione, & fusis
sudoribus labefiant; Inter hæc ingens
est cibi fastidium, itemque nausea, &
stomachi dolor, & crebra bilis vomitio:
venter arctissimè comprimitur, ex quo
is

is etiam inflatur, & rursus sursum per os assiduè extundit: urinæ reddendæ difficultas, at assidua cupiditas est, eaque frequenter quodam cum ardore promanat, primùm tenuis, & aquosa, in quâ nihil subsidet, hinc magis rubra, tandem autem crassa, & mucosa. Sæpissimè autem extremæ partes, maximèque pedes refrigescunt, propinquo cruri stupor inest, ac vix erigi homo potest, vel pedibus incedere. Facilior etiam ægris in latus infirmum decubitus est, facilior supinis, quàm pronis. Id profectò genus morbi concoctione probâ maturuisse, jamque penitus sanatum esse, finitis doloribus cognoscitur, & urina multa, crassaque, in qua quid subsidet, bonum est, vimque finiendi morbi habet. At verò periculum nuntiatur, si frequens bilis vomitus est, longèque magis delirium terret, si simul etiam extrema inalgescunt. Certa mors est, quum ren præ nimio tumore dirumpitur. Jam autem ubi inflammatio adhibitis remediis non cessit, dolorque in loco pulsans & gravitas manent, febrisque non minuitur, imò potius increscit, sed & crebrum simul mejendi desiderium, magnaue difficultas est: scire licet suppurationem intus fieri.

fieri, quæ ubi jam consummata est, manet quidem gravitas in rene, at dolor mitescit, minorque redditur febris. Ubi erupturus abscessus est, homo inhorrescit, sequitur vehementior & febris & dolor. Ut primùm is erupit, protinus hæc ista conquiescunt: tum urina crassa, turbida, subcruenta, & multa profluit: cum qua si pus album, leve, æquale, & odoris non mali fertur, certam bonæ valetudinis spem facit.

At si id ad intestina quoque divertit, aut alioqui cum urina redditum malè olet, lividumque est, & inæqualiter mucosum; scire licet malum esse, ex eoque gravem intus exulcerationem significari. Ferè tum quoque carunculæ quædam perexiguæ ex putri renum substantia quasi capilli cum urina efferuntur. Jam autem non sæpè, curata perperam inflammatione, elapsis maturationis temporibus, febris omnis dolorque cessant, durus autem tumor cum multa loci gravitate relinquitur. Cujus rei peti indicium inde debet, quòd sine resolutione materiæ, sine suppuratione dolores conquieverunt, & quòd diu urina aquosa, & pauca fertur, quòdque coxa, & quæ his sunt partes inferiores, stupent, im-

po-

potentes fiunt , atque emacrescunt. Is profecto catus extra spem omnem medellæ est. Itaque interposito spatio , in hydropem vertitur , & occidit.

*Renum
calculus.*

Tormentum à calculo renibus illatum sic innotescit. Acerbissimus atque more infixi aculei pungens dolor in renem incumbit , eaque sede stabilis inhærescit ; nisi quod interdum per ilia versus coxendicem , vel ad testem proximum excurrit. Nullus foris tumor est : spina ægrè flectitur : crus quod è directo est affecti renis , aliis stringitur , aliis quasi obtorpescit : frequens est ructus , & ingens cibi fastidium : sub maximis doloribus vomitus fit , primum pituitæ , mox bilis flavæ , ac tandem etiam æruginosæ , post quæ dolores mitescunt : alvus astringitur , eademque , quia renem fece vel flatibus premit , dolorem auget : quod si fortè ea solvitur , cum spiritu excrementum subbiliosum reddit. Cùm quis aut in ægram decumbit partem , aut cibo vacuus est , dolores leniuntur , cùm in contrariam cubat , aut cùm sumtæ epulæ descendere jam ad intestina incipiunt , omnino exaugentur.

Urina , veniente accessione , pauca ; tenuis , & diluta est , moxque crescente

tor-

tormento, tota subinde cohibetur: at excusso è meatu urinario (quem ^{ἐρητήρ} Græcè dicunt) lapide, urina copiosa, crassaque profluit, in qua resident arenulæ multæ & subinde grandiores, & inæquales calculi, aut horum confractæ partes. Eadem interdum bullat, & malle olet, quodamque sensu ardoris crebram mictionem facit: non rarò etiam quasi sanguinem trahit, maximè si labor aut equitatio durior antecessere. Qui huic morbo obnoxii sunt, his multo tempore urina ferè crassa, subrubra, cum densa, tenacique spuma redditur; quæ aliàs sedimentum habet rubrum, subviscolum, arenosumque: aliàs turbida permanet, quæ si panno percolatur, in eo similem propositi sedimenti sordem deponit. Hujusmodi urina sæpe multis annis nullo vitæ incommodo fertur, sine renum dolore, sine ulla alia calculi nota: verùm tandem subitò præter omnem opinionem acutissimus dolor in renem incidit, simulque alvus adstringitur, & crus quod è directo est, stupet. Is dolor ex intervallis sat longis sæpius redit, idque interdum sine calculi excretionem, tumque urina crassa, ac turbida est, propterque prægressam duram fortè equita-

O

tio-

tionem, interdum cruenta. Scilicet sola sanguinis mictio sæpè renis calculum patfecit: qui neque dolore, neque ullo alio indicio significabatur: adeò, ut ne subesse quidem putaretur. Quum autem renis dolorem calculi sequitur excretio, is ubi in caput impegit ductus urinarii, penitus efficit ut urinæ mejantur tenues, paucæ, subaquosæ, & haud rarò etiam totæ cohibeantur: ubi verò vel remeat hinc in cavum renis calculus, aut certè ubi foràs in vesicam excutitur, protinus ea redditur urina, quam modò proposui: ut rectè dixisse Hippocratem existimem, repentino renum dolore, cum mictionis defectu, calculorum, aut crassarum urinarum excretionem portendi. Non rarò calculus adeò grandis est, ut è renum substantia, in qua gignitur, pelli in cavum non possit. Itaque id temporis vix ullus dolor inest, sed urina fertur crassa, turbida, subrubra, qualem descripsi. Et quidem si validus labor, aut dura inciderit equitatio, non solum hujusmodi urina redditur, sed etiam verè cruenta, in qua quod subsidet, quasi sanguis est in grumum concretus. Ubi propullus in vacuum renis calculus est, is, si grandis est, deorsum latus meatum obstruit urinarium, ipsamque adeò intercipit urinam,

nam, vel certè reddi paucam facit, eamque solito tenuiorem, & subaquosam: simulque acutissimum dolorem movet: ubi minor est, quam ut multùm impingere in iter urinæ, cùm in hoc descendit, possit, itemque ubi grandis est, & in cavo renum contentus, hucque recens è substantia trusus, nondum ad urinæ meatum impegit, urina fertur crassa, turbida, rubra, aut sublivida, obscura. Porro leves calculi, & rotundi non æquè difficulter, ut oblongi, & asperi, excluduntur. Non omnibus autem eadem magnitudo, vel forma, vel asperitudo est. Quibus vetusti jam renum dolores sunt, quoniam urinæ itinera magis patent, hi grandioribus calculis potius torquentur, mediocribus non item. Quibus novum id vitium est, aut certè rari ejus dolores fuère, hi minimo etiam calculo cruciantur. Omnibus autem renum calculis ferè color subruber est: quanquam purulenti renes albos etiam calculos elidunt: sed & aliàs nigros & pallidos fuisse ejectos constat. Quò urina sub hoc morbo magis aquæ similis est, & quo diutius sic fertur, minusque sedimenti habet, eo duriores in rene calculos, & magis confirmatos, magisque rebelles esse

sciendum est. Tametsi urina vix unquam clara ab his mejitur, qui gravioribus renum doloribus sunt opportuni. Idem tormentum frequens est pinguioribus corporibus, itemque senioribus, vix unquam autem pueris accidit, rarò ad adultam ætatem provectis. Infrequens etiam est iis qui sæpius vomunt, & alvum non impeditam habent. Ut omnia renum vitia in sene difficillimam curationem accipiunt: sic hoc ipsum quod proponitur, planè nullam. Idem omnium est maximè hæreditarium, adeò ut vix unquam calculi effugiat tormentum, quisquis parentum occasione huic expositus morbo à naturæ ortu fuit.

*Renum
exulce-
ratio.*

Cùm aliis de causis, tum maximè propter calculum exulcerari renes solent, id quod his notis ostenditur. Urina crassa, turbidaque est & per labores plus coloris habet, in hac sedimentum per quietem fit crassiusculum, tumque reliqua urina ferè inclarescit. Si recens ulcus, simplexque est, cruor cum urina fertur: si cavum ac sordidum est, crassior urina fit, & alba, & foetida, verèque purulenta, lacti non admodum dissimilis: in hac autem ipsum subsidet pus: *ubi altius ulcus insedit & sine modo sordidum in fistulam*

*lam ab it, in hac ipsa quam proximè dixi
urina, crassamentum quoddam subsidet vi-
scidum & cohærens, narium muco, aut o-
vi candido persimile. Inter hæc ipse sæ-
pè ren ita pereditur, ut pus, membra-
na ejus ambiente tanquam marsupio,
multique item calculi obvolvantur.*

Hinc etiam in venas pus delatum, ma-
lum efficit corporis habitum, qualis an-
tecedere Leucophlegmatiam consuevit.
Interdum etiam inter peritonæi fluctuat
membranas: non sæpè etiam eo ipso to-
ta ventris, lumborumque regio impletur,
& subinde vomitu, vel alvo sincerum
redditur. Jam verò per omnem penè
morbi pecursum urina modo non ægrè
mejitur, modo guttatim destillat, assi-
duèque ad mingendum quodam irrita-
mento invitat: dolor lumbos exercet cum
aliquo gravitatis sentu. In hoc autem
vitio si post mictionem puris, sanguis
mejitur, indicium gravis erosionis præ-
bet. Ulcus renum & vesicæ, ubi lon-
ga (quod ferè fit) vetustate occupatur,
nunquam sanescit.

Est etiam animadversio in mictione *Cruen-*
sanguinis è renibus profecti necessaria. *ta à re-*
Semper is universæ urinæ sic temperatur, *nibus*
ut hâc quasi dilutus esse putetur sanguis, *mictio.*

idemque protinus subsidet rubicundus, liquidus, ac minimè concretus. Quod quidem vesicæ causâ dico, à cujus musculo qui cruor dimanans, & in cavum vesicæ lapsus inde emejitur, urinæ non æqualiter miscetur, idemque, ubi subsedit, in grumum mutatur: si calculus in causâ cruentæ miæctionis est, (id quod ferè semper, nisi casus aut ictus intervenit, incidit) notas attendere oportet ei vitio peculiare. Tametsi sæpè cruenta miæctio calculum sola detexit, sine renum dolore, aliove ejus morbi indicio. Si rupta intus vena est, sanguis ubertim, & subito, iniopinanterque profluit: simul casus violentus antecessit, sive ictus aliquis est, sive grave onus levavit, sive ex alto cecidit, aut quid hujusmodi perpeffus injuriarum est. Rarior omnino ea sanguinis est miæctio, quæ à renum pendet imbecillitate, vel quæ venarum in iis adapertionem sequitur, vel jecinoris vim infirmam, vel consuetæ inanitionis defectum, vel vitam summi otii compotem, vel membri alicujus amputationem. Non rarò cruor ab erosione exulceratisque renibus destillat, tumque paulatim is, & cum pure aliquo mistus exit, idque diutius durat. Itaque cùm à rupto

pto

pto renum abscessu is etiam cum pure descendit, propterea ab ulcere renum non reddi intelligitur, quod ejus mictio non diu trahat, sed ferè intra tertium diem cesset. Sanguinem sæpius minxisse cum febre, & dolore, malum esse Hippocrati placuit: tum autem præfagire licet futuram puris mictionem, eodemque tempore febres dimissuras. At rarò cruorem cum urina ferri, idque sine dolore, sine febre, non usquequaque esse periculosum, idem autor judicavit: quod per lassitudines ferè incidit, quæ inde protinus solvuntur.

Urinæ fluor, qui Græcis διαβήτης appellatur, tum subesse dicitur, cum potio non multo post quàm sumta est, nihil ferè demutata, immodicè sub aquæ specie cruda mejitur. Ingens sitis continuo afficit, quæ potatione sedari nulla potest: quod bibitur sæpè id majore copia mejendo redditur, quàm quâ sumtum fuit. Itaque totum etiam corpus eo modo consumitur, ac veluti liquefcit: quamquam nonnullis lumbi, & coxæ, & testes, maximèque pedes, leviter intumescunt: visceribus etiam aliquis inesse æstus videtur. Id genus mali, ubi incidit, diuturnum est, & à renibus pendet.

Urinæ
fluor.

Cum recens est curari interdum potest , cum in vetustatem incidit , nunquam potest , sed corpus liquefacit , atque marcore consumit. Idem vitium rarissimum esse volunt. Nobis per omnem vitam non nisi semel apud Nervios , quum illic Medicinæ artem exerceremus , observatum fuit.

*Renum
vulne-
ratio.*

Vulneratis renibus dolor ad inguina , & ad testiculos descendit , & urinæ difficultas est , eaque cruenta redditur : Interdum etiam cruor fertur.

*Tabes
dorsalis.*

Priusquam vesicæ attingam vitia , tabem hoc loco dorsalem proponam. Grave genus morbi , quod nostri homines non animadverterunt , ipse luculenter memoriæ prodidit Hippocrates : nos inter curationes ægrorum non semel observavimus. In caput vehemens & acutus incidit dolor , ex eoque nonnullis superne descendere veluti formicæ videntur. Dolent etiam collum , & lumbi , eorumque muscoli , & crurum articuli , sic ut inflecti interdum non possint : alvus pigra atque impedita nihil reddit , & urina difficulter mejitur : quum autem vel alvus , vel urina redditur , profluit genitale semen multum ac liquidum , idemque fit per somnum , siue utitur aliquis

fœ-

foeminæ consuetudine, siue caret: semen etiam in utero non manet: per vehementes itineris labores, maximèque si altior locus superandus est, corpus summè labefactatur, spiritus fit difficilis, caputque grave est, & aures sonant. Quis sic laborat, febre caret, &, quanquam nullo urgetur cibi fastidio, ejus tamen nullum fructum sentit, penitusque consumitur: idem incipiente morbo quietius sese atque rectius habet. Quò autem magis is ipse morbus inveterascit, eò magis omnia homo dolet: & crura velut ab aqua inter cutem intumescunt: nonnullis ulcera à lumbis emergunt, quorum alia fanescunt, alia rursus enascuntur: tandem orta gravi suffusione, homo penitus occæcatur. Exercet hic morbus præcipuè cum recentes sponso, tum alios qui nimium Veneri indulserunt. Illud quoque à nonnullis observatum est, intermittere aliquando hoc vitium, & denuò redire consuesse: quod per septennia fieri quidam medicus, quem hoc affectum occæcatumque morbo novi, tum in sese ipso, tum in plerisque aliis animadvertit.

Grave imprimis tormentum calculi *Vesicæ* *calculus.* vesicæ est, quod & diu trahit, & quibusdam intervallis sæpius recurrit. Ubi

id autem incubuit , gravitatis ingens sensus (si grandior calculus subest) magisque ad motum corporis , vel quædam quasi titillatio circa pubem & perinæum versatur : urina cum mictionis assidua cupiditate difficulter redditur , fitque quoddam veluti stillicidium , sic ut vix posse cohiberi urina videatur : quæ tamen , ut primùm cœpit perrumpere , mox tota intercipitur , indicitque hoc modo intercisa mictio. Inter hæc dolor toto colic meatu versatur , sæpèque is sola in glan-
de est , post extremam mictionem gravissimus. Id temporis alvus dejici velle videtur : promptius in nonnullis si recti sunt , quàm si supini cubant , urina exprimitur , utique si grandior intus calculus hæret : alii inclinati emingunt , collemque contrectando atque extendendo remedium doloris quærunt. Fœminæ extrema pudenda manibus crebrò scabunt , & , admoto ad vesicæ cervicem digito , calculum subinde sentiunt. Multi etiam mediis doloribus pedes inter se iteratis vicibus implicant. Si urina prodit , ea alba , crassa , & turbida redditur , cui sedimentum inest purulentum , vel mucosum. Interdum etiam sanguis , aut quid cruentum concretum trahitur. Hoc

genus morbi sæpius pueris accidit quam adultis : sæpius viris quam foeminis. Calculus vesicæ magis albicat, itemque grandior, & durior est eo quem renes extruderunt. Minor facilius in vesicæ impingit cervicem, urinamque pertinacius retinet, quàm is qui major est : hic enim, vel pro corporis positu, vel intromisso instrumento, inde non difficilimè depellitur.

Non leve periculum in quovis calculo vertitur : immensis enim fractus doloribus, & propter obstrictum iter suppressâ nimium urinâ extinguî homo potest. Haud rarò animadversum est, à vesicæ calculo data vel tenesmi, vel procidentis infimi intestini principia fuisse. Multos constat esse repertos, qui sine dolore calculum diutissimè intus foverunt.

Nullus æquè metuendus casus incidere in vesicam potest, ut inflammatio, *Vesicæ inflammatio.* quæ non in hujus partis, (ut fortè aliquis existimet) substantia: sed potius in cervicis defigitur musculo. Febris acuta cum multo æstu movetur : infrà perinæum, suprà pecten atque pubes latè dolent : interdum his locis rubor, ardor, atque distentio accedunt, quæ omnia à pube ad ipsum usque perveniunt umbilicum :

cum : frequens desidendi cupiditas, summaque difficultas est : urina ægerrimè excluditur, sæpè tota diutius cohibetur, maximèque cubante ægro : interdum guttatim maximo conatu destillat. His accedunt vigilæ, delirium, vomitus biliosus, & extremorum frigus. Perrara est vesicæ inflammatio, pueris magis familiaris, à calculi scilicet tormento illatis injuriis. Metum minuit urina purulenta, cui sedimentum album ac leve sit. Si dolores in hoc morbo non solvuntur, neque vesica mollescit, periculum est ægrum primis circuitibus moriturum. Nulla etiam evadendi spes est, ubi febris acuta diu immoratur, simulque urina, & alvi dejectio prorsus retinentur: aut ubi urina nullam exhibet notam concoctionis, unàque dolores magis indies ingravescent. Inter quæ sæpè ultrò lethalis oritur gangrena, ex qua vix unquam quisquam evasit. Ubi suppurare malum incipit, (quod certè grave est) omnia fiunt atrociora. Quod si antè erumpere id, quàm pereat æger, contingit, dolores cæteraque mitescent omnia, ipsaque ubertim urina cum pure fertur, Visus est hic abscessus viam sibi per perinæum patefecisse, qua parte urina elapsa per anum

anum omnis ferebatur.

Cùm multis de causis, tum maximè *Cruenta à vesica mi-*
 propter vehementes in excludendo calcu-
 lo nixus, cruor è vesica ferri consuevit: is *ctio.*
 urinam non totam undique perfundit, &
 quum per quietem subsedit, concrevisse
 in grumum cernitur: ejus subinde cruo-
 ris pars aliqua sine urinæ mictione elabi-
 tur. Ferè autem sub eo vitio urina pau-
 latim veluti stillicidio quodam exprimi-
 tur, eademque dolorem exiens movet,
 ac veluti colis radicem adurit. Cæterùm
 gravissima quæque incidere, sanguine in-
 tra vesicam concreto, solent: nam cre-
 bro anima deficit, ipsaque fit exigua spi-
 ratio, & pulsus obscurus, parvus, &
 frequens: oritur etiam multa nausea, a-
 nimi anxietas, & frigidus sudor. Hinc
 totus homo fit imbecillus, & pallet, &
 extremis partibus refrigescit. Ut pluri-
 mùm autem aliquis antè incubuit in ve-
 sicam violentus casus, quem aliquamdiu
 sanguinis secuta mictio est, subitòque si-
 ne certa causa desinit. Tum vero subin-
 de rigor incidit, cæteraque protinus post
 hunc sequuntur signa, quæ modo pro-
 posuimus. Tardius cruenta mictio, ve-
 sicæ affectu nata, curatur, quàm quæ
 à superioribus locis profecta est.

Com-

*Vesicæ
exulce-
ratio.*

Comprehensivæ vesicæ malis, haud rarò ejus succedit ulceratio : major quidem atque gravior in cervicis musculo, post abscessus ruptionem ab inflammatione relictæ : levior autem in vesicæ corpore, quam fortè exulcerationem, vel acrior urina, vel offendens calculus fecit.

Si ex abscessu ulcus mansit, id cavum est, ac sordidum, unde aliàs sanies, alias multum foetidi puris cum urina crassa fertur, in qua id ipsum per quietem subsidet. Jam verò si interior vesicæ pellicula leviter abraditur, crassa quoque urina est, quæ exiguum modò puris, modò cruoris trahit : & , cùm paulò altius ulcus insedit, pelliculas, & furfuracea quædam ducit. Hæ pelliculæ magis crassæ, albæ, magnæque sunt, si ulcus in altiore vesica est : si juxta urinæ ductum atque fistulam, minus albæ, magisque tenues, & parvæ redduntur. Ingens in proposito casu mingendi cupiditas est, sic ut teneri urina vix possit, tumque gravis dolor pubem & perinæum exercet, maximèque hic novissimam sequitur emictionem. Idem etiam dolor, ubi quis sese erigit, augetur. Quod si serpens fit ulcus atque depascens, aliquis etiam subinde cruor cum sanie, pureque

foe-

foetido in urina cernitur. Sæpissimè quoque ulcere admodum sordido, maxime si à Venereo seminis profluvio id natum fuit, quædam veluti filamenta in urina versantur, primùm tenuia, mox ita crassâ, ut spissam quoque urinam faciant: tandem crassus & viscidus veluti mucus, quale candidum ovi est, subsidet. Quæ proximè dixi filamenta, longo post tempore, quanquam ulcus curatum est, cum urina feruntur.

Inter renum & vesicæ ulcera sic distinguitur. Renibus ita affectis, non æquè difficulter urina redditur, & quod ex his deteritur, rubet, seu tenues trahuntur carunculæ, seu filamenta capillis similia: minor etiam incidit dolor, sæpiusque cruor, & majore copia mejitur, magisque toti urinæ permistus est. At verò exulceratâ vesicâ, major fit urinæ tum cupiditas, tum difficultas. Quicquid decedit, album est, (nisi id tamen à renibus huc descendit) & dolores magis urgent: minus sanguinis, minusque urinæ misti fertur. Cæterùm si is urinæ meatus, quem *σπυγγα* Græcis appellari dixi, exulceratur, urina subcrassâ est, princeps modi cruoris, vel certè puris, quod capillorum specie natat in urina. Æquè etiam

etiam sub hoc casu pelliculæ, ac quædam quasi furfuracea redduntur: sed dolor inter renem, & pubem versatur. Ulcera renum, aliorumque urinæ itinerum promptius, quàm vesicæ sanescunt. In senibus nullam penitus hæc ipsa curationem habent, in aliis ætatibus difficillimam.

*Urinæ
reten-
tio.*

Varia fieri noxa in reddenda urina solet. Ea enim aut paulatim destillat, aut summa difficultate redditur, aut denique prorsus cohibetur. Primum Græci *σπαιτυρία*, alterum *δυσουρία*, postremum *ισχουρία* nominaverunt. Priora duo leniora esse possunt. Tertium gravissimum, ac, si diutius immoratur, mortiferum est. Ubi superioribus inhærescit urinæ ductibus obstructio, in lumbis doloris est aliquis vel gravitatis sensus, notæve affectorum renum antecesserunt: vesica inanis nihil vel dolet, vel tumet, neque quicquam urinæ adhibito instrumento reddit, quare ne ullum quidem mictionis urget desiderium. Contrà hoc ipsum maximum est, cum vesicæ obstructæ cervix urinam impedit, tumque pubes tota intumescit atque dolet, multumque urinæ intromisso ferro prorumpit. Ad suppressam urinam

si tenesmus accedit, intra septimum diem
 occidit, nisi febris intervenerit, quæ li-
 quefactione iter urinæ expediat. Cæte- ^{Urinæ}
 rum in eo malo, quod ^{δυσουρία} vocari ^{difficul-}
 dixi, urina difficulter magnoque dolore ^{tas.}
 redditur, idque interdum affatim, in-
 terdum paulatim. Stillicidium autem ^{Urinæ}
 esse urinæ dicitur, cum ea guttatim sem- ^{stillici-}
 per conatu quodam, at dolore alias nul- ^{dium.}
 lo, aliàs vehementi, exprimitur. Id
 vitium si dolore caret, retentioni urinæ
 finitimum est, sin minus, difficultati. Si
 urinæ stillicidio volvulus accesserit, pri-
 mis diebus septem hominem tollit, nisi
 febris quoque interventu fluere ubertim
 urina cœperit. Omnino autem id ma-
 lum senibus diuturnum est, junioribus
 brevius, neutris (nisi quid accedit) le-
 thale. Quod si id à sanguinis grumo
 qui intus imegit, oritur, horrendum
 esse gravissimis casibus solet: nam nati-
 vus homini color perit, pulsus fit par-
 vus & frequens, & languidus, idem-
 que totus subinde concidit: accedit
 rigor, febricula, nausea, defectio animi,
 frigidi sudores, & id genus alia, quæ
 concreto intra vesicam sanguine fieri di-
 ximus. Porro nonnunquam invitis uri- ^{Urinæ}
 na sine acrimoniæ & doloris sensu pro- ^{inconti-}
 fluit, ^{nentia.}

fluit, quod vitium in senibus curari non potest. Idem, si per febres incidit acutas, viribus infirmis, pestiferum est.

*Vesicæ
vulne-
ratio.*

Ubi vesicæ illatum vulnus est, dolent inguina, quæque juxta pubem sunt loca intenduntur. Ex vulnere urina fertur, aut certè pro urina sanguis mejitur. Accedit vomitio bilis, singultus, delirium, & horum sequax comes mors.

*Observationes in vitiis naturalium
utiles.*

*Proflu-
vium
semi-
nis.*

Semper tædiorum, sæpè etiam plurimum periculorum vitium, humani seminis profluvium est, γονόρροια Græci vocant. Semen præter voluntatem, præterque modum, sine pudendi tentigine, sine Venere, aut nocturnis imaginibus elabitur: idque adeò interdum diu & impense fit, ut interposito spatio, hominem consumat. Paulatim enim corpus labefit, cùmque indies aliis id locis omnibus, tum maximè circa lumbos emacrescit. Ipsum verò quod ita fertur semen, crudum, aquosum, liquidum, tenue, nec prorsus album est. Maximè autem id vitii eos adoriri solet, qui puberem ætatem Venereis libidinibus

cor-

corrupere. Idem nostro seculo contagiosum esse coepit, dignissimum scortatoribus flagellum; à quo recta ad morbum Venereum via est. Sub eo casu virus quoddam album aut subcitrinum per colem noctu atque interdiu latenter sine sensu elabitur: id interposito spatio admodum fit putre, atque acre, ideoque ipsum etiam intus exulcerat penem. Id verò jam factum esse, dolor ostendit, qui colem; cum is erigitur, sic afficit, ut veluti fune substringi videatur. Idem dolor per mictionem, maximè cum ea fieri vel incipit, vel desinit, sese prodit, sic ut vel difficultas subesse urinæ, vel calculus putetur. Is morbus tum viris accidit, tum foeminis: sed in his frequentius est, ægriusque quàm in illis tollitur. In eo autem, cum uterino convenit fluore, quòd humor assidue promanat: verum diffidet contra, quod multo hic sit crassior, quodque vix unquam desit ulcus ab acri virulentoque natum excremento: adhæc quòd fusis menstruis, hæc ista fluxio non desinat, quum uteri fluor in ipsis menstruis, & paulò post cessare sit solitus.

Quodvis colis interioris ulcus diu trahere consuevit: interdum ita fit cavum,

maximèque per Venereum seminis profluvium, ut foras etiam ad ipsam usque penetret, emergatque cutem. Si id ulcus negligitur, non rarò carnosum tuberculum urinæ ductui innascitur, itemque ex aggestis fordibus quidam veluti callus verrucæ similis: tum urina vel retinetur, vel non pleno impetu fertur, ipseque homo sic ad omnem corporis positum urgetur: compressio pene, itemque intromisso instrumento tuberculum deprehenditur.

Σαλυγία-
σις, καὶ
πριαπισ-
μός.

Est etiam in cole vitium, quo is continenter erigitur cum lasciva quadam palpitacione, multaque opinione libidinis, σαλυγίασιν Græci nominaverunt. Est & ejus penè generis aliud, quod πριαπισμὸν vocant: in eo arrectum assiduè pudendum, sine Veneris desiderio, præternaturam increscit, quodam quasi tetano distentum. Rarò id malum incidit, quo tolli etiam hominem posse nonnullis placere video.

Ramex.

Proximum est scroti vitia proponere, in quibus inflammatio est, & sine hac durus tumor, maximèque ramex, quem Græci κήλην, nostri etiam Herniam vocant. Ejus multæ formæ, multæque esse causæ possunt. Quum rumpitur aut
etiam

etiam relaxatur ea tunica, quæ diducere ab inferioribus partibus intestina debuit, Græcisque *περὶ τὸν σκῆθρον* appellata est, protinus devolvitur aut omentum, aut intestinum, ac sensim ab inguine (nisi in eo tamen immoratur, vitiumque *τῆς βεβωνοκῆλης* gignit) in scroto dimittitur finum. Commune est evidentem in scroto, vel in inguine tumorem, eumque non permanentem esse, sed cursu, labore, satietate, & retento spiritu crescere: iterumque resupino, homine, vel sponte, vel per lenem digitorum impulsus, eo quod intus est remeante, perire. Si id quod descendit omentum est, ægerrimè intrò revertit, sive inedia fueris, sive varius corporis positus, atque figura: ubi verò remeat, id penitus sine murmure fit. Idem hic tumor si tangitur, inæqualis est, & mollis, & lubricus. Græci id genus *ἐπισπλοκῆλην*, nos Ramicem omenti nuncupamus. Quod si intestinum illapsum scroto est (quod vitium *ἐντεροκῆλην*, id est, Herniam intestino- rum appellant,) tumor sine dolore, sine inflammatione, modò minuitur, modò crescit, idemque, quiescente homine aut etiam vigili, sed tamen diutius resupino, interdum ex toto perit: verùm clamore,

fatietate, violentoque corporis motu, propterve grave tollendum pondus nixu crescit, frigore omni contrahitur, calore laxatur. Id temporis rotundum est scrotum & tactu læve. Quod intus est, ubi premitur, lubricum est, & modò spontè, modò si leniter digito impellitur, quodam veluti rugitu ac flatulento murmure recurrit. Ubi grave id vitium fit, intestinum accepto stercore vastius tumet, sic ut retrò compelli non possi, ex quo casu gravis oritur volvulus, qui tollere etiam hominem solet. Inter quæ dolores magni, & scroto, & inguinibus & abdomini accidunt. Incipit subinde affici stomachus, sequiturque bilis vomitus, primum rufæ, dein viridis, ac interdum ipsius etiam atræ. Cæterùm, sit ne ex ruptione ejus, quam dixi membranæ Ramex ortus, an verò ex laxatione, certis internosci notis potest. Nam si intestinum ab initio protinus, atque universum devolvitur, prægressa solâ violentâ causa, tumorque prægrandis est, si compressum intestinum multo rugitu sursum recurrit, iterumque recto corpore protinus, vel tussi, vel retento spiritu delabatur, scire licet factam ruptionem esse. At laxationis hæ notæ sunt:

Lon-

Longiore temporis tractu intestinum paulatim magis magisque quamlibet ob causam descendit, tumor æquabilior & magis esse in profundo deprehenditur, neque aliquo murmure id quod descendit recurrit, neque ita facile, ubi erectus homo est, elabitur. Quin etiam ramex ex laxatione, vix unquam extra inguina procedit: ex ruptione autem, prope semper in ipsum promovetur scrotum. Ramex ex ruptione per initia, primus fortè septem diebus, non difficillimè tollitur, maximèque in pueris: ubi inveteravit, vix unquam curari, nisi manu, potest. Quod tamen auxilium anceps, & plenum periculorum est. Porro scire licet, interdum simul, & omentum & intestinum posse descendere, quod vitium Græci ἐπιπλοέντερονήλην, id est, Ramicem omenti, atque intestini vocaverunt. Jam verò sine peritonæi offensa aliqua, scroto accidere alia genera ramicis solent. Nam interdum aquosus humor intus collectus, interdum caro increscens, nec rarò varicosus tumor causam morbi hujus dedit. Cum aqua subest (quod vitium Græcis ὑδροκήλη, nobis aquosus ramex dicitur) tumor, quantum in se

est, dolore omni caret, & firmus in intento scroto inhæret, fame quidem, aut febriculâ, aut etiam de die, (maximeque si puer), is utcumque extenuatur, at nunquam ex toto tollitur. Idem tactui cedit, si paucior intus humor est: verum ubi is multum crevit, æquè ut uter repletus, & strictus digito renititur, & opposito lumine, ut cornu, pellucet. Quod si in utraque parte scroti, hæc ipsa quæ proponimus, cernuntur, constat utique duplicem ibi ramicem aquosum esse. Ubi diutius retenta intus aqua vehementer computruit, ipsum etiam subinde corrumpit testiculum. Insidiatur autem magis hoc genus ramicis iis corporibus, quorum succi non boni sunt (Græci hæc *κακοχυμικά* nominaverunt) & his etiam multò magis, quæ in hydropem inclinant. Quare extracto per ferri usum humore, facilè novus denuo ingeneratur, nisi toti quoque corpori adhibita curatio est. Ad hanc ramicis aquosi speciem non alienum sit, hunc quoque referre, qui ex flatibus ortus, nimia distentione gravem dolorem movet. Flatulentum appellari eum à quibusdam video. Rarò quidem, sed aliquando tamen

dura

dura caro intra testium tunicas increfcit idque vitium Græcè σαρκοκήλη, id est car-
 nofus ramex dicitur : cujus tumor etiam
 perpetuus, ut in superiore est, fed pon-
 dere gravior, itemque durior, obfcu-
 rior, coloris ubique ejufdem, neque
 pulfatus refonat, idemque longiore fpa-
 tio temporis paulatim increvit Super-
 eft modò ramex varicofus, qui Græcè
 κερτοκήλη dicitur, durus, & ad modum
 virgarum oblongus tumor, quem fcire
 licet ægerrimè tolli remediis poffe.

Inflammatione etiam affici nonnun-
 quam tefticulus folet: tumque acutus do-
 lor, rubor, calor, atque durus tumor
 fubeft: eaque omnia magis fefe foris pro-
 dunt, fi inflammatio in fcrotum effun-
 ditur: obfcuriora autem funt, magisque
 tangendo, quàm intuendo explorantur,
 fi vitium folum occupans teftem in pro-
 fundo occulitur. Prout autem gravis
 eft inflammatio, febris etiam modò eft ali-
 qua, modò nulla. Poft malè curatum mor-
 bum, durus fæpè manet tumor fine do-
 lore, fine calore, atque rubore, qui tu-
 mor nunquam ferè auferri ex toto po-
 teft.

*Testi-
culi in-
flam-
matio.*

Proximum eft ad uteri morbos transi-
 re, qui & varii effe, & pleni tædio pe-
 ricu-

*Uteri
inflam-
matio.*

riculisque solent. Gravissimum ejus malum inflammatio est, ea quidem quæ totum uterum non autem solam (quod sæpius fit) ejus cervicem occupat. Vehemens dolor atque pulsans locum urget: isque, si anteriora magis afficiuntur, ad pubem pervenit, & urinæ difficultatem aliquam, vel stillicidium parit: si posteriora magis inflammantur, alvus cohibetur, & dolor lumbos fatigat. Jam si in latere plus vitii est, protinus inguen intenditur, cruraque gravia difficulter moventur. Semper autem acuta febris inest, & multus capitis dolor, magisque anteriore ejus parte, & circa radices oculorum. Dolent quoque cum distensione atque gravitate imus venter, pubes, coxæ vicinæque his id genus partes. Lumbis etiam multus infestus ardor est. Incipit affici stomachus, doloreque & nausea, & singultu sollicitari. Ipsa autem foemina adeo parum commodè in omnem partem corporis movetur, ut non sedere, non surgere, nisi summa difficultate, non pedibus ingredi nisi quadam claudicatione possit. Eadem molestè in id latus cubat, quod morbo caret. Porro si uteri cervix inflammationem sustinet, id quod frequentius fieri dixi, abdomen dolet, ipsum.

ipsumque uteri os, admoto digito durum occurrit, fervidum, atque præclusum. Atque is sanè casus reperire aliquam curandi viam potest, prior ferè nullam potest. Nonnunquam uteri inflammatio in durum, sensuque carentem tumorem desciscit: rarius in cancrum: sæpius in abscessum, qui, simul atque fieri incipit, pulsantem dolorem atque febres exauget, hæque cum horrore crebrò sunt, & nullo ordine exasperantur. Confecto pure, protinus hæc ista paulùm incrementum: ac tum quidem aliàs urina cohibetur, aliàs alvus: interdum tumor juxta pubem attollitur, & quasi inundatio profluentis rei alicujus intus sentitur. Id temporis pus erumpit aliàs in uteri cavum, aliàs in abdominis spatium, ibique inter intestina subsistens, copiâ imum ventrem distendit, ac veluti pondere onerat. Quod autem pus per uteri cervicem foràs excluditur, id si album est, leve, æquale, & odoris non mali, sanitas fœminæ redditur: si verò virulentum est, malè olens, & multis coloribus variegatum, scire licet rem in periculo esse. Rupto atque exinanito abscessu, sordidum ulcus manet: sub quo acer mordaxque oritur dolor, sanies, & colluvies fertur, non eadem usque copiâ, sub-

*Uteri
exulce-
ratio.*

substantiâ, atque colore: odor huic modò gravis adest, modò etiam nullus, sic ut ab albo uteri fluore, id quod ita exit, profectum esse credatur. Si in uteri cervice malum inhærescit, ipso etiam deprehendi tactu potest: sin altius infedit, eorum quæ efferruntur utendum notâ est. Ergo ubi simplex ulcus non à rupto natum abscessu, interiorum uteri, aut ejus cervicis pelliculam abrasit, aut modicè excavavit, humor paucus, æqualis. crassius, albicans excernitur. Quod autem ulcus è rupto abscessu sordidum est, plus quidem humoris fundit, at minore dolore. Uteri ulcus ita interdum malignum fit, ut serpendo proxima quæque loca erosione violet. Id Græci *ρῶμιν* appellaverunt, estque hoc tum multò magis sordidum, foetidum, ac rebelle, quàm prius fuit. Tum sub hoc casu, tum sub duro, longoque uteri tumore proclivis esse cancer solet. Dolor eo tempore circa inguina, & imum ventrem, & abdomen, & lumbos versatur: moles intus gravis esse quasi pondus aliquod videtur, jungiturque febris, non æquè tamen ardens ea, ut in uteri inflammatione: ipsum denique malum maximè diuturnum est. Quum

exul-

exulceratio quoque cancro accessit, ulcus, præterquam quod dolet & durum est, etiam labris est prætumidis, & ex concreta forde lividis atque horridis. Quod ex eo manat, id graveolentissimum est, tenue, nigrum, vel etiam fulvum. Hoc genus vitii, vel ipso iudice Hippocrate, inanem omnem medicinam experitur.

Interdum ex inflammatione neque resoluta, neque in abscessum versa, itemque aliis de causis durus nasci uteri tumor potest: idque modò totius hujus, modò alicujus in eo partis. Is tumor tactu durus, atque retinens deprehenditur, cui nullus aut certè obscurus inest dolor, sed difficulter vel urina, vel alvus redditur: & ubi recta foemina est, grave pondus pudenda urget, quasi foras prolapsurum: totum corpus fit impotens, ægrèque mobile, maximè inferioribus ejus partibus, sic ut difficilis admodum hoc nomine omnis incessus sit: nonnunquam venter inflatur, & speciem hydropis (qui subinde tamen sequitur) præbet.

Uteri durus sine dolore tumor.

Uterus quoque certis de causis inflatur, id quod durasse nonnullis per omnem vitam observandum est. Venter imus ingentem tumorem habet, & tendi-

Uteri inflatio.

di-

ditur : & dolore urgetur : hic dolor ad septum usque transversum , & ad stomachum pervenit. Idem latera etiam utrimquè perstringit , sæpèque alterum inguen , interdum utrumque : adhæc umbilicum , lumbos , pectinem , ipsumque subinde afficit per consensum caput. Non rarò flatum manifestò elidi per naturalia scæminarum contingit , itemque murmura intùs , strepitusque , ubi corpus flectitur , exaudiri similes omnino his sonis , qui cieri sub torminibus solent. Ipse autem venter digito percussus , tanquam tympani sonum edit , utique si capax uteri spatium flatus implevère. Quod si is ipse rarioribus substantiæ meatibus inhærescit , dolores movet longè atrocissimos , & ægrius remediis tollitur. Solet hic morbus puerperas magna ex parte tentare , non sine magno periculi metu.

*Uteri
hydrops*

Est etiam aliquis uteri hydrops totâ ejus capacitâ aquarum plenâ. Venter inflatur , magnamque gravitatem , & conversus in aliquam partem , sonum fluctuantis intus humoris exhibet. Eum humorem quibuldam ex utero singulis mensibus , nullo vitæ incommodo esse expurgatum , doctorum hominum constat animadversione.

Se-

Sequitur modò id uteri vitium, quod *Mola.*
Græcis *μολή*, id est, mola, appellatur,
quodque nulli accidere foeminæ sine viri
consuetudine potest. Informis in utero
consistit caro, cute, vel membranis cir-
cumdata, venasque intus multas habet,
sine visceribus tamen, sine intestinis, at-
que ossibus. Ea caro assumto per ve-
nas suas alimento, indies crescendo, ute-
rum omnem ingenti mole implet, ut vel
octimestris etiam subesse partus exstime-
tur. Hæc verò moles non sæpè per om-
nem vitam intus tutò manet: paucis e-
tiam quarto anno, aut quinto excidit:
plerisque omnibus tertio quartove exclu-
ditur mense, spemque prægnationis om-
nem falsò conceptam ludit. Siquidem
in hoc vitio, menstrua retinentur, mam-
mæ intumescunt, urget cibi fastidium,
facies decolor est, venterque indies ma-
gis ac magis grandescit. Verùm ut his
notis imprægnationi consentit, sic rur-
sus ab ea distat, quod durior hic est tu-
mor, & quod nullo id quod intus est
motu proprio cieatur, sed stabile inhæ-
rescat, gravitate fixum sua, neque un-
quam, nisi ubi vel premitur, vel ubi se-
se foemina in latus convertit, moveatur.
Tum enim, non ut foetus, leni blando-
que

que impullu, sed impetu quodam, in quam partem corpus inclinat, provolvitur. Quam etiam subinde informis hæc caro, aut multus sanguis cum humoribus cumulatis, nec rarò etiam flatus excluditur. Quibusdam quales inter pariendum esse solent dolores atque pressiones, ab eo, quem dixi, flatu oriuntur. Omnibus autem inter hæc corpus extenuatur: incessus fit difficilis, sic ut propendere pondus aliquod ex utero videatur: tandem verò cum jecur quoque unà jam affici cœperit, ipse sequitur hydrops. Mola omnis, nisi inter initia curetur, ægerrimè tolli potest. Quum menses sine certis imprægnationis notis retinentur, simulque venter sine hydrope intumescit; scire licet aliquid in utero, quod præter naturam sit, inesse, irritum videlicet conceptum, vel molam, vel flatum.

*Uteri
ascen-
sus at-
que de-
scensus.*

Uterus etiam ferri è sua sede potest, isque modò ascendere, modò descendere, vel prolabi, & interdum in alterutrum latus inclinare. Ascensio adeò in quibusdam vehemens est, ut ad ventriculum etiam uterus velut globus aliquis afferatur, eumque graviter premat, indeque manu depelli suum in locum possit. Ubi

id

^bid vitium incidit, fœmina præcordiis do-
let, & spirandi urgetur difficultate, &
animi defectione, idque illæsa penitusque
incolumi mente. Ubi autem descende-
re incipit uterus, mulier, si recta est,
gravem in pudendum molem sentit in-
cumbere, quæ digito etiam explorari,
tangique, quoniam pudendo occurrit,
potest: si supina est, vel alvum dejicit
rectum urgeri intestinum sentit: si pro-
na, difficulter mejit. Idem morbus lon-
gè gravior redditur, cum eversus uterus
(quod tamen rarius incidit) foràs provol-
vitur. Quo tempore ingens dolor pe-
ctinem fatigat, oriturque subinde nervo-
rum distentio atque tremor. Uteri fun-
dum magnitudine ovi anserini aut stru-
thiocameli foras prominet admissio digi-
to obvius. Is si sic diu persistit, vix ul-
lum auxilium periculo fœminam subtra-
hit. Jam verò si convulsus uterus in in-
guen dextrum vel sinistrum contorque-
tur, crus totum maximèque femur tor-
porem atque frigus habet, inguen, &
interdum coxendix gravi dolore confli-
ctantur. Is dolor vehementius incre-
scens, nervorum infert distentionem, &
quendam (ut vocant) uteri furorem.

*Uteri
convul-
sio.*

Haud leve vitium est ab utero factus *Uteri*
stran-

Q

*strangu-
latus.*

strangulatus, qui Græcis *πνίξ ἰσχυρὰ* vocatur. Eo incipiente nausea multa fit, ferèque sine vomitu: sequitur cibi fastidium, cum ventris quodam rugitu, tametsi hic iste non semper comitatur; post hæc incipit esse difficilis spiritus, creber, ac brevis: idemque post paulum ita arctatur, ut veluti vinculo præstrictæ fauces videantur, magno metu præfocationis, inter quæ leviter anima deficit, ex qua tamen re vix pulsus immutatur. Tandem vero incipit affici caput, mentis sedes, quæ tum iracundiâ, tum metu, similibusque passionibus turbatur. Sæpius autem altus incidit quasi sopor, sub quo obmutescit fœmina, totaque pallefcens atque oculis clausis corruit, ac veluti attonita jacet, sensus, motusque expers, sic ut comitiali morbo videatur prostrata. Spiritus huic summè parvus, rarus, & obscurus est, adeo, ut vix superesse ullus credatur: pariterque ipse propè concidit pulsus, tametsi etiam is (ubi levius malum est) interdum constet: cùm remittit accessio, uterus paulatim laxatur, & humoris quippiam emittit: tum obmurmurant intestina: oculi aperiuntur: malæ rubescunt, protinusque mens, sensus, ac motus fœminæ

næ

næ redeunt: sic ut eorum quæ inciderunt, penè omnium suppetat memoria, Differt hoc istud vitium à morbo comitiali, quoniam neque oculi vertuntur, neque spuma ex ore movetur, neque admodum nervi distenduntur. Strangulatus causâ uteri genitus, multis crebrò revertens perpetuus est: aliis protinus in ipsa est accessione, aut paucis post eam horis lethalis: quo tempore hæc ferè comitantur. Diu immoratur accessio: fit summè spiritus difficilis, pulsusque creber & ordinis expers, tamen si is interdum totus etiam aboletur: perit insuper sensus & motus: summum corpus frigido sudore imbuitur: post quæ syncope incumbit, & mors. Minus grave vitium est, in quo hæc quæ proposuimus insunt omnia, solo illæso spiritu. Eò rursus minus grave, in quo sensus etiam, motioque, non tantum spiratio integritatem habet, cætera adfunt. Morbus hic quibusdam intervallis quasi circuitibus ut comitialis movetur, inciditque magis hyeme atque autumno, maximè calidis atque humidis puellis, ac viduis etiam quæ præter morem consuetudine viri diu caruere: itemque his etiam foeminis, quibus sterilitatem

medicamenta, non ætas, conciliaverunt.

*Men-
strua.*

Proximum nunc est ad eas observationes quæ de menstribus haberi possunt, transire. Ergo ubi hæc opportunè justo modo, & æqualis, bonique coloris singulis temporibus, & iisdem propè mensium diebus feruntur, optima, ac pro natura esse putandum est. Hisce autem erumpentibus horrores incidunt, & lassitudines, & capitis gravitates, & collic dolores. At verò periculum gravissimorum afferunt morborum, quæ nimium vel cohibentur, vel profluunt. Neque enim illud ab Hippocrate dictum ratione caret: utrisque his, quarum menstrua plus justo vel retinentur, vel fluunt, ab utero morbos fieri. Ubi præter modum, præterque ætatem retinentur, totum corpus fit grave, doletque caput cum gravitate, præcipuè anteriore parte: hic dolor ad cervices etiam pervenit, ad scapulas, ad lumbos, & ad fundamenta oculorum. Sæpè fœmina, ac si concepisset, inhorrescit, sæpissimè nauseat, ac cibum fastidit: nec raro etiam febriculâ urgetur: ipsa tota tristis, & inquieta est, subindeque viri consuetudinem concupiscit: urina crassa est, turbida, rubicunda & interdum nigricans. Longa

*Men-
struo-
rum re-
tentio.*

men-

menstruorum retentio , gravissimarum fomes ægritudinum est : ut furoris , melancholiæ , morbi comitialis , resolutionis nervorum , caliginis oculorum , tussis , difficilis spirationis , præfocationis , duri viscerum tumoris , hydropis , podagræ , tremoris cordis , syncopes, & hujusmodi. Quæ foemina lac habet , si neque peperit nuper , neque gravida est , ea à menstruis defecta est : tum verò necesse est , si ea diu sic manet , acerbissimos in capite dolores fieri , vel morbo aliam quampiam partem infestari. Quod si inter hæc sanguis è naribus fertur , res omnis in tuto est. Quæ foemina non peperit , gravius & citius retentione laborat menstruorum , quàm ea , quæ peperit : in hac enim venæ magis ad hanc fluxionem patent , in illa minus.

Æquè horrendum est , nimium menstrua fluere cœpisse , ex quo totum fit infirmum corpus , ejusque color vitiatur : labascit cupiditas , atque concoctio : crebri oriuntur febriles ardores , novissimè pedes molli tumore inflantur , indeque reliquum corpus , ex quo ipsa gignitur inter cutem aqua. Hoc genus fluxionis , si ob partum grandiore incidit , ferè tutum esse , ac suaptè cessare sponte so-

*Menstruorum
fluor.*

let. Cum abortum sequitur, exanimare etiam foeminam, & præceps afferre exitium potest. Si rupta aut patefacta intus grandior vena est, cruor profuse effluit. Si minor vena fuit, paulatim is ipse nec multus fertur. Ubi autem erosio venam afficit, non solum paulatim sanguis manat, verum etiam cum sensu doloris. Menstrua humidioribus foeminis diutius durant, citòque hæ, nisi illa profluunt, intumescunt.

Fluor muliebris.

Huic fluori is quodammodo affinis videatur, quem Latini muliebrem, Græci *ρόδον γυναικείον* dicunt. In eo tamen non purus fertur sanguis, sed quid corruptum, idque assidue, nullove certo vel ordine, vel circuitu. Quod promanat, aliàs liquidum est cremori simile, aliàs citrinum, aut pallidum, idemque acre, atque mordax, cui modò nullus odor, modò gravis adest: utrique autem vitio commune est, locos humoribus madescere, foeminam decolorem fieri, eamque neque appetere cibum, neque ejus fructum sentire, oculosque (ubi fluor inveteravit) habere prætumidos, & difficulter spirare. Uteri fluor non solum ætate maturas, verum etiam virgunculas afficit juniores, quas esse foedas tristis pallor facit.

Ul.

Ultimo hoc loco ea jam proponenda animadversio est, quæ de abortu, atque incommodo haberi partu potest. Sed prius quædam de conceptione dicere non alienum est. Primùm itaque scire licet, *Impræ-* non concipere fæminam posse, cui ni- *gnatio-* mium frigidus ac densus est uterus, in *nis im-* quo nimirum viri semen extinguitur; nec *pedi-* etiam, cui is ipse præficcus atque calens *menta-* est: nam semen, deficiente nutrimento, corrumpitur. Nec concipit, cui præter naturam crassæ os uteri ab omento comprimitur, nec cui nimis tenue corpus atque macrum est. Si finitis menstruis os uteri non ficcatur, sed humidum manet, signum est, conceptionem fieri nondum potuisse. Quæ fœmina concepisse se rata, non concepit, & per multos fallitur menses, menstruis jam tum cessantibus, simulque ventre augescente; ea caput dolet & præcordia, neque lac, nisi modicum, & id aquosum habet. Verùm quæ concepit, ea his doloribus (nisi si familiares sunt) caret, & lac non improbum habet. Fœcunda mulier sanitate utitur firmiore, at citius est anus: sterilis autem diutius juventæ decorem servat, at non firmæ valetudinis est. Concepisse autem *Impræ-* fœminam hinc scire licet, cùm ea simul *gnatio-* *nis no-* *tæ.*

cum viro aut paulò post magna voluptate semen emittit, idque intus, cum eo quod viri est, retinet, sic ut muliebres minimè madescant loci. Tum horrore mulier eo ipso afficitur die, aut veluti quadam titillatione contrahi uterum sentit: cujus deinde os ita clauditur, ut ne specilli summam admittat apicem: idemque, interposito tempore, interius retrahitur, ut vix explorari digito obstetricis possit. Inter hæc menstrua compressa sunt, nisi si primis aut novissimis mensibus, non ex ipso quidem utero, sed ex iis quæ ad cervicem ejus pertinent, venis, (ut in virginibus fit) sanguis nullo foetus incommodo feratur. Post hæc mammæ grandescunt, latera, lumbique exporriguntur, ac venter totus sine ullo molesti ponderis sensu intumescit: ut hoc quoque discrimine, tum à mola, tum ab uteri hydrope verus differre conceptus possit. Per hæc tempora frons interdum maculis foedatur, vel citrinis, vel lividis, ipseque oculorum ambitus aspectu languido aqueum livorem exhibet: urina citrea est aut sublivida, itemque crassa ac turbida, quæ levi concussione bullat, vel granula è summa corona demittit: hujus sedimentum crassum est, atque in-

star

star carptæ lanæ non benè junctum : eadem urina, si vinum album accepit, similis fit jusculo coctarum fabarum. Tandem verò foetus moveri incipit, certissimum sui præbens judicium : id quod aliis citius, aliis tardius, plerisque omnibus media imprægnatione contingit. Atque hæc concepti foetus certæ notæ sunt, qui, priusquam absolvatur, edaturque in lucem, multis sollicitare incommodis matrem potest. Ea enim, si alicui opportuna morbo, aut humorum vitio antè fuit, id secundo, tertiove mense sentire incipit. Itaque tum tota ea lassâ *Præ-* redditur, lumborumque, & inguinum, *gnan-* & femorum dolorem, gravitatemque patitur, ac gravi somno per diem urgetur. *tium incom-* *moda* Inter hæc cibi amittitur cupiditas, fitque ingens nausea, quæ modo irrita est, modo bilis vel pituitæ vomitum ciet. Hic ipse si non sequitur vomitus, fit protinus difficilis spiratio, & vertigo, animique tum anxietas, tum levis defectio : interdum etiam absurda oritur rerum alienarum appetitio, ut terræ, carbonum, testarum, & hujusmodi. Sed perire hæc omnia post quartum aut quintum prægnationis mensem consueverunt. Cæterum ubi jam gravida esse foemina

Q 5

cœpit,

coepit, si subito mammæ macrescunt, abortus periculum significatur. Si cum eadem gemellos fert, altera mamma extenuatur, alterum abortit: marem quidem, si dextra emacruit: foemellam autem, si sinistra. Hac enim parte magis foemellæ, illâ potius mares gestantur. Equè magnum abortus periculum est, mulierem utero ferentem acuto morbo rapi, aut sanguine per incisam venam inaniri, aut potentibus medicamentis purgari: utique si longo jam spatio grandior redditus foetus est. Quin etiam sine medicina partum elidere cita alvus potest. Prægnantibus hæmorrhœis, valde malum: Erysipelas in utero, perniciosum: lac etiam ubi è mammis profluit, præcipuèque aquosum, imbecillum esse arguit, quod prægnans intus gerit. Duræ mammæ, incolume id esse testantur. Si gravidæ menstrua solito more fluunt, sanus esse foetus non potest. Si febribus eadem conflictatur, aut vehementer sine causa manifesta emacrescit, magno negotio periculoque parit: aut certe abortiens, in discrimine versatur. Ferè autem præter naturam tenuis tantisper abortit, donec facta fit habitior. Quæ autem mediocriter corpulenta

pulenta secundo aut tertio imprægnationis mense sine evidenti occasione abortit, huic acetabula (Græci *κετυληδόνες* vocant) plena lentoris sunt: sic ut fœtum continere nequeant, pondere gravem suo. Quicunque autem prægnanti inciderit casus, spem securitatis amittere non oportet, mammis nondum graci-
lescentibus. Cæterum si fœtus vitæ ca-
ret, nullus intus motus est, qui ante fre-
quens fuit: venter gravis est, & quasi
procidere velle videtur, nihiloque secius
ac si hydrope urgeretur, intumescit,
distenditurque, & cadaveris pondere o-
neratur: idem simulque latera refrige-
scunt, quæ antè caluerant: ingens dolor
circa umbilicum versatur: stomachus
mordetur: spiritus malè olet: oculi mi-
nuuntur dolentque: nares atque aures
frigidaë fiunt: totus vultus pravo colore
fœdatur: ipsa mulier crebrò inhorrescit:
& in animi labitur defectionem: inter-
dum convulsionibus quasi comitialibus
distenditur: ferè autem semper gravi vi-
gilia urgetur. Porro futuri abortus hæc
signa traduntur. Mammæ sponte exte-
nuantur, aut ex his lac aquosum fertur:
latera, superiusque venter arctantur:
lumbi, coxæque gravitatem insolitam
habent,

*Signa
emortui
in utero
fœtus.*

*Abor-
tus
præsa-
gia.*

habent, & pigrè moventur: foetus, si vitam habet, vix movetur: postremò aqua profluit saniosa, tenuis, dein sanguinea, postquam ipse sanguis, hinc grumus, atque tum protinus foetus excluditur. Cæterum quum hoc ipso incolumi partus incipit tempestivus, plus laboris esse solet in pingui muliere, quam in tenui: plus in puella edenda, quam in masculo. Ferè etiam plus negotii abortus, quàm maturus partus exhi-

Difficilis partus notæ. bet. Prælagire autem difficilem partum licet, si totus ante foetum aquosus humor effluit: aut longa, copiosaque sanguinis eruptio antecessit: si ipsa foemina crebrò inhorrescit, & languidiore dolore, perque longiora intervalla urgetur. Rectè enim Hippocrates judicavit, partus sine debito dolore periculosos esse. Ubi mulier à partu haud commodè purgata est, venter, & interdum crura tument: dolor atque rigor lumbos atque imum ventrem occupat: fitque interdum animi defectio. Quod si ex partu febris cum ingenti continuoque dolore capitis infestat, scire licet in magno rem metu esse.

Uteri vulneratio.

Ubi uterus vulnere percussus est, inguina dolent, & coxæ, & femora: sanguis partim ex plaga, partim obscœnis lo-

locis effertur, sequiturque bilis vomitus. Novissimè, ubi in propinquo exitium est, eadem quæ corde vulneratis solent accidere, sequuntur.

Observationes in vitiis articulorum utiles.

MOrbus articularis Græcè ἀρθρίτις appellatus, sub quo nomine ^{αὐ-} *Mor-*
bus ar-
ticula-
ris.
 δάγαν, χειρὰ γαν, & ἰσχυὰ δα comprehen-
 dimus) diu trahere, & per intervalla re-
 currens, gravibus tormentis dolorum afficere hominem solet: neque ullus ferè morbus est, qui magis à parentibus trahatur. Is ipse interdum repentè in omnes irruit articulos: sæpius paulatim accedit, oriturque levis chiragra, vel etiam podagra, maximèque calidioris naturæ hominibus: sic, ut hunc dolorem nemo nisi expertus, morbi esse articularis crederet. Ab his partibus, multo spatio dolor ad cæteros articulos irrepit, quibus ex more esse infestus solet. Quin etiam cùm malum invaluit, vertebræ quæ in spina sunt, afficiuntur, genæque dolent, atque ipsum interdum guttur, nec ulla ferè ossium connexio hujus expers cruciatus est. Quæ pars huic vitio patet, ex leve occasione fatigata, æquè frigido, calidoque offenditur. Hic autem morbus, ubi ad senectutem

Et utem usque inveteravit, aut certè in ea esse coepit, itemque ubi extra hanc ætatem callum contraxit, nunquam ex toto sanatur. Dum callum dico, nodosam illam intelligo arthritidem, sub qua diducuntur articuli, distorquenturque, & motu pereunte curvi fiunt. Juveni autem semper facilius succurritur, si amans laboris est, & accurate victitat, & facilem alvum habet: præcipuè, si quæ morbum fecit materia, non ex diversis mista humoribus est. Quæ omnia tamen sic spem faciunt, ut interea nondum aliquis contractus sit callus. Nihil æquè propemodum hoc morbo affectos adjuvat, atquè tormina, vel quocunque modo fluens alvus. Nihil penè gravius est vino, atque Venere, si modo carent. Propter febrem quoque, & fieri vitia articulorum, & sanari possunt. Salutiferum in his signum est varices nasci, aut urinam crassam & multam esse. Atque hæc quidem communia sunt in omni Arthritide. Nunc illa, quæ magis propria cuique vitio censentur, sequar. *Χειράγρα* in manu est, ejusque vel carpum affligit, vel partem externam, vel articulos ac vincula digitorum: circum sæpè tumor, rubor, calor, pulsansque dolor est.

*Χειρά-
γρα.*

Ποδάγρα autem pedes infestat, ingeritque Ποδά-
 tormentum, vel malleolis, vel plantæ, præ-
 γρα.
 cipuèque pollicis articulo: eademque hic,
 quæ in priore inesse vitio diximus, sequun-
 tur. Podagra rarò castratos, vel pueros
 antè Veneris usum, vel mulieres quæ
 menstruis carent, adoritur. Quæcun-
 que pars tum hic, tum in superiore vi-
 tio, morbo patet, ea debilior fit, & e-
 macrescit. Podagræ dolores, cessante
 inflammatione, intra dies quadraginta
 conquiescunt: iidemque magis Autum-
 no, atque Vere moventur. Coxæ au-
 tem dolor (Græci ἰσχυράδα nominant) al- ἰσχυράδα
 tius ad summum natem, non in magno
 ejus articulo defigitur, inde in femur
 quoque sese, & in suram, & in extre-
 mum pedem extendit. Idem interdum
 circa inguina inhærescit, & urinæ diffi-
 cultatem laceffitâ vesicâ parit. Ipsum
 vero crus modo calidum, modo frigi-
 dum est. Rarò evidens emergit tumor,
 minus sæpè calor aut rubor. Id autem
 vitium graviorem præ cæteris generibus
 dolorem movet: ferèque post longum
 morbum, inclinâtâ in coxam materiâ,
 gignitur. Porro longissimum erit, at-
 que nequaquam anno finiendum, si in-
 gens torpor subest, & crus, coxaque, &
 lumb-

lumbi multum frigent, alvusque nunquam, nisi ubi coacta est, respondet, & nil nisi stercoraceum mucum reddit: si denique arrigi pudendum non potest, hominisque ætas annum jam emensa quadragesimum est. Huic vitio succurrere Veratque Aestas potest: parum sperare vel Hyeme, vel Autumno licet. Junioribus æquè graves dolores atque senioribus, at non æquè longa morbi hujus spatia sunt: ante quadragesimum enim diem juvenes liberantur: minus etiam vehementes his torpores fiunt, minusque crura, ac lumbi frigent. Jam verò si sub eodem morbo dolor lumbos, coxamque deserit, & ad inferiorem vertitur partem, sperare utique bene licet: sin contrà, coxâ, lumbisque non desertis ad superiora pervenit, rem difficillem esse testatur. Quòd si eo jam ipso in vetustatem incidente femoris caput elapsum extrà coxam est, protinus femur contabescit, homoque nisi ustus est, claudicat. Observatum haud rarò est, ex hoc coxæ dolore natum hydropem esse. Sanata podagra, atque ischias facilè reverti consueverunt: at cæterorum vitia articulorum non item. Ubi in humerum articularis doloris tormentum incubuit, nullus evidens

dens tumor, vel calor, vel rubor est: ubi cubitum aut genu affligit, multum & doloris, & tumoris exhibet, at ruboris, colorisque perexiguum.

Observationes in vitiis cutis utiles.

Variis incommodis tædiique plenis nostra exposita cutis est, quæ quamvis per se periculo vacent, fœda tamen esse, & propter malum fieri corporis habitum solent. Primo itaque loco scabies ponatur, *ἡσυχία* Græcè appellata, durior *Scabies.* illa scilicet cutis aspretudo, levisque exulceratio pruriens, & interdum rodens. In hac pustulæ oriuntur modò humidiores, modò sicciore: his ruptis, ulcus fit. Id purgata sanie crustula tectum obdurescit. Eo autem gravius malum est, quò magis cutem asperat, quòque prurit magis, & quò plures occupat partes, & quò somnum magis aufert. Pravis ea radicibus, quæ talis est, nititur, magnoque negotio tollitur. Itaque hanc Græci *ἀργία*, id est, feram nominaverunt. Scabies omnis aliis quidem ex toto definit, aliis certo anni tempore revertitur. Ægerrimè autem in senibus fânescit, pessimaque esse in capite solet.

Hoc vitio gravior impetigo est, dura

R

ni:

Impeti-
go.

nimirum, aridaque cutis aspretudo, multâ molesta prurigine. Ea ferè vel manus occupat, vel pedes, habetque species numero quatuor. Ex his minimè mala est, quæ scabiem repræsentat, in qua asperata cutis rubet, subduraque est, & erodente pruritu laceffitur. Id communiter pruriginem vocant. Pejor est ea quæ asperior, rubicundior, & majores pustulas exhibet, estque ea impetigo, quæ Græcè *λειχήν* appellatur. Prorius autem hîc varia cutis figura est, & rosio major, multæque squamulæ decedunt, tum ipsum etiam malum latius vagatur, celerius serpit, certioribus temporibus & fit, & cessat. Tertia autem longè hac atrocior, pejorque est, quæ circum tempora oritur, aut certè ibi esse definit, neque unquam ex toto posse tolli videtur. Præcrassa cutis est, longèque durior, ac magis tumens, eademque siccitate dehiscens, passim finditur: magis etiam eroditur, squamulas subnigras remittit furfuribus similes: istud vitium Græci *Ψόρα* dicunt. Pessimum, atque insanabile quartum impetiginis genus est, quod Græcè *λίωρα* appellatur: id erosine latius procedit, totumque cum subjecto humore subalbidum est, ac speciem recentis ci-

Ψόρα.

catricis repræsentat: adhæc cutis fissâ ac vehementer dura est, ex qua cum squamulis (quas ea habet subalbas vel pallidas) sanguis fertur. Facile Lichen neglectus in pforam, & hæc in lepram vertitur. Ferè paulatim emacrescunt hi quos semel vel pfora, vel lepra contaminavit. Impetigo hoc à scabie distat, quod ficas pustulas habeat, omnis tum humoris, tum saniei expertes: contra scabies habeat.

Nunc de vitiligine dicam, in qua cutis alienis maculis, iisque non continuatis, at variè disjunctis vagantibusque scedatur. Sub hoc vitio sensus affectæ partis vel obtorpescit, vel totus amittitur. Est autem generum id duorum, Ἀλφὸς αλφὸς. Vitiligo. scilicet, & λεύκη. Sub priore summa tantum afficitur cutis, estque maculis quibusdam ceu umbrâ obscurata, fitque hoc modo Alphus vel albus vel niger: itaque novissimus hic Melas appellatur. Porro Leuce longè altius totam cutem, λεύκη. non tantum summamprehendit, magisque quàm Alphos albet. Pili è cutè excidunt, & vicissim nascuntur novi, tenues, albi & omnia lanugine similes. Alphos vix unquam, nisi cum inveteravit, cutem penetrat. Leuce non solum hanc,

sed ipsam etiam ad ossa usque afficit car-
nem: ille curationem non difficillimam
habet: adhæc vix unquam remediis tolli-
tur, aut si certè tollitur, semper eo lo-
co pravi relinquit coloris vestigium. In
Leuce cani pili sunt: in Albo naturales.
Ex hoc, ubi quis locum acu pupugit,
cruor fertur: ex illa, sanies aquosa dun-
taxat, utrumque autem vagatur, verum
in aliis citius, in aliis tardius. Experi-
mento discitur utrum sanabile quid ho-
rum sit, nec ne. Nam cutis inciditur,
aut intrōmissâ pungitur acu: tum si
cruor promanat (quod ferè in utroque
Albo fieri diximus) sperari curatio po-
test: si tenuis subalbaque sanies, non
potest. Æquè inanis omnis medicina
est, si id vitium inveteravit: si magnum
spatium multaque occupat corporis loca:
si altè intra carnem demersum est: si lo-
cus ex toto colorem amisit suum, ac
quidvis potius quam ruborem habet: si
denique aspero panno perfrieta cutis, co-
lorem non mutat. Omni vitiligini ma-
lus jungitur corporis habitus, quem qui
habet, is huic vitio magis opportunus
est.

Exanthematum quoque hoc loco pro-
ponenda observatio. Hæc ubi quidem
intus

intus immorantur, nondum tamen foràs emerferunt, talia fiunt. Totum corpus fit grave, & punctiōibus quibusdam afficitur: dolor vehemens in capite, aliquis etiam in pectore, in faucibus, & in dorso est: sicco ore crassum sputum vix extunditur: oculi intumescunt, pruriunt nares: raucescit vox, spiritus difficulter, crebrèque trahitur: totus vultus ardore, ruboreque quasi efflorescit: inter hæc multa somni cupiditas est, oriturque febris Synocho non usquequaque dissimilis. Ubi verò id vitium foris quoque sese in cute prodit, crescunt quæ modò dixi omnia, præcipuèque capitis dolor, & spirandi difficultas: ipseque pulsus æquè ut antè creber, velox ac vehemens manet. Ferè autem iucipiente eruptione, facies quibusdam maculis imbitur, quæ mox subeunte humore, vel aguntur in altum, vel in latum exporriguntur: illa, sublimia exanthemata: hæc, lata vocamus: priora exulcerant, & pruritus movent, quo certè lata carent. Id autem genus vitii, aut corrupti excrementi deiectione, aut copiosis sudoribus conquiescit. Vix quisquam hominum est, quin vel semel sic laboret ante legitimam ætatem. Magis autem expositi

exanthematis sunt infantes atque pueri: seniores rarissimè, & non nisi summo periculo ita ægrotant. Quanquam autem exanthemata in quælibet cadere anni tempora possunt, magis tamen Vere, & sub Autumni finem oriuntur, idque humidis magis, quam siccioribus corporibus. Tutiora autem sunt quæ citò emergunt, (aliis enim protinus id accidit, aliis tertio, vel quarto, & interdum quinto post infirmam valetudinem die) & quæ citò (si sublimia sunt) maturescunt, quæque rubra, magnæque sunt, minimèque sibi mutuò contigua: adhæc quæ febrem non vehementem movent, eamque egressa ipsa finiunt. Cæterùm mala sunt, quæ lentè prodeunt, magisque si violacea sunt, sub his enim frequens fit syncope. Commoda quoque non sunt, quæ vel lividi coloris, aut viridis, aut atrii sunt, quæque iteratis vicibus modò rursus occuluntur. Æquè mala sunt ea quibus ingens accedit febris, vehemensque spirandi difficultas, & inquietudo corporis, & multa sitis, & infirmæ naturæ vires. Hisce ita concurrentibus, magna ex parte ægri pereunt, magisque si lata exanthemata sunt. Certæ
mor-

mortis syncope est index, itemque urina sub imbecillo robore viridis. Perniciosum etiam est post cruentam urinam, nigram moxi coepisse. Nihil æquè attente observari, atque vox & respiratio debet. His enim integris, magna spes est; violatis, dubia. Quisquis huic malo succumbit, ferè tanquam ex angina præfocatus moritur, aut certè propter tormina, alvique profluvium labascente naturâ exanimatur. Exanthemata sæpè sine ullo vitæ periculo, sine pestis nota in populum aëris vitio grassantur: sæpè hæc ipsa pestem, malasque judicationes sanguineæ febris comitantur: rarò aliquis ex sublimibus moritur, multos lata tellunt.

Observationes in vitiis utiles, quæ non certam partem aliquam, sed variam occupant.

INflammatione, quæ Græcis φλεγμονή *Inflammatio.* dicitur, his sese notis prodit. Pars affecta tumet, prementi digito renititur, tenditur, calet, rubet, & pulsanti dolore urgetur: is morbus aut latente materiæ resolutione finitur, quod probandum est: interdum citra hæc malignus esse

esse incipit, quod pessimum est. Malâ etiam curatione, in durum, sensusque vertitur expertem tumorem, quod bonum non est.

Gan-
græna. Grandiorem inflammationem subinde gangræna, atque sphacelus consequuntur. In priore, pars emori incipit, tenditque ad innati caloris extinctionem: tum autem floridus inflammationis color perit, simulque dolor & pulsatio. In *Sydera-*
tio. sphacelo autem (qui Latinis Syderatio dicitur) pars sensum, motum, ipsamque vitam tota amisit, fitque prorsus nigra, mollis, putris, & malè olens, & cada-verosa. Hic casus (nisi corrupti membri amputatione maturè succurritur) præceps exitium affert.

Car-
buncu-
lus. Utilis quoque in eo vitio observatio est, quod Græcis *ἀρθραξ*, nobis Carbunculus appellatur. Locus primùm prurit, dein rubore picis, aut bituminis more splendescente efflorescit, & maximo dolore urgetur: tum protinus pustula vel una, vel multa oritur, flagrantissima, non nimium eminens, eaque nigra est, & interdum livida, vel pallida. Hac rupta ulcus cum crusta gignitur, qualis inuri ferro candente solet, eademque inflammatione cingitur, atque vi ardoris extorretur. Itaque cutis eo loco sic infest-

feriori carni adstricta, affixaque est, ut inde diduci ea, dividique non possit: quæ in proximo sunt partes, caloris, doloris-que incommodum consensu quodam omnes percipiunt: præter hæc, horrore subinde homo concutitur, ac febre perturbatur, cui multa accedit nausea, & somni cupiditas, & cordis tremor: ipse verò tumor nunquam suppurat, sed exidente tandem, corruptæ, propter exustionem carnis, particulâ cavum accipit, & sordidum ulcus. Id genus mali acutum, & ex toto mortiferum est, magisque si febrem excitavit, si non longè a præcipuis absistit visceribus, in axillis scilicet, & in inguinibus. Metus enim est facilè id intrò reversurum: quod ubi incidit, in certo vitæ periculo homo versatur, maximèque si plura etiam signa comitantur non bona. Sæpè etiam, cùm id vitium circa stomachum faucesve ortum est, subitò spiritum elidit. Minus lethalis Carbunculus ruber est, atque hinc pallidus. Niger ex toto pestilens ac perniciosus est. Grave autem pestilentiae tempus omnis penè carbunculus & antecedit, & comitatur, idemque tum penitus est exitialis. Qui verò aliàs oritur, is, etsi maximis quoque dolori-

bus terrere posse videatur, curationem tamen non difficillimam habet.

Ερύσι-
πτελας,

Ερυσιπέλας quoque proponenda animadversio, tum simplicis, tum ejus quod exulceratum est. Utrique commune est, horrorem ferè, ubi incipit, & febrem movere, semperque minus inflammatio-
ne, tum dolere, tum intumescere, per-
que corporis summa latè diffundi, colo-
ris esse ex rubro flavescentis eoque colo-
re ubi digito urgetur privari, iterumque
ubi laxatur imbui, ad hæc pulsationem
non habere, multòque minus tensionem,
itemque ex una sede in aliam serpendo
migrare, & locum quem obsidet, mor-
dere atque urere Simplex Erysipelas
ardorem ceu quandam deflagrationem &
ruborem sine ulcere exhibet. Hippo-
crates Aphorismorum libro, *επιρλόγισμα*,
nostri similitudine coloris ducti, Rosam
vocant. Quod vitium is author per an-
ginam pestiferum esse scripsit, si post-
quam semel exortum in pectore est, su-
bitò rursus intrò revertit. Cæterum u-
bi exulceratum est Erysipelas quod pro-
priè sacer ignis appellatur, cutis aliàs
summa afficitur, in eaque crustulæ tan-
quam furturacæ oriuntur, aliàs tota ul-
cus sustinet, ruptisque pustulis saniem
pu-

Ignis
sacer.

purulentam reddit. Erysipelas sæpissime in facie versatur, eamque subinde serpendo, totam occupat, multumque tum intumescit, tum expanditur, ac, nisi remediis succurritur, rapere etiam hominem strangulatu potest. Prævum quoque esse solet, quod propter contractum, aut nudatum os natum est. Semper autem utile est ab interiore parte ad externam Erysipelas verti: pestiferum ab hac ad illam demigrare. Ab eodem vitio putredo aut suppuratio inimica sunt, id quod nunquam propè accidere simplici Erysipelati solet, ut quod magis perspiratione cuticulari latenter dissipatur.

Nunc propter causæ affinitatem de *Papulis* dicam, quas herpetis appellatio-
ne significari video. Earum duo genera sunt, alterum simplex, & mitius: alterum exedens ac ferum, quod ideò Græci *ἀγριον* dicunt. Simplex minimis pustulis summam cutem exasperat, leviterque rodit, & rubore suffundit, & pruritu sollicitat, in orbemque ferè procedit, ac plerumque sanescente medio extrema longius vagantur. Id vitium, quoniam pustulas exhibet milio similes, Græcè ὁ τῆς ἀερχρίας ἔρπος appellatur. U-
bi

bi verò ferè papulæ sunt quas Græci *εσθιομένας*, id est, exedentes vocant, similiter quidem, verùm magis cutis, non summa, sed tota exulceratur: magisque, & roditur, & rubescit: ex pustulis ruptis ulcuscula sunt arida sine sanie, sine pure. Ut hic quoque nomine id vitium ab igne sacro, cui alioqui omnia propè simile est, differat. Nam huic magnæ sunt pustulæ, exulceratæ, humidæ, è quibus pus saniosum. Papula omnis minimè omnium ulcerum, quæ depascendo serpunt, periculosa est. Verùm curationem difficilem & longam habet, maximè ea quæ minus rotunda est. Talis enim in impetiginem, si sublata est, transit.

Laxus
sine sen-
su tu-
mor.

Οιδίμα, tumor laxus & mollis, & albus est, sine dolore, sine calore, idemque digito pressus fossulam quandam reddit. Frequens id vitium pedibus, interdum & toti corpori eorum est, quos aqua inter cutem, aut tabes, aut malus habitus consumsit. Idem sæpissimè resolutum conquiescit, nec rarò in nodos quosdam & excrecentia tubera degenerat. Promptius per hyemem crapulosis & senibus accidit.

Durus

At verò *ὀσσειός* prædurus ac renitens

tu-

tumor est , ac sensus (si quidem exquisi-^{sine}
tus est) expers, colore inter rubrum ni-^{sensu}
grumque medio. Idem initio exiguus,
paulatim ad grandio rem mole m insurgit.
Sæpè eo vitio jecur, læpius lien tenta-
tur, non sine certo metu gravissimorum
ac lethalium morborum. Interdum aliis
etiam partibus accidit, quum perperam
curata in ipsis inflammatio, vel Erysipe-
las fuit. Recens scirrhus, si premitur
doloris exhibet sensum aliquem, & lo-
cum medicinæ præbet. Consummatus
sensu penitus caret, neque tolli remediis
potest. Scirrhus aliis resolvitur, aliis
perpetuò durus manet, quibusdam etiam
in cancerum vertitur.

Finitimæ huic vitio sunt strumæ,
Græcis *χολησδες* appellatæ, duri scilicet *Struma*
glandularum tumores, maximèque in
collo, in quo longa serie disponuntur:
unde interdum ad alas perveniunt, item-
que in pectus, & in mammas foemina-
rum: inguinibus etiam quorundam infe-
stæ esse solent. Hoc ipsum vitium in-
terdum mitius est, tumque tumorem ex-
hibet æqualem, rotundum, circumscri-
ptum, non maxime durum, inflamma-
tione doloreque carentem, omnia scirrho
similem. Porro ubi vetus id graveque
factum

factum est, malignum ulcus & serpens, & erodens accipit; unde ipse quo comprehenditur ab eo locus locaque proxima exeduntur. Idem interdum malignitate adeò efferatur, ut haud multum à Cancris absit natura: tum febris etiam movetur, tumorque est inæqualis, in quo pulsantes dolores insunt, ipsæque venæ eminent. Idem manuum contrectatione fit peior & per omnem vitam, quoniam non maturescit, durat: ac sive ferro, si ve medicamentis hæ strumæ curantur, ferè juxta cicatrices resurgunt. Strumæ omnes magno negotio tolluntur, acciduntque maximè (quibus etiam minus noxiæ sunt) pueris, præcipuè si breve his collum, & pressa tempora, & largæ maxillæ sunt. Adultioribus, magis que ad senilem ætatem provectis, raræ quidem, at difficillimæ omnes sunt strumæ. Deteriores etiam esse volunt, quæ dolore carent.

Cancer. Periculorum, & propter longam durationem plenum tædiorum Cancris vitium est, Græci καρκίνον vocant. Tumor est durus, rotundus, inæqualis, aspectu teter magis, quàm inflammatio nigricans, at non juxta fervidus. Idem latè circum circa dolet, qui quidem esse

se mollis intuentibus videtur, verum tactui occurrit durissimus. Circa eum venæ interdum plenæ, vel pallidæ, vel lividæ tenduntur, & quasi incurvantur: sic ut animantis cancri diductos pedes similitudine quadam repræsentet. Ubi id malum incipit, formâ ciceris exiguum est, durum, rotundum, obscuri coloris, idque aliàs aliquo cum dolore & calore, alias sine his: atque interposito spatio crescens, magnitudine fabam & hinc nucem juglandem, aut quid his majus æquat. Idem tumor modò sine ulcere, modò cum eo est. Ubi id est, suprâ hæc quæ proposui, pars assiduè exeditur, ejusque profundum rosione suffoditur, corruptæ carnis exhibens formam, exitque sanies pestilentissima, tenuis, nigra vel fulva, copiâ, & odore abominabilis: ulcus ipsum inæquale, labiis cum tumore præduris & inversis, concretâque humorum illuvie teterrium est: lenta febris assiduè tenet, crebròque anima deficit: maximè si vitium non procul à corde est: interdum multus sanguis ex ulcere propter exesam venam fertur, semperque malum crescendo, donec occidat, serpit. Scire autem licet, ut omnibus

cor;

corporis partibus inesse hoc vitium posse, ita sæpius foeminarum accidere mammis consuesse, itemque ori, oculis, vulvæ, peni vel ano, magisque si menstrua diu suppressa sunt, vel si diuturnæ curatæ fuerunt hæmorrhoides, aut longa quartana febris afflixit. Ubi recens cancer est, neque adhucdum aliquo in membro vetustate penitus infedit, curationis aliquam viam præbet. Quum verò is inveteravit, aut penitus etiam inhærescit, nullâ medicinâ vincitur, magisque si simul etiam ulcus accessit. Sed & curationibus magis laceffitur, quàm juvatur: nam si ferro quis aduffit, multò magis id tum concitatur efferturque, & exitii causam certi præbet. Tum etiam etsi scalpello excisum est, tamen post inductam cicatricem revertit, crescitque donec vitam adimat.

Vulnus. Proxima nunc est vulnerum atque ulcerum observatio. Tutissimum vulnus est, quod lineæ modo rectum, & in carne, & tantum discissione illatum, non etiam collisione est: præstat enim acuto telo percussum aliquem, quàm retuso esse. Malum autem vulnus est, ex quo aliquid excisum est, aut alia parte

te abscissum, aliâ dependet. Omniumque pessimum rotundum est. Lethale est quod cor accepit, vel cerebrum, vel ventriculus, vel jecinoris portæ, vel spinæ medulla, vel pulmo medius, vel tenuium aliquod intestinorum, vel circa fauces magnæ, tum venæ, tum arteriæ. Æquè certum periculum, at non æquè præceps affert, quod membranas, quibus cerebrum continetur, violavit, aut jecinoris crassum, aut renes, aut lienem, aut vulvam, aut vesicam, aut septum transversum. Anceps etiam casus, & metu plenus est, in alis, & in poplitibus grandes venas intusque conditas ictas esse, itemque eas quæ ad anum, & ad testiculos perveniunt: tum enim periculum omne in nimia vertitur sanguinis profusione. Non tutò etiam loca inania, & articuli, & quæ pars inter digitos est, itemque alæ, & fæmen, & caput musculorum, vel nervus, arteria, membrana, os, & cartilago vulnerantur. Periculo quoque subjacet quodcunque magnum est. Porro ex omni vulnere facilius sanescit puer, vel adolescens, quàm senior: firmus homo, quàm impotens: quadratus, quàm nimis vel gracilis, vel plenus: tempe-

S

rans,

rans, quàm vino, Venerique deditus. Vulnus citissimè sanescit Vere, tardius Æstate, atque Hyeme, tardissimè Autumno. A vulnere distentio nervorum lethalis est. Malum etiam esse vulnerratis compressam alvum Hippocrates judicavit.

Ulcus:

Quædam etiam in genere dici de ulceribus possunt. Neque enim simplicia ea esse semper, sed & tumorem interdum collisionemque habere constat: eademque aliàs nimia carne, quæ super increvit, onerantur: aliàs varicibus implentur: nonnunquam duris labris ac decoloribus cinguntur. Non rarò etiam ubi facta cicatrix fuit, interposito tempore rursus inflammatione lacescunt, ac disrumpuntur: maximèque iis casibus, ubi os subtus corruptum est, incidit, id quod hic sciri licet, quoniam os primum pingue fit, dein nigrum, vel cariosum. Jam etiam malignum esse ulcus (κακοῦδες Græci dicunt) atque ægrè admittere cicatricem solet, quod δυσπεύλαστον vocant. Id magis fieri per pravum corporis habitum, aut per jejcinoris lienisque affectiones compertum est: ac tum ferè vel callosa labia sunt, vel varices juxtà inhærescunt, ipseque

foedi homo coloris est. Fit quoque exedens subinde ulcus, quod sanas etiam carnes in vicino positas, non tantum corruptas, atterit, depascitque, Græcis *ρωμῶδες* appellatur. Id verò oriri maximè post ea consuevit vulnera, quæ medici imprudentiâ, mordacibus agitata medicamentis sunt: aut certè post ignem sacrum, postque eas pustulas, quas acer bilis multo pruritu excitavit. Hujus ipsius generis *ἢ φαρδαίνω* est, quæ *φαρδαίνω.* latè vagando, cutem & primam tantum carnem exedit: ulcus etiam interdum est cavernosum, cujus osculum angustum est, fundum altè intrò descendit; ac latè sese in varios sinus tanquam in cuniculos diffundit, id modò intus durum callosumque est, modò non est. Ubi est, fistulæ nomen accipit, cujus *Fistulæ.* multa haberi observatio potest: siquidem alia curatu facilis, alia difficilis, & quædam penitus incurabilis est. Expedita medicina est, cum id vitium simplex atque recens intra carnem consistit, magisque si juvenis aliquis ac firmo corpore est. Difficilis esse fistula judicatur, quæ os, vel cartilaginem, vel nervum læsit: itemque ea quæ articulum violavit, vel ad vesicam, ad pulmonem, ad

vulvam, ad grandes venas & arterias; vel ad inania loca, ut ad guttur, stomachum, pectus, aut intestina penetravit. Sub his enim casibus, modò periculum anceps, modò certa pernicies est: idque multò magis, si senex homo, si ægrum corpus, aut mali habitus est. Ex eodem autem ulcere si plus materiæ fertur quàm quod simplici spatio convenit, scire licet, plures intus sinus esse: atque hinc, si sola erosa caro est, pus leve, album, & majore copiâ fertur: si locus nervosus, ejusdem quidem pus coloris est, verùm tenuius, & minus. Ab ipso nervo quod promanat, pingue, & oleo simile est, ad quod etiam dolores accedunt: si vena affecta est, cruor subinde puri miscetur: si os, tenuis inde liquor fertur. Ferè autem, ut quodvis ulcus, ita etiam id quod altum, angustum, atque callosum est, si diutius anno duravit, os afficit. Id autem cognoscitur, si, quod ultimo specillo exploratur, renititur, sic, ut non elabatur id ipsum, verùm æquali in loco fisti videatur: tum enim levis caries est. Si verò inæquale, atque asperum subest, vehementius os erosum est. Fistula omnis difficillimè sanescit, præcipuè quæ

inveteravit, quæque profundè inhære-
scit, & multos sinus habet. Quodcun-
que ulcus inducta cicatrice semel cura-
tum, paulò post iterum rumpitur, id
ad fistulam inclinat. Cæterùm ulcus
adeò interdum fit malignum, atque vi-
rulentum, ut partem putrefactione cor-
rumpat. Id sanè viscidum quid, aut
carnem intus mollem habet, aut malè
olenti oblitum crustâ est, ex quo teter
vapor fertur, qualis è cadaveribus cor-
ruptisve carnibus spirat. Tale verò ulcus
eripere etiam homini vitam potest, &
cùm ulterius efferatur, in exedentem
sphacelum verti. Porro scire licet ma-
lum ulcus esse, quod diu durat, quod-
que morbis succedit, itemque quod in
ambitu glabrum est. Pilos autem, qui
semel defuerunt, iterum innasci saluta-
re est. Inimica etiam judicatur à for-
ti in ulceribus pulsu, sanguinis profu-
sio. Si tumores supra ulcera subitò oc-
cultantur, idque in parte acciderit cor-
poris anteriore, prorsus vel lateris acu-
tus dolor, vel insania timenda est. Quod
si id à tergo factum fuit, periculum è
nervorum distentione, vel rigore est:
optatissimumque inter hæc est, citam
alvum fuisse. Malum etiam signum est,

multam exulceratis vigiliam esse, & spiritum difficilem, & sitim, & cibi fastidium, & febrem: itemque pus habere nigrum, aut faculentum, & foetidum. Animam autem deficere, pessimum omnium est.

Sanguis.
Sanies.

Proximum est quædam de sanguine, sanie, atque pure communia vulneribus ulceribusque dicere. Sanguis per se notus est. Sanies non solum hoc tenuior, verum etiam omnium quæ defluunt tenuissima, minimè glutinosa, subalbida, aut subrubicunda. Græcis *ἰχθρ* dicitur. Quod hoc crassius, & magis glutinosum est, id nostri quidem virus, & ab eo ulcus virulentum, Græci autem (quoniam albo propè melli simile est) *μυ-*

Pus.

λεηρὸν appellant. Cæterum pus omnibus his crassius est, & albidius: nequaquam tamen sic glutinosum ut sordes, quæ veluti concreta adhærescit ulceri, unde lordidum esse ulcus dicitur. Sanguis optimus est calidus, rubens, modicè crassus, non tenax. Malus est, nimium tenuis, aut crassus, lividus, niger, aut pituitâ imbutus, aut varius. Sanies inutilis est multa, nimium tenuis, livida, pallida, nigra, glutinosa, foetens, calida, erodens: utilior non

Sordes.

mul.

multa , modicè crassa , subrubicunda , aut subalbida. Meliceria improbatur multa & præcrassa : huic contraria , tolerabilior est. Pus inter hæc est optimum , meliusque habetur quo minus est , & quo crassius & albidius. Idemque probatur quod leve & æquale , & coloris unius est , & nihil olet : quodque modo & magnitudini vulneris , ut temporis convenit. Siquidem plus ejus ex majore vulnere , & nondum solutis inflammationibus fertur. At verò malum pus esse sciendum est , quod tenue atque dilutum feri colorem refert : magisque si protinus ab initio tale est : æquè ut si pallidum id aliàs , vel lividum , vel fæculentum , vel foetidum est. Illud quoque observari posse videtur , cruorem ex vulnere ferri , vel recente , vel jam fanescente : pus verò ex eo ulcere , quod ad sanitatem inclinat , sanienem ex incipiente , atque crudo : virus ex maligno.

Novissimè venæ proponatur , aut arteriæ dilatatio , quæ in hac *ἀνέυρισμα* , in *Ανέυρισμα* illa nobis varix , Græcis *κίρως* appellatur. *κίρως* Utrunque sanguine multo vasa implentur : sed in vena crasso , in arteria spirituofo. Hîc magna , turgida ,

da, sæpèque molesta inest pulsatio: illic nihil horum: utrinque pars sine dolore tumet, pressaque cedit, reditque. Varici magis crura quàm cæteræ partes patent, maximèque in fœminis, quæ utero gerunt: & in his quibus soluta quartana, aut curata longa hæmorrhœis est. Aneurisma modò in externis est membris, circa jugulum atque pectus: itemque in manibus & pedibus: modo intus quoque inhærescit, præcipuè sub pectore juxta lienem & mesenterium.

MEDICINALIUM

OBSERVATIONUM

LIBER III.

QUO HI EVENTUS EAQUE PRO-
ponuntur judicia, quæ tam de universali-
bus haberi morbis possunt, quàm de par-
ticularibus.

QUUM superioribus Libris morbos
proposuerim, qui vel totis corpo-
ribus insunt, vel solam particulam oc-
cupant; proximum nunc esse videatur,
in genere quædam de utrisque dicere. Ne-
que enim parvi referre arbitror, quæ cu-
jusque morbi vis, aut acumen, aut duratio,
aut eventus sit, observare: æquè profe-
ctò, ut in quem alium aliquis verti mor-
bus possit, quibus ætatibus magis accide-
re, quibus temporibus anni, quibus cœli
tempestatibus, quibus locis. Nec inu-
tile quoque videatur, ipsius ægri men-
tem, mores, orationem, insomnia, vul-
tum, præcordia, spiritum, pulsum, ap-

petentiam, victum, gestum, decubitus, ipsum denique habitum, omniaque corpore exeuntia in morbis omnibus intueri, & ex his observationes utiles petere. Quæ quidem singula, quoad possum, novissimo hoc libro proponam.

*Morbi
acuti
& le-
thales.*

Ergo acuti esse morbi, & perniciem afferre magna ex parte laborantibus solent, febris pestilentialis, morbus attonitus, cerebri inflammatio, quam Græci *φρενίτιν* dicunt, itemque vesicæ inflammatio, & nervorum rigor, quem

*Acuti
morbi
& an-
cipites.*

τέτανον vocant. Acuti quoque morbi, at commemoratis minus sunt, minus etiam perniciosi, verum sic ancipites ut modo occidant, modo sanescant, febris ardens, lethargus, uva, angina, inflammatio laryngis, vel pulmonis, itemque ventriculi, jecinoris, lienis, renum, uteri. Cæterum is morbus, quem *χόλερæ* dicunt, æquè ut hi quidem anceps, at longè tamen acutior est.

*Morbi
breves
& salu-
tares.
Longi
morbi
& salu-
tares.*

Breves morbi simulque salutares sunt, febris diaria: & tertiana intermittens exquisita. Longi autem, & sine periculo sunt (nisi quid ipsis tamen accesserit) febris quartana, gravedo, resolutio nervorum, morbus articularis, sive totum is occupat corpus, sive partem: adhæc, scabies, impetigo, cæte-

ra-

raque penè omnia cutis vitia. Longi & ^{Longi morbi} ancipites sunt, morbus comitialis, melancholia, destillationes omnes excepta ^{& ancipites.} gravedine: adhæc abscessus in pectore, coli dolor, alvi profluvium, tormina, tenesmus, lævitas intestinorum, hydrops subdurus in jecinore, liene, & in renibus tumor, ulcus & calculus renum, & vesicæ: itemque hæmorrhoides, & ^{Longi morbi} foeminarum fluor: ipsa demum Elephantia, & Venereus morbus. At verò ut ^{& lethales.} longi morbi, sic etiam pestiferi esse solent, febris hectica obfirmata, ulcus pulmonis, itemque substantiæ tum in hoc, tum in jecinore corruptio: tabes, marcor, cancer tum exulceratus, tum occultus, & qui febrem acutam, aut durum jecur lienemve secutus hydrops est, quæque intestinorum lævitas torminibus accessit. Longus morbus, cum penitus insedit, æquè ut acutus difficilis est: & acutus quidem, quò vetustior, longus autem, quò recentior, eò facilius curatur.

Morbi autem transire alii in alios interdum solent, idque priore aliàs cessante, aliàs manente. Itaque diaria febris in hecticam transire, & in putridam potest. <sup>Transi-
tiones
morbo-
rum a-
liorum
in alios.</sup>

test. Erratica autem , & ex variis nata humoribus , sæpè in quartanam : atque hæc interdum in quotidianam vertitur : itemque quævis alia febris in morbum articulare , vel resolutionem nervorum , vel in abcessum. Febris verò ardens , & lateris inflammatio , & angina , transire in inflammationem pulmonis possunt : atque hæc rursus ad insaniam. Morbumque quoque comitalem melancholia , atque hæc illum interdum excipit. Sæpè etiam lateris inflammatio , atque pulmonis , in pectoris abit suppurationem : itemque hæc in tabem , atque in alvi fluxionem. Adhæc post longas destillationes , tabes : post sanguinis sputum , puris sputum , & post hæc tabes. Post morbum attonitum nervorum resolutio , itemque post coli dolorem : post hunc etiam , morbus articularis , vel comitialis , vel volvulus , vel hydrops. A lienis vitiis , & à sinceris dejectionibus tormina : ab his lævitas intestinorum , post quam hydrops , idem etiam post durum jecur atque lienem hydrops , & post auriginem , & post malum corporis habitum , siquidem hic à pituita crudus est : à melancholia autem natus magis in elephantiam vertitur. Post

tor-

tormina, tenesmus, & vicissim post tenesmum, si bilis subest, tormina: vel si magis pituita, coli dolor, aut volvulus. Post longum coxæ dolorem, claudicatio, itemque hydrops. Post fluorem etiam uterinum & profusas hæmorrhoides, aut undecunque immodicè promanantem sanguinem, hydrops: post cæcas hæmorroides, ani inflammatio: post grandissimam inflammationem, gangræna, atque sphacelus: post impetiginem, lepra, quam Græci sic nominant. Porro qui morbus ex alio nascitur, is ferè occidit: à priore enim fatigata natura secundum sustinere vix posse videatur. Est tamen huiusmodi transitio iuterdu[m] tuta. Nam pro valetudine est, pulmonis inflammationem verti in abscessum ponè aures, qui suppuret: aut certè in partibus inferioribus, qui ad fistulam perveniat. Febrem quoque continuam, quæ vicesimum jam diem excessit, rectè abscessus ad articulos natus excipit. Tuta etiam est post acutam febrem aurigo, si quidem molle præcordium & elapsus septimus dies est. Adhæc non incommoda febris post nervorum est solutionem, itemque post horum distentionem, nisi ea, siccitatem inanitionemque secuta est.

At-

*Qui morbi commo-
dum a-
liis suc-
cedant.*

Attonitum autem morbum, & coli dolorem, tutò nervorum excipit resolutio: lippitudinem, alvi profluvium: tormina, tenesmus: insaniam, varix vel hæmorrhoids, vel tormina singultum, sternutatio: longas dejectiones, vomitio: surditatem, biliosa alvus: sanguinis in foemina vomitum, profusi menses: lienis tumorem, tormina: dolorem præcordiorum, qui sine inflammatione fit, itemque volvulum ex urinæ natum difficultate, febris. Ac sub his quidem casibus ferè priorem morbum alter superveniens depellit. Jam verò à viliori parte morbum ad nobiliorem verti, adeoque ab summo corpore ad viscera, vitæque penetralia transire, periculosum est, æquè profectò, ut cum ex calido morbo alius fit frigidus: veluti si post acutam febrem hydrops oritur, aut post jecinoris inflammationem prædurus in eo sine sensu tumor.

*Morbi
difficiles,
itemque
faciles.*

Qui morbi sub bonis signis non levantur, & sub malis remittunt, difficiles esse consueverunt. Semper verò benigniores sunt hi, quorum principia affecti spiritus dedere: pejores ex atra bile nascuntur: ex aliis humoribus ancipites.

Præsa-

Haud rarò semel curatus morbus re-

ver-

vertit. Id verò hinc scire licet: quoniam depulso morbo, homo imbecillus manet: aut certè assumptum cibum non sentit: quoniam neque appetit, neque concoquit, sed multâ nausea afficitur, & ructu vel nidoroso, vel acido. Æquè certum recidivæ præsagium est, si inter hæc ista spiritus malè olet, si vehemens fitis est, & multa vigilia: si præcordia, quæque juxta sunt loca, tument: si denique facies inflata est, maximè ad palpebram superiorem. Quæ omnia eò certius reversuram ægritudinem denuntiant, quò evidentiora iis temporibus sunt, quibus esse vehementior morbus solet. Sed & ægritudinis genus aliquid ad prædicendam recidivam facit. Facilè namque hæ febres repetunt, quibus adfuit inflammatio, tum cum hæ quidem finirentur, calorem tamen æstumque in visceribus aliquem reliquerint. Ejusdem ordinis sunt morbus comitialis, caligo, hemicrania, pertinax capitis dolor, destillatio, anhelatio quam *ἄσθμα* vocant, dolores renum, dolor colicus, morbus articularis & hujusmodi. Autumnus recidivæ opportunissimus est. Quælibet morbi reversio tutior est, si malam victus rationem tantummodò secuta est, non
etiam

*gia re-
cidivæ.*

*Primæ
ætatis
morbi.*

etiam relictum à priore morbo vitium;
Quò quid citiùs revertitur, & quò vi-
res simul infirmiores sunt, eò pejus est.
Quicumque morbus subito sine ratione,
sine bonis signis finitus est, ferè redit.
Porro certis quibusdam ætatibus, & an-
ni temporibus, & cæli tempestatibus,
& locis, certi etiam morbi magis esse
familiares solent: quod cum aliis de cau-
sis, tum idcò quoque observatur: ut sci-
re liceat, minore in periculo versari æ-
grum, cujus naturæ, vel ætati, vel
consuetudini, itemque anni temporibus
morbus consentit. Ergo infantes, te-
nerosque etiamnum pueros vomitus ex-
ercent, tussis, vigiliæ, pavores, au-
rium humores, fervida oris ulcera, um-
bilici inflammationes, & cùm illi denti-
re incipiunt, gingivarum pruritus, ner-
vorum distentiones, alvi profluvia, fe-
bres. Quæ omnia eò sunt graviora,
quò plenius corpusculum est, atque al-
vus magis impedita ac pigra. Ubi pau-
lùm annis processum est, sic tamen ut
nondum perventum ad puberem ætatem
sit, tonsillæ fiunt, & vertebrarum spi-
næ luxationes, anhelationes; itemque
lumbrici, urinæ stillicidia, calculi vesi-
cæ, strumæ, verrucæ, pluraque alia
tu-

tubercula. Ut primùm pubertas venit, *Pube-
rum
morbi.*
quæ comprehensa sunt, incidunt, &
febres longiùs trahunt, & sanguis è na-
ribus fertur. Adolescentia morbis est *Adole-
scen-
tum
morbi.*
exposita acutioribus, itemque comitia-
libus, & præcipue sanguinis sputo, &
post hoc tabi. Juvenibus autem lethar-*Juve-
num
morbi.*
gus accidit, & lateris pulmonisque in-
flammatiō, & anhelationes, & insania
quam *φρενίτην* dicunt, & ardentes fe-
bres: adhæc longa alvi profluvia, chole-
ræ morbus, tormina, lævitas intestino-
rum, hæmorrhoides. Cæterum senes *Senum
morbi.*
exercent spirandi difficultas, frequens
cum tussi destillatio, vertigo, morbus
attonitus, nocturna vigilia, aurium,
oculorum, & narium madores, & visus,
auditusque hebetudo. Accedunt renum
dolores, urinæ tum difficultas, tum stil-
licidum, præcipuèque lævitas intesti-
norum, tormina, cæteraque hujusmo-
di citæ alvi incommoda. Sæpiùs etiam
incidunt dolores articulares, totiusque
corporis pruritus, ac malus habitus.
Magna autem ex parte minùs juvenibus
ægrotant senes: verùm semel diuturnis
correpti malis, ferè opprimuntur.

Longis morbis senectus, acutis ado-
lescentia magis patet, ætas mediā tutis-
T
sima

Quando
pueris
morbi
finiun-
tur.

Qui
morbi
gracili-
bus, qui
obesis
magis
fami-
liares.

Morbi
verna-
les.

lima est. Pueris maximè judicantur mor-
bi vel quadraginta diebus, vel septem
mensibus, vel totidem annis, interdum
etiam ad puberem ætatem trahunt. Post
hanc autem ipsam qui manent, ac neque
prima Venere, neque primis menstruis
finiuntur, longi esse solent. Porro o-
mnis ætatis hominibus, gracilibus magis
accidunt tabes, dejectiones, destilla-
tiones, laterumque & viscerum dolo-
res, obesis spirandi difficultas, & præ-
focatio, cujus occasione interdum lubi-
ta irruit mors: quem casum vix accide-
re gracilibus posse hominibus constat.
Tenue verò corpus, imbecillum: obe-
sum, hebes est.

Jam autem quod ad anni pertinet tempo-
ra, scire licet, etsi omnes morbi omnibus
fieri temporibus possunt. Verè tamen eos
magis incidere consueisse, qui humoris mo-
tu novantur: destillationes intelligo, tussis,
sanguinis profusiones, pustulas, abscessus,
omnia denique nervorum & articulorum
vitia, quæ modò accedere solent, modò
rursus conquiescere. Junguntur his lip-
pitudines, insania, tum ea quam *φρενίτιν*
dicunt, tum quam *μελαγχολίαν*: mor-
bos item comitiales, angina, impetigo,
lepra, & hujusmodi. Ver (quantum in
fe

se est) inter cætera anni tempora saluberrimum est, minimèque exitiosis morbis opportunum. Multa ex his in Æ. *Morbi æstivi.* statem incidunt: verùm habet etiam id tempus febres continuas, & ardentes, & tertianas multas, itemque lippitudines, vomitus, alvi fluxiones, aurium dolores, ulcera oris, naturalium putredines, & quicquid sudore hominem resolvit: quod novissimum quidem eò magis fuerit per febres proclive, quo Æstas Veri fuerit similior. Periculosior autem Æstas Hyeme, Autumno tutior est. Idem *Morbi autumnales.* Autumnus vix ullo horum vacat morborum: sed febres etiam adjicit incertas, & quartanas: itemque morbos comitiales, insaniam, melancholiam, spirandi difficultatem, lienis tumores, hydropem, tabem, urinæ difficultatem, vulvum, tormina, lævitatem intestinorum, & coxæ dolores. Autumnus plenus est periculorum, neque ullum æquè tempus morbis exitiosis & pestilentiae patet. Ferè autem diutinis morbis fractos tollit, aliosque homines novis incommodis, iisque longissimis, ac potissimum quartanæ implicat. Idem *Morbi hyemales.* tabidis longè inimicissimus est. Hyeme capitis fiunt dolores, vertigines,

*Quando
pueris
morbi
finiun-
tur.*

lima est. Pueris maximè judicantur morbi vel quadraginta diebus, vel septem mensibus, vel totidem annis, interdum etiam ad puberem ætatem trahunt. Post hanc autem ipsam qui manent, ac neque prima Venere, neque primis menstruis finiuntur, longi esse solent. Porro omnis ætatis hominibus, gracilibus magis accidunt tabes, dejectiones, destillationes, laterumque & viscerum dolores, obesis spirandi difficultas, & præfocatio, cujus occasione interdum lubita irruit mors: quem casum vix accidere gracilibus posse hominibus constat. Tenue verò corpus, imbecillum: obesum, hebes est.

*Qui
morbi
gracili-
bus, qui
obesis
magis
fami-
liares.*

*Morbi
verna-
les.*

Jam autem quod ad anni pertinet tempora, scire licet, etsi omnes morbi omnibus fieri temporibus possunt. Verè tamen eos magis incidere consueisse, qui humoris motu novantur: destillationes intelligo, tussis, sanguinis profusiones, pustulas, abscessus, omnia denique nervorum & articulorum vitia, quæ modò accedere solent, modò rursus conquiescere. Junguntur his lipitudoines, insania, tum ea quam φρενίτις dicunt, tum quam μελαγχολίαν: morbos item comitiales, angina, impetigo, lepra, & hujusmodi. Ver (quantum in se

se est) inter cætera anni tempora saluberrimum est , minimèque exitiosis morbis opportunum. Multa ex his in Æ. *Morbi æstivi.* statem incidunt : verùm habet etiam id tempus febres continuas , & ardentes , & tertianas multas , itemque lippitudines , vomitus , alvi fluxiones , aurium dolores , ulcera oris , naturalium putredines , & quicquid sudore hominem resolvit : quod novissimum quidem eò magis fuerit per febres proclive , quo Æstas Veri fuerit similior. Periculosior autem Æstas Hyeme, Autumno tutior est. Idem *Morbi autumnales.* Autumnus vix ullo horum vacat morborum : sed febres etiam adjicit incertas , & quartanas : itemque morbos comitiales , insaniam , melancholiam , spirandi difficultatem , lienis tumores , hydro-
pem , tabem , urinæ difficultatem , volvulum , tormina , lævitatem intestinorum , & coxæ dolores. Autumnus plenus est periculorum , neque ullum æquè tempus morbis exitiosis & pestilentiae patet. Ferè autem diutinis morbis fractos tollit , aliosque homines novis incommodis , iisque longissimis , ac potissimùm quartanæ implicat. Idem *Morbi hyemales.* tabidis longè inimicissimus est. Hyeme capitis fiunt dolores , vertigines ,

morbi attoniti , lethargi , gravedines ,
 raucitates , tusses , & si qui in faucibus ,
 in lateribus , & in imis visceribus con-
 tracti morbi sunt , eos exasperat. Idem
 tempus salubritate à Vere superatur : Æ-
 state autem , multoque magis Autumno
 tutius est. Illud in genere novisse licet ,
 constantibus temporibus , & naturam
 servantibus suam , constantes etiam mor-
 bos & judicii non difficilis nasci ; incer-
 tos autem esse , ac difficulter judicari
 inæqualibus temporibus. Tum etiam ,
 si talis pergat esse annus , qualem semel
 adeptus constitutionem est , scire licet
 similes penè morbos semper expectari
 oportere. Meminisse autem convenit
 pueros , & his ætate proximos , ipso
 Vere , primaque Æstate , melioris esse
 valetudinis : Senes , ipsa Æstate ad ali-
 quam usque Autumni partem : reliquo
 Autumno , itemque proximâ Hyeme ,
 eos qui in mediis sunt ætatibus.

*Præsa-
 gia
 morbo-
 rum
 sumta
 ex cæli
 variis
 tempe-
 statibus.*

Varios etiam præſagire morbos , prout
 variè à sua natura anni tempora defi-
 ciunt , licet. Nam si Hyems sicca ,
 Septentrionalibus ventis perflatur , Ver
 autem pluvium cum Austris successit ,
 prædicere licet febres acutas Æstate fu-
 turas esse , & lippitudines , & tormina ,
 in

in fœminis potissimum, atque in his viris quorum humidior natura est. Si verò clementior Hyems Austros exhibuit, atque pluvias, Ver autem siccum cum Aquilonibus fuit; prægnautes, quibus Vere partus fiet, abortu periclitantur: & si quæ in tempore pariunt, imbecillum id quod excluditur erit morbosum, ac minimè vivax. Aliis hominibus lippitudines instabunt aridæ, & tormina, & si seniores sunt, destillationes, quæ subinde occidant. Jam verò cum sicca & Aquilonaris Æstas, Autumnus pluvius, atque Austrinus est, tum quæ proxima est Hyems, capitis inferet dolores, tussis, destillationes, raucitates, & ipsam in nonnullis tabem. Quod si antecedente sicca & Aquilonari Æstate, ipse quoque siccus Autumnus Aquilonibus perstringitur; non inutile quidem hujusmodi tempus ad commodam valetudinem humidioribus fuerit corporibus, maximèque fœminarum: verum siccae lippitudinis, & febres tum acutæ, tum longæ, & hi morbi quos atra bilis concitat, fient.

Porro Cœli tempestates, prout serenæ *Quod* sunt, vel nubilæ, vel pluviae, vel his *cœlum.* aut aliis ventis perflatae, adventum varia-

riarum ægritudinum denuntiant. Saluberrimum est cœlum serenum atque purum. Itaque præstare creditur rusticum urbano, agreste pratensi, mediterraneum maritimo, montanum palustri, terrestre fluviali, siccum pluvio, sudum nebuloso, meridianum matutino, diurnum nocturno. Sub optimo cœlo certior valetudo est, prioresque morbi (si qui fuerunt) promptius sanescunt. Optimum verò Hyeme cœlum est, quod omni vento caret: Æstate quod Favoniis perflatur. Post serenum cœlum, optimum est id quod æquale est, sive frigidum, sive calidum. Pessimum autem est quod variat maximè, eoque nomine multos Autumnus, qui cætera parte anni traxerunt, tollit. Rectè enim Hippocrates iudicavit, si eodem die modò calor est, modò frigus, Autumnales morbos expectare oportere. Semper autem pluviis salubriores sunt siccitates. In his tamen febres acutæ fiunt, & tabidi morbi & lippitudines, & tormina, & urinæ difficultates, doloresque articulorum. Pluviæ verò longas febres exhibent, alvi fluxiones, putredines, morbos, tum comitiales, tum attonitos, anginas, resolutiones nervorum, cancos.

Por-

Porro ex ventis salubriores sunt Orientales, atque Septentrionales, quàm vel Subsolani, vel Austri: etsi ea res tamen pro regionibus variat. Ubi Aquilo cœ-
 lo imperare incipit, prædicere licet do-
 lores lateris & pectoris, tussés, faucium
 asperitates, alvi & urinæ compressiones,
 & horrores: sanum tamen corpus is ven-
 tus firmat, & veg-^{Qui}tius mobiliusque red-^{morbi}-
 dit. Spirantibus autem Austris expecta-
 re convenit oculorum caliginem, aurium
 hebetudinem, sensus tarditatem, vertigi-
 nem, gravitatem capitis, alvi fluxionem,
 totiusque denique corporis imbecillitatem,
 atque pigritiem. Cæteræ tempestates cœ-
 li, prout vel Aquiloni, vel Austro pro-
 piores sunt, modò hos, modò illos po-
 tius morbos creant.

His ita animadversis, proximum est
 ad ipsum spectare ægrotantem: qui, si
 in propria curatione officio non deest suo,
 & morem imperatis Medici gerit, neque
 quicquam proficit tamen, graviter uti-
 que ægrotat: omninò autem contrarium
 fit, si, cum nusquam in officio sit, me-
 diocriter tamen habet. Ejus quoque non
 constare mentem, imprimis grave est
 Qui sic est, is, etsi parte aliqua corporis
 dolorem habet, nullo tamen ejus videtur

Qui morbi ab Aquilone, qui ab Austro fiunt.

Officium ægroti.

Mens ægroti atque mores.

affici sensu. In omni autem morbo hominem compotem mentis esse, bonum est. Aliquid etiam spectari in moribus potest. Tutum enim non est levi animo natum, asperum in morbo responsorem esse coepisse, aut quædam violenta manu facere eum, qui semper imperium in animum non difficile habuit. Turbulentus verò naturâ homo, etsi non modò ferociter loquitur, verùm etiam desipit per febrem ardentem, non usquequaque tamen periclitari videatur. Si quis supra modum, supraque consuetudinem vel loquax, vel taciturnus est, malum significatur: tacenti enim soporis, aut melancholiæ principium est: garrienti, delirationis. Jam verò falsis imaginibus propter vim morbi mentem turbari, sine magno metu non est: veluti cum quis digitis micat, aut floccos festucasve de strangulis legit, aut armatos adesse sibi hostes putat, malosve dæmones, vel quid spectrorum hujusmodi. Longeque gravius est, si judicio amisso necessarios, vel domesticos non agnoscit: aut si quæ animus concupiscit, eorum ipse protinus homo obliviscitur. Ad extrema autem ventum est, si inter hæc æger neque audit, neque videt, aut mo-

ve-

vetur, extremis jam tum frigescentibus,
& livore tœdis.

Haud levis etiam in somno animadver- *Præsa-*
sio est: ubi is enim auxisse malum vide- *gia ex*
tur, mortalis est: ubi levasse, non mor- *somno*
talis. Ab eodem itaque delirium sedari *atque*
valde bonum. Pessimum est, ex toto *vigilia.*
ablatum cum esse: vis enim hoc modo
infirmata consumitur. Eò minus malus
est, qui nocte non accedit, etiam si in-
terdiu venit. Qui autem tantum de die
sit, is melior esse matutinis temporibus
censetur, ad tertiam usque diei partem,
Æquè malum est somni nimietatem esse,
sic ut quidam veluti sopor interdiu no-
ctuque immoretur. Plenior per noctem
somnus qui delirio successit, quique cum
frigore partium est extremarum, pericu-
lum ostendit. Altus sopor cum debili
pulsu, & delirio, & extremis frigescen-
tibus, mortalis est. Ut sine modo con-
tinuatus somnus, sic etiam nimia vigilia
malum significat. Hæc enim, nisi do-
lorem afflictionemque sequitur, delirii
metum ostendit. Quem longa vigilia
confecit, huic tussim accedere, admo-
dum periculosum est.

Aliquid etiam in insomniis est. Nam *Præsa-*
si ea alia sunt, quàm diurna negotia fuê- *gia ex*

inso-
mnia.

re, turbationem esse in corpore aliquam testantur. Itaque si incendia videri videntur, flava luxuriat bilis: si verò fumus aut densa caligo apparent, atra bilis abundat: si imbres, itemque nix, glacies aut grando obijciuntur, multa intus pituita est. Qui in foetido se loco versari putat, putrem is humorem intus fovet: cum verò rubra quædam dormientibus per insomnium obversantur, ipsique cristas habere se gallinaceorum credunt, scire licet sanguinem intus abundantem esse. Luna, si apparet sub insomnio, eas potius affectiones notat, quæ in medio corporis cavis spatiis sunt. Sol, quæ in medio: cætera astra, quæ in ambitu. Si quid igitur horum offendi videtur, aut obscurari, suove circuitu fisti; quæ pars singulis debetur, in ea morbus versatur: levis quidem, si vel aër, vel nebula luminibus cœlestibus impedimentum dedit: gravior, si aqua. Quod si ea ipsa ita superari interjectis elementis videntur, ut penitus evanescant, metus est ægrum morbo succubiturum. Cæterùm, si fugatis obstaculis, clara fieri signa splendidaque incipiunt, in multa spe esse homo potest: quum verò celerissimo impetu feruntur, insanix metum ostendunt.

ostendunt : si descendere ad occasum , itemque in mare præcipitare , vel in terram videntur , morbos etiam significant. Turbatum mare ventris affectum notat. Terram autem aquis inundari videri , bonum non est. Humidum enim id morbum arguit , multòque magis , si quis stagnis aut fluminibus mergi se putat. Pejus est aridam terram , ac Sombus tostam vidisse : magnæ enim id argumentum siccitatis est. Si quis per somnum avidè quid edere , aut bibere velle videtur , alimenti vel potionis significatur inopia. Aquam puram , potari videri , bonum : cætera pocula , malum. Monstra verò apparere , aut armatos hostes , unde ingens terror dormienti incutitur , morbum ostendit , & insanix metum. Ex æditissimo loco præcipitari videri , vertiginem minatur morbumque vel comitiales , vel attonitum ; utique si tum quoque caput multo humore oneratur.

Sed missis nunc mentis erroribus , ex-*Præsa-*
teriora ægri intueamur , in quibus vul-*gia ex*
tus locum habere præcipuum potest : is *ægri*
enim signis minimè dubiis affectum prin-*vultus.*
cipium partium commonstrat. Ergò in
omni morbo benè sperare licet , si quis
non nimium dissimilem vultum sani ho-
minis

ostendit. Haud leve etiam malum portenditur, si æger ex morbo debilis nullum sustinere decubitus potest, sed erigi volens, sessionem expetit: aut si adstantes averfatus, sese in ultimum cubile convertit. Ex manibus etiam aliquid observatur, quas si sine causa æger sæpius naribus admovet, tanquam inde absterfurus aliquid, nihil tamen cum sit, malum id esse judicatur: parque periculum est, si digitis floccos de stragulis vellere conatur, aut quæ in proximo pariete minuta eminent, carpere.

*Præ-
sagia ex
toto cor-
pore.*

Jam verò quod totum corpus attinet, id nimum celeriter per morbos emacrescere: aut contrà æquè benè habitum, morbo quantumvis diutius trahente, videri, malum est: prius enim, magnam naturæ infirmitatem, secundum longam invaletudinem arguit. Æquè verò inutile est, modò calidum esse corpus, modò his coloribus, modo aliis affectum. Diuturni enim id judicium morbi.

*Præ-
sagia ex
respira-
tione.*

Sed corporis quoque ægrotantis intueri facultates oportet, & ex his utilia præsagia sumere. Spiratio itaque bona cum in longis morbis, tum maximè in acutis, qui cum febre sunt, & intra quadraginta dies conquiescunt, promit-

promittere salutem solet : difficilis autem , periculum minari. Inprimis verò horrenda spiratio est , quæ inæqualiter interciscèque ducitur , ut dupla videatur aëris intra pectus revocatio. Mala quoque & præfocans ea est , quæ hominem supinum esse non finit , sed è cubili cogit consurgere : sub qua thorax atque scapulæ plurimum attolluntur. Ea autem difficilem destillationem , vel anginam , vel suppurationem , vel crudum pulmonis tuberculum comitatur. Magna autem & frequens , quâ fervidus vapor ore , naribusque efflatur , vehementis sine obstructione incendii argumentum præbet. Itaque hæc per ardentes febres maximè editur. Frequens autem , & parva , infirmas esse vires testatur , aut certè impedimentum , quo pulmo urgeatur , arguit. Proin inflammatis pulmonibus , aut lateribus , aut septo transverso , aut jecinore , aut liene , subinde talis esse deprehenditur. Magna autem , & ex longis intervallis rara , infantiæ nota est. Perniciem autem minatur ea , sub qua spiritus ex ore atque è naribus frigidus fertur : ubi spiritus vix ore , sed totus penè naribus emittitur : magisque si harum contrahi pinnæ , dilatarique cer-

cernantur, certum oppressarum virium
judicium est. Incumbente per febres
morte, spiratio alta, crebra, & diffi-
lis est.

*Præsa-
gia ex
pulsu.*

*Opti-
mus
pulsus.*

*Ma-
gnus
pulsus.*

Nunc de pulsu dicam arteriarum, qui,
quoniam cordis vitæque nuntius est, ma-
gnas ad recta præfagia vires habet. Is
enim si per morbos haud multum à na-
tura defecit sua, talisque esse perseverat,
validum corporis robur, spemque secun-
dæ valetudinis ostendit. Optimus cen-
setur is, qui medius inter magnum est
& parvum, inter celerem & tardum,
inter crebrum & rarum, inter vehe-
mentem & languidum, inter mollem &
durum, inter plenum & vacuum, qui-
que bonam ictuum inter se proportio-
nem, æqualitatem, ordinemque retinet.
Idem hic variis de causis suæ naturæ le-
gem amittit, prout vis est ægrotantis,
aut usus pulsationis, aut affecta arteria.
Magnus pulsus usum sequitur inactum,
naturæque vim: sed priusquam à natu-
rali statu in magnum degeneret, pri-
mum fit is, qui omnium naturæ facilli-
mus est, creber, crescenteque magis u-
su etiam celer. Si imbecillus sub his ca-
sibus homo est, magnus esse desinit pul-
sus, fitque cum crebro parvus & lan-
guidus.

guidus. Durâ etiam arteriâ pulsus non admodum esse celer potest. Contrariâ *Par-* autem ratione de parvo dicendum est: *vus.* sub quo vis infirma est, & nequaquam urgens usus: hîc primò rarus, dein, crescentibus imbecillitatis causis, tardus, & tùm parvus esse incipit. At tarditatem quoque & raritatem facere siccitas arteriæ potest. Durus etiam pulsus arteriæ notat duritiem, mollis humiditatem. Itaque hic peculiaris esse *Durus,* sopori, lethargo, pulmonis inflamma- *itemque* tioni, mollibus viscerum tumoribus, *mollis.* aquæ inter cutem, similibusque morbis solet. Robustus vehemensque pulsus, *Robu-* ægrotis spem secundæ valetudinis osten- *stus.* dit: languidus, exitii metum. Scire *Lan-* autem licet, non tantum periculi in pul- *guidus.* su verti maximo, vel celerrimo, vel creberrimo, vel vehementissimo, vel mol- lissimo, quantum in eo qui minimus est, maximèque tardus, rarus, languidus, durus. Hi enim nunquam sine gravi periculo subsunt. Ex priorè ordine, optimus quidem vehementissimus est, dein maximus: pravissimus autem est, maximè mollis. Ex posteriore autem deterrimus, languidissimus: post quem tardissimus, & rarissimus, atque

hinc minimus. Languidus autem omnis semper naturæ significat imbecillitatem, quæ imbecillitates si longâ vetustate morborum contracta est, reddit eundem etiam pulsum parvum, rarum, atque tardum, si quidem febris deest: & crebrum, velocemque, si ea subest. Ubi imbecillitatem nimius dolor, aut vigilia, subitæve inanitiones intulerunt, pulsus supra languiditatem parvus est, & celer, & creber. Si autem non in se debilis, sed aliqua re impedita, oppressaque natura est, ut in magnis sit grandium vasorum obstructionibus, itemque in repentinis humorum in præcordia confluxionibus, & in ipsis denique pestilentialibus febribus: pulsus maximè continenterque est inæqualis, idemque præter languiditatem parvus, tardus, & rarus: tametsi subinde paucis ictibus, vel vehemens, vel magnus, vel celer, vel frequens apparet, qua in re maxima ejus deprehenditur inæqualitas. Semper autem major imbecillitas est, si pulsus intermittit: maximè, si is ipse deficit. Idem hic si non recurrit, sed ex toto deficit, (quod ἀσφύζιον Græci dicunt) horrendissimus est, & certæ mortis index. Is plerisque omnibus vitâ defuncturis

Cæcis sub novissimum spiritum accidit :
 quibusdam aliquot ante eum horis , &
 interdum , (quod mirum videri potest)
 pluribus etiam diebus. Minus autem
 periculi in eo vertitur, qui sensim gra-
 cilescens minuitur , (Græci *μύουσαν* ap- *μύου-*
 pellant). Hic aliàs reciprocus est , aliàs *eos.*
 non est : ut ut est , magno semper metu
 terret. Et quidem si non reciprocatur ,
 deterior etiam deficiente reciproco ju-
 dicatur. Haud leve quoque discrimen *Inter-*
 intermittens pulsus habet , qui , quò *mittens.*
 diutius à motu quiescit , eò periculo-
 sior est : & cum duarum tempus pulsa-
 tionum intermittendo transigit, mortem
 denuntiat, nisi alicui tamen is pulsus se-
 cundum naturam est : quanquam in se-
 nibus , longa febre , vel anhelatione af-
 fectis , itemque aliàs in pueris observa-
 tum est , post intermittentem pulsum ,
 vitam mansisse, id quod nulli contigis-
 se juvenum credibile est. Longè hoc
 pulsu formidabilior , & certior exitii
 nuntius existimatur , qui in una inter-
 mittens pulsatione est. Intercurrens au- *Inter-*
 tem pulsus bonam judicationem morbi *cur-*
 pollicetur , & futuram salutem : utique *rens.*
 si cætera quoque signa respondent. Bis *Bis fe-*
 feriens , seu intercisis , calidum humo *riens.*

*Undo-
sus.*

rem, eumque vehementer putrem & facultatem non penitus invalidam sequitur. Undosus, morbos denotat nimio humore corpus irrigantes, febres scilicet quotidianas, & continuas has, quæ perpetuis sudoribus hominem labefactant, *τύφωδεις* Græcis appellatos constat: itemque id genus hydropis, quod ipse *λιποπλεγματίαν* dicunt. Tum in hisce febribus, tum etiam in aliis, undosus pulsus sudorem antecedit judiciale, si quidem plures sunt ictus alti, & vehementes, notæque concoctionis cernuntur. Sub undoso pulsu, neque viscerum subesse inflammatio, neque durus in his sine dolore tumor, minusque vel distentio nervorum, vel nimia ariditas potest. Eundem pulsum in vermiculantem (qui ab illo sola differt parvitate) verti tutum non est. Tum enim vis, etsi nondum deficit, tamen paulatim labascit. Idem vermiculans attritam vacuatione naturam comitatur, itemque pulmonis id vitium, quo ipse totus putris nimio scatet oneraturque humore: utique si jam tum quoque vires corporis infirmæ sunt. Quemadmodum de undoso dixi, ita quoque dicere de vermiculante oportet, quod uterque mollem

*Vermi-
culans.*

lem

lem requirit arteriam : neuter deprehendi in tabe , inflammationibus , & duris , sensuque carentibus viscerum tumoribus , & in suppurationibus pectoris , ne propinqua quidem jam morte , potest. Nulla febris , nisi quæ levissima est , ac lenta , vermiculantem pulsum exhibet : quoniam crescens calor , tardam esse arteriæ distentionem non permittit. Proin post intemperatam inanitionem ortus vermiculans , si febris accedit , tollitur. Ut verò undosus , si debilior sit , à vermiculante excipitur : ita vermiculans , à formicante. Quare hic quoque incommodi plus , quàm ille portendit. In febribus autem lentis , quæ non vi , sed spatio , longaque vetustate vires exhaurerunt , mortis est nuntius. Tum hic ipse , tum vermiculans , ubi ab iis causis fiunt , quæ vim corporis subitò exsolvunt , iterumque corrigi non difficillimè possunt , non æquè magnum metum inferunt. Ad quem casum expositi sunt ii , quibus propter balnei calores anima deficit , aut vires , ob profusum è vulnere , aut naribus sanguinem , subitò collabuntur. Caprizans autem pulsus naturæ *Caprizans.* notat robur : & secundæ spondet valetudinis expectationem : nisi tamen poster-

rrior pars distentionis fuerit languidior; tum enim anceps naturæ morbi que pugna est. Hecticus pertinacius immoratur, ac morbum longum, siccumque, ac malè sanabilem ostendit: peculiaris est rabidis aut aliqua demum ratione emaciatis. Serratus inflammationes sequitur, præciquèque partium nervosarum: quare etiam lateris inflammationi familiaris est. Idem eò peior, quò manifestior est: id quod nimia tensio & durities facit. Est etiam comes crudorum intus tuborum, quæ hominem subinde tollere, ubi multæ vires non suppetunt, solent: nisi si ea tamen tempestivè suppurant. Rarè convulsissimus incidit pulsus, idemque periculum habet: præcipuè si post magnam vacuationem, famem, febres ardentes, similesve ærumnas oritur. Tutior est is, qui protinus inter morbi initia repentè incidit. Accedit etiam ad inflammatorios cerebri affectus, & ad id maxime genus insanix, quod *egēvitiu* dicunt, itemque ad morbum comitiale, ipsis ægris (contra quàm in syncopa fit) sub corporis calore morientibus. Vibratus autem, seu turbulentus pulsus in ægrotis, qui magnas inflammationes, vel tenacissimas patiuntur

Hecticus.

Serratus.

Vibratus.

tiuntur obstructions, itemque nervorum distentionem, naturæ cum morbo pugnam ostendit. Tremens pulsus, vel qui verè est talis, vel ex trementibus ad carpum musculis, si vi morbi, non ex natura inest, syncopem prælagire, & mortem solet. Idem semper languidus est, ac parvus. Ordo in bonis pulsibus, bonum: in malis (tamen si quidam non mediocres viri repugnant) malum significat: tantòque semper ordo magis improbatur, quò pulsus simul deteriores sunt. Illud in genere novissè oportet, pulsum morientibus non eundem omnibus esse. Aliis enim prorsus is ante obitum cessat: aliis ad novissimum propè spiritum deficiens est: aliis non talis, sed creberrimus fit, & minimus, & languidissimus: quibusdam *μείωσις* est: nonnullis intermittens: aliis formicans: aliis vermiculans.

Tremens

Pulsus morientium.

His etiam animadversis, proximum præfati est, appetentiam, aut fastidium ciborum, omnemque denique victus rationem contemplari, atque inde præfagia, & iudiciaque morborum depromere. In omni morbo, salutis nota est, bene ad ea sese habere ægrum, quæ vice cibi potionisque offeruntur: contrà male

*Præfati-
gia ex
appe-
ten-*

*tia &
fastidio
ciborum*

habere, periculolum est. Pravis assumptis, si nihilo æger habet deterius, tolerabilis morbus subest: verum omnibus rectè oblati, si non modò æger non juvatur, sed etiam offenditur, scire licet id difficilis morbi indicium esse. Si quis per initia morborum cibos averfatur, aut etiam juxta statum, viribus etiamnum sufficientibus, nihil terri debet; verum quæ, declinantibus morbis, cibi oriuntur fastidia, aut alias etiam viribus admodum invalidis, periculo non vacant. Eadem sub longa invaletudine pessima sunt: sed & in convalescentibus recidivam minantur, magisque si unà frequens acidus ructus est. Post morbum, si expetitis & sumtis epulis, homo neque corpore, neque viribus proficit, malum est: nam plus estur, quam par est. Verum si idem casus modicè comedente accidit, scire licet inanitionis eum egentem esse: quo auxilii genere nisi succurritur, metuenda recidiva est. Nemque ea scilicet tum demum proclivis est, cum quædam in corpore post judicationes relinquuntur! Jam autem in ipso etiam morbo, quicumque initio probè comedit, nec proficit tamen, is tandem ferè

rè ciborum urgetur fastidio : contrà qui magnâ prius ulus inediâ , cibum postea concupiscit , is morbo faciliùs liberatur.

Sequitur nunc eorum observatio, quæ corpore excluduntur : sputum dico, alvi excrementum, urinam, sudores, quibus omnibus sic comparatum est, ut, cum imbecilliter & diminutè, parvaque portione efferuntur, mala sint; magisque, cum propinquè inter se invicem prodeunt. Quin etiam tum ingentem ostendunt metum, cum pravæ quoque notæ comitantur : sin minus, morbi longitudinem. Illud ferè commune est, quicquid exit cujuscumque sit substantiæ, aut molis, aut qualitatis, etiam id fiat vel modo, vel tempore, semper salutem promittere, si post notas fertur concoctionis, si die judiciali, si cum ægri levamento : quod contra vacuatur, id pessimum atque mortiferum est. Sputi, atque ejus, quod vomitu extunditur, animadversio superiore libro proposita est, quare hoc loco dejectionem tantummodo, & urinam, & sudores exequar.

*Præsa-
gia ab
excre-
mentis,*

Ergò optima dejectio est, mollis, cohærens, compactaque, & subrussa,

*Præsa-
gia ex
dejecti-
onibus.*

quæque odore similem alvum sani ho-
minis non excedit : quæ denique justæ
molis pro ratione assumptorum est , &
eodem tempore , quo per secundam va-
letudinem redditur. Mala autem est ,
nimium dura, aut liquida , citò diffluens ,
aut consistentiæ inæqualis. Bona quo-
que non est , vehementer vel ruffa ,
vel alba : hæc enim cruditatem arguit ,
illa morbum biliosum : tametsi ruffa non
incommodè eodem declinante morbo e-
ditur , abscedente , quæ hunc fecit , ma-
teriâ. Viridis quoque dejectio mala est ,
æruinosæque soboles bilis. Nigra au-
tem , atram bilem , livida validum notat
in internis frigus. Pinguis item tuta
non est : quemadmodum nec viscida , ac
tenax. Sub utraque enim (nisi si talia
assumta sunt) corpus liquefcit. Quæ
verò malè olet dejectio , commoda non
est , ut quæ caloris magnæque putre-
dinis habetur nota. Mala quoque spu-
mosa est , aut quæ more stercoreis bubu-
li flatibus plena ac lævis est. Spumo-
sa quoque incommodum magni intus
fervoris ostendit. Ad hæc noxâ non
vacat , quæ vel pauca vel nimia est :
varia item , qualis ramentosa est , &
abundè biliosa , cruenta , & purulen-
ta :

ta : adhæc præssina, & nigra, mala est. Pejor est, si similem etiam odorem stercoreis infantis habet, Quocunque morbo incipiente, si atra dejicitur bilis, vel etiam per os evomitur, lethale est. Sub acuto morbo spumosa alvus, & undique biliosa, admodum mala est. Splendentem sanguinem dejici, maximè si qui antè dolores tenuerunt, periculosum est. Liquida dejectio vel acervatim, vel paulatim incidens nocet : altera enim nimis imbecillum facere hominem, altera vigilem solet. Mala quoque per morbos acutos alvus aquosa est : magisque, si fitis deest. Eadem opere detentis atque torpore, pessima est : itemque his, quibus unà venter in tumorem intenditur. Ex liquida dejectione refrigeratio cum sudore, malum : quæ verò in morem atri sanguinis nigra est, sive cum febre, sive sine hac, admodum mala est. Pestifera etiam esse consuevit, quæ sensum ægri fugiens elabitur, aut quæ subito præter rationem in eo homine ubertim profluit, quem longus morbus labefactavit. Obiter etiam aliquid de ventris flatu dicam, quem præstat sine strepitu elidi : nam si is acuto in morbo

bo strepit , dolorem arguit vehementem , vel ipsum certè delirium. Malum etiam est , flatum jam jam erupturum impeditum esse : pejusque , ad superiora revertisse.

*Præsa-
gia ex
urina.*

*Urina
optima.*

*Urina
alba.*

Nunc ad contemplationem veniam urinæ , quam scire licet optimam esse , cujus subaureus color , substantia mediocris , justa secundum portionem moles , sedimentum album , leve , & in acutum fastigatum est Urina autem alba , cruditatem , aut magnam esse in urinariis ductibus obstructionem docet. Eadem in acutis febribus delirium portendit : aut certè eam insaniam , quam Græcè *ᾠγνίτις* dicunt. Ferè etiam si hæc ipsa diu nihil variat , frigida prænuntiat vitia capitis , ut vertiginem , ut morbum attonitum , vel comitiale , & hujusmodi : fastidia quoque arguit ciborum , & dolores in articulis , & nervorum resolutionem. Alba remissior , ut lactea , & glauca , incipientibus , & incrementibus febribus reddita , copiam putris materiæ , naturæque laborem demonstrat. Quod si hæc diutius fertur , longi frigidique indicium morbi præbet. Tenuis autem urina , & diluta , verèque aquea , morbi diuturni nota est :

est : & quidem sub hoc , si diu talis
 ea cernitur , cæteris signis salutem spon-
 dentibus , dolorem abscessumque in par-
 tibus fore septo transverso inferioribus
 indicat : eadem in pueris pessima est.
 Subaurea , seu ruffa , seu citrina , ut
 modò retuli , probæ concoctionis no-
 tam habet , omniumque (si ad colo-
 rem spectes) est media. Hinc sequitur *Rubra.*
 flava , & mox rubra , exaucti caloris
 testes. Rubra perspicua , quæ etiam *Rubra*
 ignescens , flammeaque dicitur , arden- *perspi-*
 tem indicat febrem , aut jecur immo- *cua.*
 dicè calens : eadem si nihil habet sedi-
 menti , vel nubeculæ , febris principii-
 um , cruditatemque materiæ demon-
 strat. Ac si quidem diutius per acu-
 tam febrem talis fertur , periculum eti-
 am interitus , priusquam spatium matu-
 rescat , minatur. Rubra autem , simul- *Rubra*
 que crassa & obscura , qualis obstructo *crassa.*
 vitiatoque fieri jecinore , & decedenti-
 bus febrium accessionibus solet , flavam
 subesse bilem , aut rubram , aut vitelli-
 nam ostendit. In Synocho itaque pu-
 trida , nunquam penè talis mejitur. Ru-
 bram urinam sequitur vinea , & passæa : *Vinea*
 illa affati sanguinis , hæc tostæ bilis nun- *Passæa.*
 tia : ambæ similem uvæ nigræ colo-
 rem

rem adeptæ. Magna autem ex parte, si sic diutius feruntur hæ, auriginem *Viridis.* prænuntiant. Viridis autem, corruptissimæ bilis nota est: ad quam si vehemens fitis, atque æstus accedunt, periculum à distentione nervorum est. *Veneta.* Veneta autem urina, humoris frigidi, sicque soboles est. *Livida.* Livida percuntis exhibet nativi caloris indicium: quamquam plagas interdum sequi, & accepta verbera potest. *Nigra.* Nigra urina, si rubram viridemque sequitur, extremi caloris index est: si post cæruleam, & post lividam fuit, summæ frigiditatis. In utraque mortis periculum vertitur, idque eò majus, quò ea ipsa est paucior, quoque id, quod in ea subsidet, nigrius est. Cæterum, ubi morbus ex atra bile natus præcessit, utpote lienis tumor, quartana, melancholia, & hujusmodi: tum profectò nigra urina (maximè sub istorum morborum decessu) certam spem secundæ valetudinis facit. *Cruenta.* Urina cruenta, quæ scilicet cum refrixit, sedimentum veluti sanguinis concreti habet, renes à calculo atteri significat: utique si hi nullo ictu, aut casu percussi fuere. Quæ mali coloris urina est, quò ea copiosior, hoc minus mala est. Post urinæ

næ autem colorem, ejus quoque observanda substantia est. Ea si tenuis est, *Tenuis.* cruditatem, arctamque esse obstructionem testatur: maximè si simul etiam diluta est, qualis spectari in quartana, & ingravescentibus renum doloribus solet. In febribus autem longis, & incertis, & non magnis, si diu tenuis urina mejitur, lienem esse affectum constat. Cæterum *Craffa.* crassa urina, copiam ostendit crudorum humorum; qui magna ex parte jecinoris cavum, itemque intestina & ventriculum obsident. Crudissima est tenuis aquosa sic permanens: minus hac cruda tenuis est, quæ post crassescit: hanc sequitur, & micta, & persistens crassa: quæ sub firmis viribus, morbi longioris, sub invalidis, mortis præsaga est. Rursus minus cruda censetur crassa redita, quæ post sedimentum deponit: ea nempe brevior fore morbum significat. Omnia verò genera hæc cruditatem arguunt, & morbi principium, cumque ipsum (si quidem diutius hæc immorantur) longum & judicationis non expeditæ. Si accedente primum febre, urina crassa mejitur: copiam materiæ, virium infirmitatem, & periculum ostendit. *Craffa alba.* Crassa & alba crudæ soboles pitui-

*Crassa
subru-
bra.*

*Crassa
rubra.*

*Crassa
nigra.*

*Olea-
sea.*

tæ est. Ea si in longis laboriosisque febribus, quæ in abscessum essent abituræ, copiosa profluit, ab abcessu & à dolore liberat. Crassa & subrubra urina, magisque si tale quoque nacta sedimentum est, tutum quidem morbum, at longum fore portendit. Crassa verò & penitus rubra qualis in febribus cernitur continentibus, multitudini sanguinis attestatur: tametsi ea res non usque certa perpetuaque est. Nam sæpè non abundante sanguine talis urina fertur, tum in quartana & tertiana intermittente, tum in aurigine. Quod si sine hoc casu, urina crassa rubraque in febre ad quadragessimum usque diem manet; solvi profectò febris ante diem sexagesimum non potest. Crassa & nigra in totum exitiosa est: eoque magis, quò pauciore redditur mole. Tuta tamen esse interdum, & salutaris potest, ubi declinantibus (ut superius retuli) atræ bilis morbis, noxi humor robore naturæ excluditur. Quò crassior in morbis acutis urina est, eò deterior est. Jam etiam cruditatis nota plus terrere in urinæ consistentia, quàm in colore debet. Quæ urina lentore crassitieque oleum, vel etiam commota, refert, liquefcere corpus, vel tabe, vel hectica

Etica febre vel hydropē significat. Si urina prius splendida, externo frigore crassescit, & matulam alba lentaque sorde onerat, iterumque igne soluta, colorem recipit suum; in acutis morbis cœptam esse concoctionem ostendit, alioqui nullius præcipuè notæ est. Si verò ^{Crassa}urina ex sese, qualis jumentorum est, ^{turbida.} crassa turbidaque mejitur, neque igne solvitur, & huic multa innatant corpuscula ex pure aut muco conflata, quæ per quietem specie crassi sedimenti descendunt, reliquâ tum ferè inclarescente urinâ, scire licet in renibus ulcus, vel in vesica, maximèque calculi causa, esse: aut certè has partes crudo humore præpediri. Quod si integris his, sic turbida urina est, crassi humoris totis venis abundantiam, morbosque longos & difficiles ostendit: maximè verò capitis, iudice Hippocrate, vel præsentēs, vel imminentes dolores. Quin etiam hinc interposito tempore sequi, vel lethargus, vel altus sopor potest. Sæpè cum quartana solvitur, itemque jecinoris, & lienis morbi, & quum ab abscessu intus erupit, urina repentè turbida mejitur.

Porro si urina ita confusa est, ut nullis solvi ignibus, nulla quiete possit, sed nec suspensum habere ullum, nec sedi-

mentum videatur, continuas febres, easque periculofas, & malignitate graves commonftrat. Cæterùm molem quoque urinæ obfervare non inutile eft.

Multa. Multa enim, aut copiam indicare feroſi humoris, (ut in hydrope & diabete) poteft, aut corporeæ molis confumptionem, ut in colliquantibus febribus, aut certè exiguam alvi dejectionem. Rectè enim Hippocrates animadvertit, ex multa per noctem mictione, paucam de-

Pauca. jectionem fequi. Urina pauca redditur bibentibus pauca, aut alia parte corporis abundè vacuatis, aut nimio calore laboreve exhaustis atque ficcatis. Sæpè etiam itinera impedita eſſe, vel craſſo humore, vel calculo, paucitas urinæ docet. In acuta febre, quæcunque pauca redditur propter vim morbi, aut deficiente humido, aut expellendi facultate infirma, certæ mortis indicium exhibet. Quæ modò pauca urina eſt, modò iterum copioſa, & interdum penitus cohibetur in acutis morbis, peſſima: in longis multæ durationis nota eſt. Aliquid etiam in urinæ odore eſt. Nam quæ foetet, ſimulque craſſa eſt, & alba, cum ſedimento purulento, renum aut pudendi ulcus oftendit. Quod ſi hæc

eadem

eadem mucum quietè deponit , & mul-
to dolore excluditur , calculum esse in ve-
fica monstrat. Qui foetor non ab his lo-
cis proficiscitur , verùm ex altiore cor-
pore venit , sive in rubra turbidaque uri-
na est , sive etiam (quod rarius fit) in te-
nui atque clara , semper gravioris alicujus *Urinæ*
nota putredinis est. Nunc ad urinæ ve- *sedimen-*
niam contenta , quæ generis non unius *men-*
sunt. Sedimentum quod *ὑπόστασις* Græcè *tum*
dicitur , incolumem naturæ calorem o-
stendit : idque eò magis , quò citius in e-
miecta urina cernitur. Sed discernere se-
dimentum , ab ea sorde non difficillimum
est , quæ à renibus , vel è vesica descen-
dens , urinam turbat , & post in ea ipsa
veluti crassamentum quoddam subsidet. *Suspen-*
Quod in medio suspensum est , *ἐναεῖον* *sum*
Græci dicunt) infirmiore naturæ vim *urinae.*
arguit : nubes eò adhuc magis debilem. *Nubes.*
Imbecillissima ostenditur , si nihil urina
vel sedimenti , vel suspensi , vel nubecu-
larum habet : estque ea res in ægrotis ap-
primè horrenda : sanis autem accidere in-
terdum citra magnum incommodum po-
test. Porro optimum sedimentum est ,
quod mole substantiæque mediocri ad *Sedi-*
imum matulæ subsidens , album , leve , *men-*
& æquale est , idemque latum inferius , *tum op-*
timum,
item-

que sus-
pensum
& nu-
bes.

Conten-
tum te-
nue.

Cras-
sum.

Ru-
brum.

Vene-
tum,

itemque

livi-
dum

& ni-
grum.

& superius acuminatum. Optima quoque, & suspensum, & nubes sunt, alba, levia, & æqualia. Minus bonum suspensum est, quàm sedimentum: utrumque melius nube est. Quodcunque autem tenue contentum est, cruditatis & incipientium argumentum morborum præbet: crassum autem multum esse materiæ non coctæ docet; tametsi id quoque judicationem comitari longarum ægritudinum solet. Contentum rubrum, bilis calorisque soboles est. Venetum & lividum, magisque etiam nigrum, oppressi naturæ calor. Contenta bona, quò magis ad imum fidunt, matulæ tamen non contacto fundo, hoc meliora sunt. Quibus per morbos citò contenta in urina cernuntur bona, hi citò quoque judicantur. Omnia autem contenta inferiora, potiora sublimioribus sunt. Quæ quarto die in febribus nubeculam subrubram urina exhibet, septimo liberat: modò reliqua etiam pro ratione respondeant. Tenuis autem urina ac biliosa, quæ vicissim modò melior fieri, modò pejor videtur, longioris mali nota est: quæ si diutius sic fertur, periculum non leve habet. Urina præter rationem colore, & substantiâ, & contentis matura, semper in morbis,

potif-

potissimum acutis, suspecta est. Si quid boni in urina subsedit, idque repente non amplius sequitur; dolores & mutationes significantur. In febribus incertis nubeculae nigrae quartanam praenuntiant. Proximum nunc est ea intueri, quae urinae permiscuntur. Si semen inest, id tenue ac leve est, semperque urinae innatat: pituita autem crassa, tenaxque, & cohaerens est. Pus permotâ urinâ dissolvitur, ac quoquo versum fertur. Utrumque hoc quietè subsidet. Porro si quaedam in urina quasi ramenta cernuntur, tostos esse in venis succos docent. Si similia capillis sunt, extorremem in renibus calorem, tenacemque esse humorem testantur. Quamquam filamenta albis capillis similia saepe in Venereo seminis profluvio, & foeminarum albo fluore cernuntur. Si veluti exiguae innatare carunculae in urina crassa coeperint, renes docent exulceratos. Scabies autem vesicae significatur, si cum urina crassa quaedam furfuri non dissimilia feruntur. Eadem si in tenui apparent, colliquantem ardorem febris notant. Arenarum autem mictio, calculus in rene, aut in vesica arguit. Si in urina foetida pus aut squamulae sunt,

*Semen
in uri-
na.*

*Pitui-
ta.
Pus.*

*Ramen-
ta.*

Capilli.

*Carun-
culæ.*

*Furfu-
racea.*

*Arenæ.
Squa-
mulæ.*

Pinguia.

vesica exulcerata est : sin minus , extorrens ex squamulis febris significatur. Squamulae tamen tutiores , quoniam tenuiores , quam furfuracea sunt. Si in urinæ superficie quædam pingua , ac araneorum telis quid simile , innatant : aut si (quod levius est) divulsa , & quasi ex oleo injecta puncta sunt , scire licet ardentissima febris , vel certè hecticâ , vel tabe corpus liquescere. Si verò cumulatim hæc , brevique esse cœperunt , calore renes occupante , eorum subest colliquatio. Pessima ante rigorem oleacea urina est. Corona quoque urinæ obser-

Urinæ corona.

vari non sine causa debet. Nam si hæc meliorem , quam reliqua urina colorem exhibet , salutem prænunciat : si deteriorem , periculum. Tenuis , albaque corona , pituitosi : ruffa , temperati : rubra , itemque ignea , biliosi & vehementer tosti : livida atque nigra , melancholici. Itaque utraque hæc peculiaris , tum morbo comitali , tum melancholiæ est.

Bullæ.

Si bullæ in corona multæ integra serie circumfistunt , caput dolere ostendunt : idque cò magis , quò illæ colorationes sunt : & minus , quò magis albæ. Bullæ per urinæ sparsæ superficiem , nihil super capite significant , solius cruditatis , obstruc-

tionis,

ctionis, imbecilli caloris nunciæ. Quibus in tenui urina, & sedimentis vacua, bullæ cernuntur ferè hi longa, magnaue renum obstructione affecti sunt. Tum autem bullas has in crassâ urina esse coepisse melius est. Majores bullæ, latèque per urinæ coronam fusæ, dolores minui, qui prius fuerant, docent. Subesse autem destillatio creditur, si bullæ instar exigui grani parvæ in corona hærentes, agitatâ urinâ, deorsum pelluntur, iterumque ad coronam ascendunt. Illud in genere novisse oportet, urinæ colore intemperiem significari: substantiâ crassâ aut turbulentâ, humoris vitium: confusione, putredinem: admistis, certam loci affecti cognitionem.

Novissimè de sudoribus dicam, quos *Præsa-* esse bonos constat, si post notas concoctio- *gia ex* nis toto corpore erumpunt: itemque si per *sudori-* febres intermittentes, decedentibus acces- *bis.* sionibus, aut per judicationes continuarum febrium ubertim effluunt, morbumque vel finiunt, vel multum levant: tum, qui veluti guttis quibûdam effunduntur, & evaporant, quique expurgatæ alvo succedunt, & jam crassiore demta morbi materia, id quod reliquum est tenuioris, exhauriunt. Mali verò his contrarii sunt, maximèque

si ex capite solum, aut è fronte cervicibusve feruntur. Pessimi autem iidem hi sunt, si simul etiam frigent. Siquidem in acuta febris, mortis indices: in mitiore, longæ durationis sunt. Mali etiam judicantur non continuati, sed interfecti; parique ratione inutiles nimium multi, quique morbum non minuunt. Hunc enim ipsum tum longum fore, manifestum est. Horrorem post sudores incidere, tutum non est. Sub exsuletis viribus, atque syncope, paucio tenacique sudore frontem madescere, valde malum: concidente verò jam tum pulsu, citæ mortis indicium est. Copiosi sudores calidi, frigidive, quique continenter fluunt: frigidi, gravio rem morbum: calidi, levio rem testantur. Ferè autem sic incidit, ut cum erupturi sudores sunt, primum ferri à capite incipiant, ac dein paulatim è reliquis membris. Magna autem ex parte, abundantius sudores posteriore corpore emergunt, quàm anteriore, & superiore quàm inferiore. Eos etiam magis somnus fundere quàm vigilia solet.



INDEX RERUM

succinctus, quæ hoc opusculo continentur.

A.

A <i>Bortus præsagia.</i>	251
<i>Abscessus præsagia in febribus.</i>	27 &
	40
<i>Ægroti officium.</i>	295
<i>Ægroti mens atque mores.</i>	ibid.
<i>Alphos.</i>	259
<i>Alvi profluvium.</i>	151
<i>Aneurisma.</i>	279
<i>Anbelatio.</i>	138
<i>Angina.</i>	98
<i>Angina notha.</i>	102
<i>Ani inflammatio.</i>	176
<i>Animi defectio.</i>	140
<i>Appetentia canina.</i>	145
<i>Aquæ metus.</i>	71
<i>Articularis morbus.</i>	253
<i>Ascites.</i>	198
<i>Atra bilis.</i>	193
<i>Attonitus morbus.</i>	81
<i>Atrophia.</i>	54
<i>Aurigo.</i>	193

B *Oulimos.*

B.

INDEX C.

C <i>Achexia.</i>	54
<i>Calculus renum.</i>	208
<i>Calculus vesicæ.</i>	217
<i>Cancer.</i>	270
<i>Capitis dolor.</i>	63
<i>Carbunculus.</i>	264
<i>Caros.</i>	75
<i>Catalepsis.</i>	ibid.
<i>Cerebri vulneratio.</i>	102
<i>Chiragra.</i>	254
<i>Cholera.</i>	150
<i>Cibi cupiditas & fastidium.</i>	145
<i>Coli dolor.</i>	164
<i>Coli inflammatio.</i>	169
<i>Coma.</i>	76
<i>Comitialis morbus.</i>	ibid.
<i>Cordis palpitatio.</i>	141
<i>Cordis vulnus.</i>	143
D <i>Ejectio cruenta quæ fit causâ jecino-</i>	
<i>ris.</i>	181
<i>Delirium.</i>	65
<i>Destillatio.</i>	89
<i>Dierum judicialium ratio.</i>	47
<i>Dysenteria.</i>	158
<i>Diabetes.</i>	215

E.

E <i>Lephantia.</i>	57
<i>Erysipelas.</i>	266
<i>Exanthemata.</i>	260
	<i>Febris</i>

R E R U M.

F.

F <i>Febris ardens.</i>	6
<i>Febris continens non putrida.</i>	3
<i>Febris continens putrida.</i>	ibid.
<i>Febris continua.</i>	5
<i>Febris diaria.</i>	2
<i>Febris exitialis signa.</i>	9
<i>Febris hectica.</i>	51
<i>Febris implicationes.</i>	21
<i>Febris lenta.</i>	13
<i>Febris longæ signa.</i>	26
<i>Febris periculosæ signa.</i>	24
<i>Febris pestilentialis signa.</i>	31
<i>Febris quartana.</i>	17
<i>Febris quotidiana.</i>	19
<i>Febris semitertiana.</i>	22
<i>Febris tempora.</i>	29
<i>Febris tertiana intermittens.</i>	15
<i>Febris tertiana notha.</i>	17
<i>Fistula.</i>	176. 275
<i>Fœtus in utero mortui signa.</i>	251
<i>Furor.</i>	70

G.

G <i>Angræna.</i>	264
<i>Gulæ vulnus.</i>	177

H,

H <i>Æmorrhoides.</i>	174
<i>Hydrops.</i>	197

I.

I <i>Ecineris corruptio.</i>	181
	<i>Feci-</i>

INDEX

<i>Fecinoris imbecillitas.</i>	186
<i>Fecinoris inflammatio.</i>	186
<i>Fecinoris intemperies.</i>	179
<i>Fecinoris obstructio.</i>	183
<i>Fecinoris scirrhus.</i>	184
<i>Fecinoris vulnus.</i>	204
<i>Ignis sacer.</i>	266
<i>Impetigo.</i>	258
<i>Imprægnationis impedimenta.</i>	247
<i>Imprægnationis notæ.</i>	ibid.
<i>Incubus.</i>	80
<i>Inflammatio.</i>	263
<i>Intestinorum lævitas.</i>	156
<i>Intestinorum vulnus.</i>	177
<i>Ischias.</i>	255
<i>Judicatio optima.</i>	44
<i>Judicatio in quæ incidat tempora & in quæ mors.</i>	46
<i>Judicatio si ne futura vel non.</i>	44
<i>Judicationis signa.</i>	33
L.	
L <i>Erbargus.</i>	73
L <i>Leuce.</i>	259
<i>Leucophlegmatia.</i>	197
<i>Lienes magni.</i>	56
<i>Lienis inflammatio.</i>	192
<i>Lienis tumor.</i>	190
<i>Lippitudo.</i>	93
<i>Lumbrici.</i>	170
M.	
M <i>Elancholia.</i>	68
	<i>Menstrua.</i>

R E R U M.

<i>Menstrua:</i>	244
<i>Menstruorum fluor.</i>	245
<i>Menstruorum retentio.</i>	244
<i>Mesenterii inflammatio.</i>	178
<i>Mesenterii tumor.</i>	ibid.
<i>Mictio cruenta à renibus orta.</i>	213
<i>Mictio quæ à vesica cruenta est.</i>	221
<i>Mola.</i>	239
<i>Morbi acuti & ancipites.</i>	282
<i>Morbi acuti & lethales.</i>	ibid.
<i>Morbi breves & salutare.</i>	ibid.
<i>Morbi longi & ancipites.</i>	283
<i>Morbi longi & salutare.</i>	282
<i>Morbi longi & lethales.</i>	283
<i>Morbi difficiles itemque faciles.</i>	286
<i>Morbi singularum ætatum.</i>	288
<i>Morbi singulorum anni temporum.</i>	290
<i>Morbi qui ab Aquilone, qui ab Austro.</i>	295
<i>Morborum mutue successiones.</i>	285
<i>Morborum transitiones aliorum in alios.</i>	283
<i>Morborum præsagia è cœli sumpta tempestatibus.</i>	292
<i>Muliebris fluor.</i>	246

N.

N <i>Ervorum distentio.</i>	85
N <i>Nervorum resolutio:</i>	83 127
<i>Nervorum rigor.</i>	P. 87

P <i>Apulæ.</i>	267
P <i>Partus difficilis notæ.</i>	252
<i>Pectoris suppuratio.</i>	128
<i>Pe-</i>	Pe-

INDEX.

<i>Pectoris vulnus.</i>	140
<i>Peripneumonia.</i>	115
<i>Peritonæi dolores.</i>	169
<i>Phagedena.</i>	275
<i>Phrenitis.</i>	66
<i>Pleuritis.</i>	104
<i>Pleuritis notha.</i>	114
<i>Podagra.</i>	255
<i>Prægnantium incommoda.</i>	249
<i>Præſagia ab excrementis.</i>	313
<i>Præſagia ex ægri vultu.</i>	299
<i>Præſagia ex appetentia & cibi fastidio.</i>	311
<i>Præſagia ex decubitu corporis.</i>	301
<i>Præſagia ex dejectionibus.</i>	314
<i>Præſagia ex inſomniis.</i>	297
<i>Præſagia ex præcordiis.</i>	300
<i>Præſagia ex pulſu.</i>	304
<i>Præſagia ex reſpiratione.</i>	302
<i>Præſagia ex ſomno & vigilia.</i>	297
<i>Præſagia ex ſudoribus.</i>	327
<i>Præſagia ex toto corpore.</i>	302
<i>Præſagia ex urina.</i>	316
<i>Priapiſmus.</i>	228
<i>Pulmonis crudum tuberculum.</i>	120
<i>Pulmonis eryſipelas.</i>	119
<i>Pulmonis vomica.</i>	121
<i>Pulmonis vulnus.</i>	140
<i>Pus.</i>	278

R.

R *Amex.*

228
Reci-

R E R U M.

<i>Recidivæ præſagia.</i>	287
<i>Renum calculus.</i>	208
<i>Renum exulceratio.</i>	212
<i>Renum inflammatio.</i>	205
<i>Renum vulnus.</i>	216

S.

S <i>Anguinis ſanies.</i>	278
<i>Sanguinis è naribus fuſio.</i>	96
<i>Sanguinis è naribus fluxuri ſigna.</i>	36
<i>Satyriasis.</i>	228
<i>Scabies.</i>	257
<i>Scirrhus.</i>	191
<i>Seminis profluvium.</i>	226
<i>Septi tranſverſi vulnus.</i>	143
<i>Sideratio.</i>	264
<i>Signa profluvii alvi.</i>	38
<i>Singultus.</i>	146
<i>Spiratio difficilis.</i>	137
<i>Strumæ</i>	269
<i>Sudoris ſigna.</i>	39
<i>Suffuſio.</i>	91
<i>Syncope.</i>	142

T.

T <i>Abes.</i>	133
<i>Tabes dorſalis.</i>	216
<i>Teneſmus.</i>	162
<i>Teſticuli inflammatio.</i>	233
<i>Touſillæ.</i>	97
<i>Tormina.</i>	158
<i>Tumor ſine ſenſu laxus.</i>	268
<i>Tuſ.</i>	

INDEX RERUM.


<i>Tussis.</i>	136
<i>Tympania.</i>	200

V.

V <i>Arix.</i>	279
<i>Ventriculi imbecillitas.</i>	144
<i>Ventriculi inflammatio.</i>	149
<i>Ventriculi vulnus.</i>	177
<i>Vesica exulceratio.</i>	222
<i>Vesica inflammatio.</i>	219
<i>Vitiligo.</i>	259
<i>Volvulus.</i>	163
<i>Vomitus.</i>	147
<i>Urinæ difficultas.</i>	225
<i>Urinæ fluor.</i>	215
<i>Urinæ incontinentia.</i>	225
<i>Urinæ retentio.</i>	224
<i>Urinæ stillicidium.</i>	225
<i>Uteri ascensus & descensus.</i>	240
<i>Uteri convulsio.</i>	241
<i>Uteri exulceratio.</i>	235
<i>Uteri hydrops.</i>	238
<i>Uteri inflammatio.</i>	233
<i>Uteri inflatio.</i>	237
<i>Uteri scirrhus.</i>	ibid.
<i>Uteri strangulatus.</i>	242

F I N I S.





69:





